

Э 271.

7 1/2

# БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

И

## ЛѢЧИТЕСЬ САМИ, КОГДА НѢТЬ ВРАЧА,

ИЛИ

# САМОУЧИТЕЛЬ

## СЕЛЬСКАГО ЛѢЧЕНІЯ.

Преимущественно лицамъ духовнаго званія, какъ для предохраненія здоровья надежнѣйшими предупредительными мѣрами, такъ и для подаенія врачебной помощи своимъ прихожанамъ, за отсутствіемъ врачей, во всехъ наипаче случающихся у нихъ болѣзняхъ, съ показаніемъ: 1) каждой изъ нихъ: опредѣленія, видоизмѣненій, признаковъ, причинъ, мѣстопробыванія, сущности, распознаванія, предсказанія, исхода, лѣченія предохранительнаго, діететическаго, посредствомъ соблюденія надлежащихъ правилъ, и существеннаго, состоящаго въ употребленіи самыхъ обыкновенныхъ, домашнихъ, народныхъ, болѣе простыхъ и менѣе сложныхъ лѣкарствъ; 2) случаевъ къ назначенію кровопусканія рожковаго, пивочнаго и жильнаго, условливаемыхъ строгою осторожностію; 3) примѣненія къ быту, образу жизни и разноклиматности поселянъ; 4) правилъ о попеченіи и хожденіи за роженицами, родильницами новорожденными; 5) оспопрививанія; 6) наставленія объ оживленіи скоропостижно умершихъ; 7) правилъ въ предохраненіе здоровья отъ повальныхъ болѣзней; 8) правилъ собирать, высушивать и хранить лѣкарственные растенія и части ихъ; 9) списка простыхъ лѣкарствъ для запасной аптеки и 10) списка врачебныхъ растеній, разводимыхъ въ огородахъ.

Штабъ-Лѣкаря и Акушера

*Надворнаго Советника Н. Бенедиктова*

ЧАСТЬ II.

БОЛѢЗНИ НЕ ЛИХОРАДОЧНЫЯ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Въ печати В. Головкина, у Владимірской церкви, домъ барона Фредерикса. № 15, к. № 1.

1866



2004175142

## ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.



Благословѣ дѣше моѣ Гда и не забывай всѣхъ бездѣлнй Сгѡ, исцѣляющаго всѣхъ недѣги твоѣ, избавляющаго ѿ истѣннй жибѡтъ твоѣ, бѣнчѣющаго тѣ милостію и щедрѡтами, исполняющаго во благнхъ желаніе твоѣ.

(Пс. 102, 1. 3. 4—5.)

### БОЛѢЗНИ НЕ ЛИХОРАДОЧНЫЯ.

**ОПРЕДѢЛЕНІЕ.** Не лихорадочныя болѣзни суть тѣ, въ которыхъ нѣтъ существенныхъ, въ опредѣленномъ порядкѣ и пространствѣ времени обнаруживающихся, припадковъ, свойственныхъ болѣзнямъ лихорадочнымъ.

**Примѣч.** Въ не лихорадочныхъ болѣзняхъ, какъ болѣе или менѣе продолжительныхъ (хроническихъ), развивающихся, болѣею частію не вдругъ, а мало по малу, постепенно, въ которыхъ больные не обезсиливаютъ вдругъ до такой степени, чтобы не могли ходить, и хотя слегка занимаютъ своимъ дѣломъ, всегда почти есть время прибѣгнуть къ совѣту врача, если не уѣзднаго, то окружнаго, не рѣдко бывающаго во всѣхъ почти селеніяхъ, и потому можно рассмотреть только нѣкоторыя изъ нихъ, и не съ такою подробностію, съ какою рассмотрѣны болѣзни лихорадочныя.

**Признаки** не лихорадочныхъ болѣзней состоятъ въ ихъ формѣ, которая, какъ совокупность всѣхъ припадковъ, очень разнообразна и гораздо разнообразнѣе формы болѣзней лихорадочныхъ.

**Сущность** болѣзней не лихорадочныхъ столько же разнообразна, какъ и форма.

**Раздѣленіе.** Основаніемъ раздѣленію не лихорадочныхъ болѣзней служить ихъ главное, или наибольшее мѣстопробываніе относительно системъ организма; по этому они раздѣляются на слѣдующіе классы:

1 Классъ — болѣзни *нервныя*, въ коихъ припадки обнаруживаютъ преимущественно страданіе нервной системы.

2 Классъ — болѣзни *крови*, обнаруживающіяся признаками и припадками, выражающими неправильное состояніе крови.

3 Классъ — болѣзни *питанія*, въ коихъ признаки выражаютъ неправильное состояніе воспроизводимыхъ плотныхъ частей и вообще процесса питанія.

4 КЛАССЪ — болѣзни *отложеній*, состоящія въ неправильныхъ произведеніяхъ.

5 КЛАССЪ — болѣзни *отдѣленій* и *испражнений*, въ коихъ главные признаки показываютъ неправильное состояніе отдѣленій и испражнений.

6 КЛАССЪ — болѣзни *мѣстныхъ*, ограничивающіяся какою либо одною частію тѣла.

## КЛАССЪ ПЕРВЫЙ.

### БОЛѢЗНИ НЕРВНЫЯ.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Нервныя нелихорадочныя болѣзни суть тѣ, которыя обнаруживаются явленіями, выражающими болѣзненное состояніе чувствованія, мышленія и движенія.

Зуда принадлежать слѣдующія, наипаче случающіяся у поселянъ болѣзни:

*Головокруженіе, головная боль, зубная боль, ночная куричья слѣпоты, ипохондрія, кашель, трепетаніе сердца, трясеніе тѣла, истерика, спазмы грудные (удушье), спазмы желудочныя, спазмы кишечныя (колика), спазмы желудочнокишечныя, злая корча, бессонница, ударъ, параличъ, обморокъ, обмираніе, навалъ, безгласіе, бѣшенство.*

### Головокруженіе:

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Головокруженіе обнаруживается чувствованіемъ круговращенія видимыхъ предметовъ, находящихся на самомъ дѣлѣ въ повоѣ, и въ высшей степени развитія болѣзни сопровождается рвотою.

ПРИЗНАКИ. Нетвердая шаткая походка, колѣна подгибаются, усиліе придержаться за что нибудь и сѣсть, безъ чего больной падаетъ въ памяти или безъ памяти, шумъ и звонъ въ ушахъ, помраченіе зрѣнія, лицо блѣдное, высунувшееся, глаза мутныя и слезящія, нерѣдко неподвижныя, поверхность тѣла, особенно голова и грудь, покрыты сильнымъ холодноватымъ, а иногда и влѣйкимъ, или сальнымъ потомъ, пульсъ сжатъ, малъ, неровень, холодъ въ рукахъ и ногахъ, моча малая, красная, сырая, испражнения на низъ задержаны; сильная тоска, головная боль, съ ощущеніемъ разламыванія черепа. Всѣ эти припадки въ разныхъ случаяхъ развиваются въ разной степени.

ПРИЧИНЫ *внутреннія* (предрасполагающія): возвышенная чувствительность, сангвиническій темпераментъ, полнокрое, какъ вообще, такъ въ особенности мѣстное, головное, приливы крови къ головѣ. Что же касается до другихъ болѣзней, какъ-то: глистовъ, почечуя, заваловъ внутренностей, истощенія тѣла, разныхъ болѣзней мозга, возникающихъ опасныхъ горячекъ, перемежающихся лихорадогъ и др., то въ нихъ

головокруженіе бываетъ частнымъ припадкомъ, а не самостоятельную болѣзнію.

Причины *внѣшнія* (производящія). 1) всякое произвольное и непроизвольное круговращательное движеніе самого себя или предметовъ, непрерывно находящихся, предъ глазами такъ, если человѣкъ будетъ довольно долгое время кружиться или пристально смотрѣть на вертящіеся предметы. какъ напр. колеса, жернова, точило и т. п., то обыкновенно подвергается головокруженію, а иногда даже и рвотѣ; 2) непріятный, особенно оглушающій мозговья нервы, запахъ; 3) ѣзда, наглухо закрывшись или открывшись, но при сидѣніи лицомъ назадъ; 4) продолжительное качаніе на качеляхъ съ опущенною внизъ головою и съ закрытыми глазами; 5) плаваніе на морѣ въ первый разъ безъ привычки; 6) обремененіе желудка пищею и 7) пьянство. По свойству работъ подвергаются этой болѣзни изъ поселянъ: точильщики, свѣчники, чесальщики и продавцы пеньки и льна, тряпичники и т. п.

Сущность непостижима.

Распознаваніе легко.

Предсказаніе въ головокруженіи, и относительно опасности для жизни и относительно продолжительности, *всегда хорошо*, потому что съ удаленіемъ причины производящей оно скоро проходитъ, особенно въ молодыхъ лѣтахъ; у взрослыхъ же оно нерѣдко угрожаетъ ударомъ (апоплексія).

Исходъ — единственный, въ слабость, которая въ короткое время проходитъ.

Лѣченіе требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ:

1) Въ предохраненіе отъ этой болѣзни должно совѣтовать вообще избѣгать вышеисчисленныхъ причинъ, производящихъ ее; 2) подвергшійся головокруженію долженъ воздержаться отъ пищи на все время, пока кружится голова. Если же откроется возможность принять больному пищу, то она должна быть въ маломъ количествѣ, растительная, удобоваримая, свойства соленистаго и слегка кисловатаго; самымъ лучшимъ питьемъ для него можетъ быть холодная вода. Она содѣйствуетъ къ скорѣйшему окончанію головокруженія. Огуречный рассолъ, бураковый квасъ (въ пьянствѣ или при запоѣ) составляютъ также хорошее питье въ этой болѣзни; 3) стараться удалить причину, производящую болѣзнь, потому что по удаленіи ея она обыкновенно очень скоро, — въ 2—3 часа, проходитъ, хотя бы развита была до высочайшей степени. У страждущихъ этою болѣзнію, не привыкшихъ къ мореплаванію, болѣзнь тотчасъ прекращается, какъ скоро сдѣлается тихо на морѣ. 4) Но если нельзя удалить производящую причину болѣзни, то въ такомъ случаѣ приносятъ пользу: употребленіе *холодной воды въ видѣ обмыванія головы; треніе висковъ, лба, позади ушей, затылка льдомъ, снѣгомъ* и какимъ либо *ароматнымъ спиртомъ; стягиваніе головы повязкою*, сколько можно крѣпче; охлажденный крѣпкій *мятный чай*, какъ одинъ, такъ и въ соединеніи съ *гобманскими каплями*, (10—15 на

стаканъ, или съ *селитернымъ сладкимъ спиртомъ*, (5—10—15 капель на стаканъ чая); употребленіе *горчичниковъ* (№№ 88, 89, 90) или *хриповниковъ* (№ 91) на руки, на ноги и на спину; припускъ *пѣвокъ* къ вискамъ; постановленіе *рожекъ* на затылокъ, между лопатокъ, *шерстяныя чулки* на голыхъ ногахъ, *ножныя ванны* съ горчицею (№ 84)

5) Если круженіе головы соединяется съ обморокомъ и безпамятствомъ, то врачи въ предотвращеніе удара немедленно назначаютъ *открыть кровь* больному, если онъ не молодыхъ лѣтъ и расположенъ къ апоплексіи, и ставятъ *промывательныя* (клизтиръ) (№ 95).

6) Что жь касается до лѣченія отъ этой болѣзни вышеозначенныхъ рабочихъ поселенъ, то нужно соображаться съ правилами и лѣченіемъ по ихъ быту, изложенными въ росписи (см. особо).

## Головная боль.

**О П Р Е Д ъ Л Е Н І Е.** Головная боль есть болѣзненное чувствованіе въ головѣ, обнаруживающееся тяжестью, ломомъ, біеніемъ, сверленіемъ, сжатіемъ, какъ бы въ тискахъ, жженіемъ, щемленіемъ, съ присоединеніемъ (въ высшей степени болѣзни) тошноты, даже рвоты и сонливости.

**Р а з д ѣ л е н і е.** Боль головы бываетъ: *первоначальная* (самостоятельная), непосредственно происходящая отъ болѣзнетворныхъ внѣшнихъ причинъ, и *послѣдовательная*, (припадочная) происходящая въ слѣдствіе другихъ болѣзней, при которыхъ она является, какъ припадокъ.

**П р и з н а к и** *первоначальной* головной боли состоятъ въ болѣзненныхъ перемѣнахъ, чувствуемыхъ собственно въ головѣ, въ слѣдствіе недавняго вліянія причинъ, производящихъ боль, въ *послѣдовательной* же они совокупны съ признаками тѣхъ болѣзней, отъ которыхъ происходитъ головная боль вообще; въ частности же давящая боль во лбу и въ затылкѣ зависитъ отъ насморка и лома въ лобныхъ костяхъ, а боль сверлящая въ тѣхъ же мѣстахъ головы происходитъ отъ гемороя. Боль въ темени, сверлящая какъ бы гвоздемъ и давящая, щемлящая въ половинѣ головы, свойственна истерикѣ и ипохондріи. Боль въ наружныхъ покровахъ головы бываетъ ревматическая, а въ покровахъ мозга и въ самомъ мозгѣ происходитъ отъ прилива крови, наростовъ, нагноеній, изліяній крови и проч. Боль отъ прилива крови къ головѣ наичаще бываетъ припадкомъ другихъ общихъ болѣзней: разныхъ лихорадокъ и горячекъ, воспаленій, острыхъ сыпей, расстройства пищеваренія; угара, похмѣлья, разныхъ болѣзней въ груди и животѣ.

**П р и ч и н ы** внутреннія составляютъ всѣ тѣ болѣзненные состоянія въ тѣлѣ, отъ которыхъ происходитъ головная боль послѣдовательная (припадочная).

**П р и ч и н ы** внѣшнія, производящія непосредственно головную боль, слѣдующія: простуда, угаръ, похмѣлье, продолжительное наклоненіе головы во время работъ, какъ то: — жатвы въ полѣ, на сѣнокосѣ, въ огородѣ и т. п.; дѣйствіе солнечнаго свѣта на открытую или покрытую чер-

нымъ платкомъ. голову; жаръ въ комнатѣ: угольные пары (у стиралухъ, кухарокъ и поваровъ); дурной воздухъ и противный запахъ (у повивальныхъ бабокъ, полотёровъ, свѣчниковъ или салотоповъ, крахмалыщиковъ и кожевниковъ); дурная погода (у охотниковъ); продолжительныя умственные занятія; продолжительное бдѣніе ночью; сильное движеніе въ жаркое время и усталость, ушибы головы, сотрясеніе мозга чрезъ паденіе на голову сноповъ, вязанокъ сѣна и т. п.; паденіе въ воду головою въ низъ съ высокаго мѣста и т. п.

Сущность головной боли заключается: со стороны динамической, въ болѣзненно-возвышенной чувствительности и раздражительности головного мозга и его нервовъ, а со стороны матеріальной — въ напорѣ крови въ мозговыхъ сосудахъ, съ присовокупленіемъ понятій о сущности всѣхъ тѣхъ болѣзней, отъ которыхъ она зависитъ, будучи послѣдовательною (припадочною) болѣзнію.

Распознаваніе головной боли вообще легко; но отличить *первоначальную* отъ *послѣдовательной* труднѣе, а еще затруднителнѣе распознаваніе послѣдовательной головной, по ея частнымъ видоизмѣненіямъ, какъ напр. геморoidalной, ревматической, истерической, ипохондрической, скорбутической, сифилитической, воспалительной и т. п.

Предсказаніе въ головной боли *первоначальной* зависитъ отъ степени и удобоотклоняемости причинъ, ее производящихъ, съ удаленіемъ которыхъ болѣзнь, если не перешла во внутреннее головное воспаленіе, обыкновенно скоро проходитъ; а въ *послѣдовательной* зависитъ отъ тѣхъ болѣзней, въ которыхъ головная боль бываетъ припадкомъ. Если головная боль зависитъ отъ внутренняго головного воспаленія, удара и т. п., то угрожаетъ непродолжительною опасностію для жизни больнаго. Если же головная боль происходитъ отъ органическихъ поврежденій головы, опухолей, наростовъ внутри черепа, грыжи мозга, костоѣды, язвъ, свищей и т. п., то опасность для жизни бываетъ еще опредѣлительнѣе для больнаго, хотя и не такъ скоро, какъ въ предъидущемъ случаѣ. Во всѣхъ другихъ болѣзненныхъ случаяхъ головная боль бываетъ менѣе опасна.

Исходы. Головная *первоначальная* боль, большею частію, переходитъ въ *здоровье*, за исключеніемъ рѣдкихъ неблагопріятныхъ случаевъ, гдѣ она переходитъ въ *другія болѣзни* и, чрезъ посредство уже ихъ, въ *смерть*.

Лѣченіе головной боли *первоначальной* (простой) состоитъ въ удаленіи причинъ, ее производящихъ, въ предохраненіи отъ оныхъ и въ успокоеніи болѣзненно-возвышенной раздражительности и чувствительности мозга и его нервовъ; по-этому лѣченіе должно быть *діететическое и существенное*.

Лѣченіе діететическое въ *первоначальной* головной боли требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Въ предосторожность отъ головной боли вообще нуженъ совѣтъ въ *избѣжаніе* вышеизложенныхъ *производящихъ причинъ* этой болѣзни; такъ напр. работники лѣтомъ

въ полѣ или огородѣ могутъ предотвратить головную боль, покрывая голову бѣлымъ платкомъ, бѣлою фуражкой, шапкою изъ полотна, простой соломой, сѣна, окачивая почаше голову холодною водою и не наклоняясь низко во время работы, а упомянутые выше рабочіе люди должны исполнять особыя, изложенныя для нихъ правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію. 2) Одержимому этою болѣзнію должно соблюдать простое, но важное правило: *голову держать въ холодъ, ноги въ тепло, а желудокъ въ голодь*. 3) Во всемъ прочемъ, если этого не будетъ достаточно, и болѣзнь будетъ воспалительнаго свойства, надлежитъ обратиться къ правиламъ діететическаго лѣченія внутренняго головнаго воспаления (см. особо въ классѣ воспаленій).

Лѣченіе существенное требуетъ, чтобы больному были — *прохлада, возвышенное положеніе головы, чистое обтираніе ея намоченнымъ въ уксусъ полотенцемъ, прикладываніе къ вискамъ и ко лбу свѣжихъ и квашеныхъ листовъ капусты, пластинокъ квашеной свеклы, пополамъ разбѣзанныхъ соленыхъ огурцовъ, или ихъ корокъ* внутреннею стороною къ тѣлу; (*корки свѣжаго лимона, приложенныя къ вискамъ до тѣхъ поръ, пока подъ ними покажутся желтоватыя пятна на кожѣ, имѣютъ превосходное дѣйствіе*), холстинокъ, намоченныхъ въ *холодной водѣ, смѣли, завернутаго въ полотенце*. Эти средства сначала производятъ пріятное впечатлѣніе на больнаго; употребленіе ихъ нужно продолжать до тѣхъ поръ, пока они не причинятъ озноба, дрожи или шемленія въ головѣ; въ послѣднемъ случаѣ онѣ снимаются съ головы и опять къ ней прикладываются при появленіи въ ней жара, тягости, біенія и проч. Но когда холодъ не помогаетъ, то можно посоветовать приставить *пъявки къ вискамъ, за ушами, поставить ноги въ горячую воду съ золою, горчицею* (№№ 83, 84), къ икрамъ, плечамъ, затылку прикладывать попеременно *горчичники* (№№ 88, 89, 90), *хрѣновники* (№ 91) до произведенія на кожѣ кумачной красноты, но не болѣе; а на затылокъ *нарывной пластырь* (№ 58). Внутрь давать больному холодную воду съ *селитрою* (золотникъ селитры на штофъ воды); *квасъ, огуречный разсолъ*, особенно при похмѣльѣ и угарѣ; *кисля цм, шипучіе порошки*, особенно когда тошнить и рветъ (№№ 11, 12); при запорѣ нанизъ *слабительное* изъ *простокваши, сыворотки* (№ 100), *огуречнаго разсола* (№№ 7, 128), *кваса* (№ 129), *толокна* (№ 72), отвара *корки крушины* одной (№ 74) и съ *горькою солью* (№ 75). Для привычныхъ къ промывательному, лучше ставить *клизтиръ* изъ *овсянаго отвара съ медомъ, мыломъ, солью и уксусомъ* (№ 95). Если всѣ эти средства окажутся безуспѣшными, то нужно обратиться къ врачу за совѣтомъ, за неимѣніемъ же его по близости должно брать предохранительныя мѣры противъ воспаления (см. внутреннее головное воспаление).

Прим. Головная боль *послѣдовательная*, какъ не самостоятельная и зависящая отъ другой болѣзни, которой она бываетъ однимъ изъ болѣзненныхъ признаковъ и принадлежитъ къ ней, какъ къ корню дерева, на коемъ растетъ отросткомъ, требуетъ уже искусства врача.



Простолюдины, при хронической головной боли, срываютъ «чемеръ» т. е. замотавъ два пальца въ волосы, противъ большаго мѣста, дергаютъ внезапно изо всей силы, такъ что, по всей вѣроятности, отрываютъ на этомъ мѣстѣ кожу отъ сухожильнаго растяженія. Мѣсто пухнетъ и подтекаетъ кровью; можетъ быть въ иныхъ случаяхъ это наружное отвлеченіе и доставляетъ временную помощь.

## Зубная боль.

**ОПРЕДѢЛЕНІЕ.** Зубная боль есть болѣзненное, болѣе или мѣнѣе сильное чувство въ одномъ или нѣсколькихъ зубахъ, обнаруживающееся стрѣляніемъ, раздираніемъ, нытьемъ, ломотою, сверленіемъ, иногда съ порчею зубовъ, и даже десень.

**РАЗДѢЛЕНІЕ.** Зубная боль бываетъ: 1) *первоначальная* (самостоятельная), происходящая отъ самыхъ зубовъ, въ слѣдствіе непосредственнаго вліянія на нихъ болѣзнетворныхъ причинъ, и 2) *послѣдовательная*, происходящая отъ другихъ болѣзней въ тѣлѣ. Первая подраздѣляется по свойству причинъ, ее производящихъ, а послѣдняя подраздѣляется по свойству болѣзней, отъ которыхъ она зависитъ.

Причины внутреннія суть: особенная раздражительность нервовъ зубныхъ, слабость сложенія, беременность у женщинъ, особенно первая половина, первые три или четыре мѣсяца, худосочія, остроты соговъ и всѣ болѣзни въ тѣлѣ, отъ которыхъ зависитъ часто зубная боль послѣдовательная, какъ-то: ревматизмъ (ревматизмная зубная боль), лихорадка (лихорадочная зубная боль), катарръ или флюсъ (катарральная зубная боль), цынга (цынготная зубная боль), испорченность желудка (желудочная зубная боль), глисты (глистная зубная боль), личная боль (личная зубная боль), истерика (истерическая зубная боль), геморрой (геморроидальная зубная боль) и т. п.

Причины внѣшнія, производящія зубную боль, слѣдующія:

1) Простуда, останавливающая испарину (у сукно-вальщиковъ) при нерадѣннн покрывать голову и неблагоуразумнн выставлать ее обнаженною за окошко, или не окутавшисъ выходить на вѣтеръ и т. п. 2) Слишкомъ холодныя, или слишкомъ теплыя, также сладкія пища и питье, равно какъ употребленіе кислаго питья, кислыхъ плодовъ, тѣмъ болѣе незрѣлыхъ, разстроивающихъ лазурь зубныхъ вѣнчиковъ (оскомина). 3) Наружныя насилія, повреждающія зубы, какъ-то: ударъ въ нихъ или ушибъ, глосаніе костей, раскусываніе или грызѣніе орѣховъ, щипленіе и жеваніе жесткихъ и твердыхъ тѣлъ, напр. веревокъ, ремней, кожи, древесныхъ сучьевъ и самаго дерева и т. п. чищеніе зубовъ шпилькою или иглою, булавою, вилкою и другими матааллическими вещами, разстроивающими зубную эмаль; остатки пищевыхъ веществъ, попавшія въ пустой зубъ, или завязшія между зубами, также излишнее нарощеніе винаго камня на зубахъ и между ними.

Сущность первоначальной зубной боли состоитъ въ раздраженіи (въ

легкой степени болѣзни) и воспаленіи (въ сильной степени) первовъ корней страждущихъ зубовъ съ большимъ или меньшимъ органическимъ разстройствомъ (порчею) послѣднихъ; въ сущность послѣдовательной зубной боли, сверхъ того, должны входить всѣ понятія о каждой болѣзни, отъ коей она зависитъ, и которая относится къ ней, какъ причина къ своему произведенію.

Распознаваніе зубной боли первоначальной отъ послѣдовательной основывается на признакахъ, отличающихъ одну отъ другой. Боль первого рода ограничивается однимъ или извѣстнымъ числомъ зубовъ и бываетъ всегда непрерывная. Но боль второго рода сообщается всѣмъ зубамъ обѣихъ челюстей, по временамъ усиливается и ослабѣваетъ. Оскомина отличается тѣмъ, что зубы дѣлаются не гладкими (тупыми) и, будучи прижаты одинъ къ другому, не скользятъ, но скрипятъ. Кромѣ того надобно имѣть въ виду, что зубная боль можетъ быть причиною флюса, а флюсъ можетъ быть причиною зубной боли, по этому и располагать лѣченіе прежде первенствующей болѣзни. Въ этомъ отношеніи у меня былъ замѣчательный случай въ практикѣ. Въ 1850 году въ Казани кн. Ч. просилъ меня помочь его женѣ. У нея была язва на щекѣ, не уступавшая никакимъ средствамъ. Я нашелъ, что эта язва была свищъ (фистула). Зубы ея по осмотру всѣ были, по видимому, здоровы, и она увѣряла, что у нея зубы никогда не болѣли и не болятъ, а была прежде флюсъ. Судя по цвѣтущему ея здоровью, я все таки подозрѣвалъ, нѣтъ ли причины такъ упорно продолжающейся болѣзни со стороны зубовъ, и потому посоветовалъ пригласить хирурга. Хирургъ Б. нашелъ, что дѣйствительно одинъ изъ коренныхъ зубовъ былъ тому причиною. Онъ выдернулъ этотъ зубъ, у котораго оказалось съ наружной стороны отверстіе въ дупло, и язва на щекѣ скоро зажила сама собою.

Предсказаніе въ первоначальной зубной боли зависитъ: 1) отъ степени болѣзни, такъ что зубная боль, происходящая отъ воспаленія зубнаго корня, очень мучительна, даже и опасна, а происходящая отъ раздраженія его, напротивъ, легка, сносна и безопасна. Въ послѣдовательной же зубной боли предсказаніе зависитъ во всемъ отъ коренной ея болѣзни.

Исходы: Въ *здоровье*, въ *другія болѣзни*, какъ-то флюсъ, нарывъ, язву, свищъ (фистулу), костоѣду, въ кровотеченіе (по выдернутіи зуба) и т. п.

Лѣченіе діететическое въ зубной боли требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Въ предохраненіе зубовъ отъ порчи *содержаніе* ихъ *въ чистотѣ* есть лучшая мѣра сберечь ихъ и избѣгать въ нихъ боли; для этого надлежитъ полоскать ротъ послѣ всякаго употребленія пищи теплою водою, между зубами чистить перышкомъ, соломинкою, стеблемъ травы, деревянною спичкою, а не шпилькой, булавкою. и т. п.; 2) Пустой зубъ набивать воскомъ, свинцомъ, золотомъ. 3) Сверхъ того беречь ихъ отъ простуды и другихъ вышеописанныхъ причинъ, производящихъ болѣзни. 4) Что же касается до сукновальщиковъ, часто подвер-

гающихся зубной боли, то для нихъ изложены особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лѣченіе существенное первоначальной зубной боли, состоитъ въ отвлеченіи притека мокротъ къ страждущей части, въ восстановленіи испарины и уничтоженіи самого раздраженія или воспаленія зубнаго корня. Для этого нужно, чтобы больной принялъ напередъ какое нибудь *слабительное*, напр. изъ *разсола* (№№ 7, 129), *кваса* (№ 129), *толокна* (№ 72), *сыворотки* или *простокваши* (№ 100), *отвара коры крушины* одного (№ 74) и съ *горькою солью* (№ 75), для свободнаго испражненія на низъ, отъ 2 до 3 разъ въ день, по принятіи котораго онъ долженъ чаще полоскать ротъ *наливкою шалфея, мянныихъ стьянъ, ромашки, просвирокъ*, смѣшанною съ *молокомъ, медомъ*: въ свободныя промежутки времени, класть на больной зубъ и десну отъ полосканія рта *вишнюю ягоду*, сваренную въ молоко, печеное яблоко и стараться произвести испарину употребленіемъ внутрь *потогоннаго чая* изъ *цветовъ липы, бузины, сухой малины* и т. п. Кромѣ того шею и щеки покрывать шерстянымъ платкомъ, ноги ставить въ *горячую воду съ золою и горчицею* или *хрѣномъ* (№№ 83, 84). Если боль мучительна и обозначаетъ воспаленіе, то велѣтъ припустить *пѣвицы* за ушами, къ щегѣ или деснамъ противъ болящаго зуба, смотря по степени притека къ нему крови отъ 2 до 6 штукъ. При этомъ нужно быть осторожнымъ и не назначать приставленія пѣвокъ при затевѣ, при пухлости, кровоточивости и дряблости десенъ; потому что это бываетъ только въ цынготномъ ихъ состояніи, въ которомъ вредно кровопусканіе, какаго бы рода оно ни было. При воспалительной зубной боли, сопряженной съ флюсомъ (припухлость внутренней смежной стороны щеки), при боли безъ воспаленія, зависящей отъ порчи зуба, послѣдній нужно осмотрѣть и очистить; а потомъ употребить средства, притупляющія чувствительность зуба: *коричневую настойку, масло, крѣпкій вишневый или камфорный спиртъ, камфорное масло* (№ 71). Средства эти употребляются въ видѣ капель, которыя впускаются въ больной зубъ прямо, или посредствомъ свертка хлопчатой бумаги, или чистой пакли. Иногда помогаетъ *нюханіе* крѣпкаго *нашатырнаго спирта*, нюханіе и куреніе *табаку*, прикладываніе къ зубу корня *жигунца* (слюногона), *окуриваніе* лица *сахаромъ, минеральнымъ магнитъ*, приложенный къ щегѣ, *клизмы* изъ *холодной воды* и *поваренной соли*. Врачи употребляютъ *капустное масло, настойку опія, самый опій, стрѣнный эфиръ, настойку испанскихъ мушекъ, мускуса*. Не очень давно начали употреблять для этого *настойку крозота*, котораго 2—3 капли впускаются въ зубъ. При употребленіи этихъ средствъ прямо на зубъ, нужно и отвлекать боль отъ зуба, прикладывая нарывной *пластырь* (№ 58) за ушами, *горчичники* (№№ 88, 89, 90) къ затылку, плечу, *хрѣновники* (№ 91) на плеча спереди, у ручной висти, толченый *лукъ* на щеку, печеный *чеснокъ* на руку, въ ухо.

Лѣченіе зубной боли послѣдовательной отъ другой болѣзни, тре-

буетъ приглашенія врача, за недостаткомъ котораго надобно употреблять средства, означенныя въ каждой соимянной зубной болѣзни, какъ-то: ревматической, цынготной, лихорадочной (см. ревматизмъ, цынга, перемежающаяся лихорадка и пр.). При слабости желудка иногда нѣсколько съѣденныхъ зеренъ горчицы, или кусочекъ стертаго хрѣна, уничтожаетъ зубную боль, а въ засореніи его пищею (обозначающемся испорченнымъ вкусомъ и нечистымъ языкомъ) рвотное часто оказываетъ превосходное дѣйствіе; но для этого нуженъ совѣтъ врача. Вообще зубная боль прекращается очень трудно, упорствуетъ, кажется, самому успѣшному лѣченію и вдругъ проходитъ при употребленіи, по видимому, ничтожнаго лѣкарства, а потому не должно пренебрегать никакимъ совѣтомъ и лѣкарствомъ, сколько бы они ни казались бесполезными.

Между простымъ народомъ зубная боль излѣчивается часто тою же магнитическою силою прикосновенія, какъ и свинуха (см. золотуха и лѣченіе свинухи), но чаще «заговоромъ». Я зналъ одну крестьянскую женщину, къ которой въ моемъ присутствіи обращалось множество поселянъ, страдающихъ зубами, и она всѣмъ имъ помогала, чему я былъ свидѣтелемъ. Метода лѣченія ея состоитъ въ слѣдующемъ: она беретъ щепоть соли, кладетъ ее въ ветوشку, подноситъ ближе ко рту, крестится три раза и говоритъ про себя шопотомъ: «Благослови Господи и научи мя оправданіемъ Твоимъ! Есть на свѣтѣ три царя: одинъ царь мѣсяць на небѣ, другой царь медвѣдь въ лѣсу, третій царь камень въ водѣ; всѣ три царя сойдитесь, посудите, и рабу Божию (слѣдуетъ имя больной) отъ зубной боли освободите». Повторивъ это трижды, она, оборотившись назадъ, трижды отплеивается, наконецъ, завернувъ частичку соли въ узелокъ, кладетъ на больной зубъ, а остальную соль даетъ больной или больному на домъ на всякій случай впередъ. Я увѣрялъ ее, что при этомъ заговариваніи помогаетъ соль, но она мнѣ доказывала, что и безъ соли, даже безъ ничего и заочно, лишь бы знать имя больной, можетъ такимъ же образомъ помогать отъ зубной боли.

## Ночная, куриная слѣпота.

**О п р е д ѣ л е н і е.** Ночная слѣпота есть такого рода болѣзнь, въ которой больной днемъ видитъ совершенно, но вечеромъ — при свѣчѣ, или при лунномъ свѣтѣ — не можетъ различить предметовъ, или видитъ ихъ, только смѣшанно и не ясно; поутру зрѣніе бываетъ обыкновенно не ясное, въ полдень совершенное, вечеромъ слабое, а ночью прекращается.

**П р и з н а к и** этой болѣзни очень явственны изъ опредѣленія; къ нимъ слѣдуетъ присовокупить еще то, что этотъ недугъ обыкновенно соединяется съ болью и тяжестію головы и съ періодическими болями въ разныхъ частяхъ тѣла, увеличивающимися къ вечеру, и часто предшествующими приступу болѣзни; иногда больной, особенно при наклоненіи, страдаетъ головокруженіемъ; нерѣдко присоединяются припадки полнокровія, желудочныхъ и желчныхъ нечистотъ. Продолжается эта болѣзнь

неопредѣленно. Будучи предоставлена самой себѣ, она рѣдко продолжается болѣе 3—4 мѣсяцевъ; а надлежащему лѣченію часто уступаетъ въ нѣсколько дней; иногда она чрезъ годъ возвращается въ тоже время; вообще возвраты бывають часты въ мѣстахъ, гдѣ она господствуетъ повально.

Причины курной слѣпоты доселѣ не опредѣлены. Д-ръ Веллеръ полагаетъ, что холодный воздухъ весною поутру и вечеромъ можетъ причинить ее. Многіе полагають, что великое пошеніе поселянъ бываетъ причиною, что они подвергаются этой болѣзни, но они страдаютъ этимъ порокомъ глазъ очень долго и послѣ поста, даже до самаго лѣта. Въ иные годы болѣзнь эта поражаетъ ихъ эндемически (мѣстно-повально). Миѣ часто доводилось видѣть, какъ поселяне, всякаго возраста, исключая дѣтей, болѣе мужчины нежели женщины, сцѣпившись вмѣстѣ, вереницею, подъ руководствомъ вожатыхъ съ обѣихъ сторонъ, идутъ къ заутрени въ первый день Пасхи, какъ совершенные слѣпцы.

Сушность состоитъ въ особомъ (*sui generis*) страданіи нервной сферы глаза.

РАСПОЗНАВАНІЕ легко.

ПРЕДСКАЗАНІЕ относительно опасности жизни *безопасно*; относительно же продолжительности — она не продолжается болѣе 3—4 мѣсяцевъ.

ЛѢЧЕНІЕ. Поселяне во многихъ мѣстахъ излѣчивають ее употребленіемъ въ пищу *тѣтушней* или *свинячей печени*, также парами изъ свареной *бычачей желчи*, надъ которыми они, наклонясь головою, держатся прямо, противу ихъ, глазами. Бурденъ многихъ солдатъ, страдавшихъ ночью слѣпотою, вылѣчивалъ безъ возврата, *омывая затылокъ* теплымъ *уксусомъ* и прикладывая къ нему *липкій пластырь* въ ладонь величиною, покрытый *мазью рвотнаго камня* (№ 79). При второмъ приложеніи таковаго пластыря болѣзнь уже пропадала, и зрѣніе возобновлялось. При засореніи желудочномъ и желчномъ (языкъ не чистъ, буръ или бѣлъ, мокротень, горечь во рту, безапетитца) помогаетъ *рвотное* изъ *рвотнаго камня* (№ 184).

## Ипохондрія (хандра).

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Ипохондрія есть высшая степень меланхоліи у мужчинъ и обнаруживается безпорядкомъ соображенія, разсудка и воли, при сопутствующемъ инстинктивномъ отвращеніи къ большому или меньшему числу предметовъ, очень пріятныхъ для здороваго.

ПРИЗНАКИ этой болѣзни у разныхъ поселянъ, по ихъ быту и возрасту, бывають очень различны. Обыкновеннѣйшая форма болѣзни есть слѣдующая: пріимчивость тупая, соображеніе сбивчивое, разсудокъ превратный, такъ что предметы, самые выгодные для больнаго, кажутся ему вредными, опасными, ненавистными; люди, прежде любимые, и обругающіе его съ доброю цѣлю, представляются ему не только подозритель-

ными, а даже злодѣями, тайно противъ его злоумышляющими; аштитить малый, пищевареніе слабое, медленное, испражненія на низъ неправильныя, лицо блѣдное, кровообращеніе слабое, медленное, теплота уменьшена, частый водянистый потъ, либо поносъ; сильное желаніе уединенія, иногда безпорядокъ бываетъ только при обнаруживаніи дѣйствій разсудка, съ совершеннымъ соображеніемъ. Иногда неправильно дѣлается одна память, такъ что больной не помнитъ даже того, что было за полчаса или за часъ, бываетъ то угрюмъ, мраченъ, суровъ, задумчивъ и склоненъ къ самоубійству, то, напротивъ, веселъ и вмѣсто уединенія стремится въ общество, которое, что называется, по немъ, и бываетъ расположенъ къ уничтоженію его мнимыхъ враговъ какимъ бы то образомъ ни случилось. Иногда ипохондрикъ ѣсть много; лицо вмѣсто блѣднаго имѣетъ красное и надутое, нерѣдко угреватое и съ красными шишками; вмѣсто медленнаго и слабаго кровообращенія бываетъ скорое и сильное, сопровождающееся нерѣдко носовымъ кровотеченіемъ. Болѣзнь эта бываетъ и постоянною, непрерывною, и періодическою. Періодическое появленіе болѣзни бываетъ также различно: у однихъ она обнаруживается въ жаркое, у другихъ въ холодное, чаще же въ сырое, сумрачное, полухолодное время.

Причины внутреннія (предрасполагающія): меланхолическій темпераментъ и завалы брюшныхъ внутренностей, особенно печени, селезенки и брыжеечныхъ желѣзъ, въ слѣдствіе продолжительныхъ лихорадокъ, которымъ такъ часто подвергаются поселяне и страдаютъ не только по нѣсколькѣ мѣсяцевъ, даже по нѣсколькѣ лѣтъ.

Причины внѣшнія (производящія) сѣтъ: угнетающія страсти: досада, забота, горестъ, отчаяніе, безнадежная любовь, оскорбленное самолюбіе, изнуреніе отъ непомѣрныхъ трудовъ. Поселяне причисляютъ эту болѣзнь къ порчѣ, противъ которой они до того бываютъ мнительны, что по справедливости нѣкоторые считаютъ ихъ нервными людьми. Подвергаются этой болѣзни изъ поселянъ въ зрѣлыхъ возмужалыхъ лѣтахъ отъ 20—50 лѣтъ, большею частію: 1) люди бѣдные, не имѣющіе способовъ къ достаточному пропитанію, глубоко проникнутые чувствомъ своего несчастія, живущіе заработкою или цѣлому мірскому обществу, уплачивающему за нихъ подати и строго съ нихъ за все взыскивающему, или въ зажиточныхъ домахъ, ссужающихъ ихъ въ житейскихъ нуждахъ. Такъ мнѣ извѣстно нѣсколько случаевъ: одинъ пастухъ табуна мірскихъ лошадей, бывъ безпрестанно упрекаемъ за его небрежность, подвергшись хандрѣ, долгое время грустилъ и, желая постоянно себѣ смерти, изнурялъ себя голодомъ. Наконецъ, какъ то ему показалось, что въ табунѣ, имъ пасомомъ, не достаетъ двухъ лошадей, и онъ повѣсилъ въ полусидячемъ положеніи на кушакѣ своемъ, внутри любимаго имъ стога сѣна, стоявшаго на одномъ изъ лучшихъ мѣстоположеній, подъ которымъ онъ, мечтая, проводилъ большую часть времени дня и спалъ ночью. Мертвое тѣло его найдено было скоро потому только, что собачка, неотлучно съ нимъ всегда бывшая, оставалась у того стога около 3-хъ су-

токъ. Другой пастухъ рогатаго скота, тоже убитый горестью за безпрестанные попреки и побои, что онъ дурно пасеть, что скотина часто заходить въ хлѣбъ, топчетъ и поѣдаетъ послѣдній, а онъ не видитъ, но, утѣшаясь несбыточными мечтами своей любви, былъ счастливъ, пока это чувство еще грѣло его. У него была любимая береза, подъ тѣнью которой онъ мечталъ, плелъ себѣ вѣнки, пѣлъ на свирѣли и былъ доволенъ, живя въ полѣ и не любя деревню, въ которой его очень часто били по вышеупомянутой причинѣ. Но когда обстоятельства открыли ему, что любовь его безнадежна, мечты его несбыточны, съ тѣхъ поръ онъ не пѣлъ болѣе на свирѣли, не плелъ себѣ вѣнковъ, разлюбилъ березу, срубилъ ее до половины и не явился уже болѣе въ деревню. Другая деревня загнала его стадо коровъ, зашедшихъ въ хлѣбъ, къ себѣ, требовала за потраву хлѣба выкупу; и когда его стали искать, то нашли повѣсившимся на полусрубленной имъ березѣ въ петлѣ длиннаго его гнута, свитаго изъ тѣхъ веревокъ, которыя давала ему его дульщина на пути для ногъ ея коровы. Еще былъ случай съ пастухомъ овечьаго стада, который по задумчивости своей часто не могъ доглядѣть, какъ волки похищали пасомыхъ имъ овецъ. Общество мѣрское къ нему было очень за это строго, и онъ не зналъ что дѣлать. Разъ какъ-то онъ замѣтилъ (ужь нельзя было не замѣтить), что волки въ глазахъ его пожирали нѣсколько овецъ. Пастухъ, вмѣсто того, чтобы прогнать волковъ или бѣжать въ деревню и взять къ себѣ въ помощь кого-либо, если одинъ ихъ боялся, скрылся неизвестно куда, такъ что не могли его нигдѣ найти до тѣхъ поръ, какъ изъ одного дома той деревни объявили, что въ печкѣ бани ихъ, стоящей отдаленно отъ жительства на концѣ огорода, есть мертвый человѣкъ. Это былъ пастухъ, задохшійся, одѣтый, разбухшій, такъ что нельзя было его иначе вытащить, какъ сломавъ всю печь. Такіе примѣры въ быту поселянъ нерѣдки. Но бываютъ у нихъ и другіе, имъ подобны: одинъ крестьянинъ, живя долгое время въ одномъ зажиточномъ крестьянскомъ домѣ (около 4 лѣтъ) работникомъ, получалъ частые и жестокіе побои за то, что онъ не такъ дѣлаетъ, какъ ему приказываютъ; считали его упрямымъ, бслушникомъ и т. п., но держали его и не отказывали отъ мѣста, потому что, вмѣстѣ съ другими, или съ самимъ хозяиномъ, смотря безпрестанно какъ они, такъ и онъ старательно работалъ, а какъ скоро заставятъ одного что нибудь сдѣлать, онъ скорѣе все испортитъ, чѣмъ сдѣлаетъ. Причиною было то, что онъ никогда не выслушивалъ хорошенько, что ему приказываютъ, а если и выслушивалъ, то тотчасъ же забывалъ отъ того, что слишкомъ былъ проникнутъ и озабоченъ душою о тайной любви своей къ дочери хозяина, безъ всякой причины и повода къ тому, кромѣ того только, что, когда онъ плакивалъ отъ побоевъ, она говаривала ему въ утѣшеніе: «не плачь, не плачь, будешь хорошо дѣлать и тебя будутъ любить». Эти слова дочери для него были выше всего въ мѣрѣ, но онъ нисколько отъ нихъ не исправлялся, а становился еще болѣе и болѣе беспорядочнымъ; особенно, когда приходилъ молодой холостой сосъдь, котораго всѣ ласкали, и дочь его кормила и сестрамъ его посылала

съ нимъ, какъ подругамъ, разныхъ гостинцевъ, напр. ленешекъ, ватрушекъ и т. п. онъ совершенно терялся, ничего не слыхалъ и не помнилъ, что ему говорятъ въ то время, краснѣлъ, ворчалъ, а когда велить ему идти на дворъ что нибудь сдѣлать, онъ ходилъ по двору и чѣмъ ни попало билъ скотину, то лошадей, то коровъ и т. п. Весною на сходьбищахъ нѣкоторые узнали тайну его сердца и ревность отъ нея; одинъ изъ нихъ подстрекнулъ его словами «я бы на твоёмъ мѣстѣ далъ ему карачунъ»; съ тѣхъ поръ работникъ тотъ сталъ, повидимому, спокойнѣе, лучше, и порядочнѣе занимался работою, но завелъ при себѣ ножъ, который носилъ всегда на поясѣ привѣшеннымъ въ ножнахъ, какъ обыкновенно носятъ многіе поселяне, особенно работники, для всякаго случая. Точить этотъ ножъ было его первою страстію, такъ что острѣе его ножа не было въ домѣ, оттого нерѣдко домашніе обращались къ нему за ножомъ и даже хвалили, что у него ножъ такой острый. Ему это нравилось. Разъ онъ былъ особенно веселъ, и вскорѣ распространился слухъ, что на задахъ улицы найденъ убитымъ тотъ молодой холостой сосѣдь ихъ, съ которымъ дочь хозяина посылала его сестрамъ, своимъ подругамъ, разныхъ разности. «Бѣто бы это и за что?» съ сожалѣніемъ говорили всѣ въ домѣ? — Видно, есть за что, отвѣчалъ работникъ весело и смѣло. Всѣ съ удивленіемъ обратились къ нему, смотрѣли на него съ ужасомъ, но онъ ничего болѣе не говорилъ, и только дочери хозяина разсказалъ обо всемъ, восторженнымъ образомъ, когда она одна спросила его объ этомъ, и просилъ никому не сказывать, иначе ему будетъ плохо. Онъ былъ взятъ къ суду и вездѣ, гдѣ только его допрашивали, онъ воодушевленно разсказывалъ объ этомъ, только каждый разъ болѣе или менѣе различно. Разность эта относилась къ прикрасамъ и удалству, которыми онъ какъ бы хвастался. Но вообще все было слишкомъ удачно задумано, чтобы успѣть совершить это убійство одному, безъ вѣдома кого нибудь, кромѣ дочери хозяина, какъ любимаго имъ всею страстію его сердца предмета. Подробности убійства тутъ не къ мѣсту. Важнѣе же всего то, что по испытаніямъ его душевныхъ способностей, неоднократно надъ нимъ дѣланнымъ, оказалось, что онъ не подходилъ ни подъ какой видъ умопомѣшательства; между тѣмъ беспорядочныя дѣйствія его въ продолженіе четырехлѣтняго работничества въ одномъ и томъ же домѣ, вполне выражающія форму болѣзни ипохондрической, отъ горести по причинѣ частыхъ побоевъ, и отъ страсти, для него неумѣстной, долженствующей для него быть тайною, — какъ и было до послѣдней весны.

2) Но эта болѣзнь постигаетъ не однихъ бѣдныхъ, а въ зажиточныхъ сельскихъ домахъ нерѣдко случается и у тѣхъ несчастныхъ членовъ семейства, которыхъ, по чему либо, безъ видимой и достаточной причины, унижая передъ другими, непрерывно обижаютъ во всемъ и гонятъ, что называется, съ лица земли. Такъ напр. желчная мачиха, предпочитая своихъ дѣтей пасынгамъ, ненавидитъ послѣднихъ, какъ бы хороши они ни были, всячески старается избавиться отъ нихъ, если нельзя имъ, почему либо, раздѣлиться. Есть и другія причины, о которыхъ излишне



здѣсь распространяться. 3) Между финскими народами, какъ-то: чувашами, черемисами, мордвою и вотяками эта болѣзнь случается нерѣдко и доводитъ до самоубійства. Такъ какъ господствующая страсть у этихъ народовъ есть мщеніе, то страдающій этою неудовлетворенною страстію живетъ и мучится, сохнетъ, хандритъ, дѣлается плохимъ хозяиномъ дома своего, скучнымъ и бесполезнымъ членомъ семейства, сварливымъ мужемъ, и наконецъ, потерявъ надежду мщенія въ этой жизни, переходитъ къ мысли мстить за гробомъ. вѣшается на воротахъ, на дворѣ, гумнѣ, шалашѣ и т. п. своего противника, чтобы сдѣлать ему бѣду, либо застрѣливается, если охота была причиною невыносимой обиды и т. п. Хотя это уже нынѣ выводится и присутствіе суда не составляетъ уже большой бѣды, но при всемъ томъ случаи эти все таки бывають не рѣдки, какъ остатки прежнихъ безразсудныхъ обычаевъ. 4) Между сельскими учеными (писарями) ипохондрія встрѣчается нерѣдко. Двое писарей, занимаясь обученіемъ мальчиковъ въ одной конторѣ большого владѣльческаго селенія, были особенно заняты своею ученостію, болѣе, чѣмъ кто либо изъ профессоровъ своею каедрю; но, не видя никакого поощренія въ трудахъ своихъ, кромѣ одного и того же, однажды навсегда положеннаго имъ жалованья и содержанія, одинъ изъ нихъ сталъ грустить, потому что онъ владѣльческій и, слѣдовательно, не можетъ восходить къ высшимъ почестямъ; будучи всегда трезвъ, онъ становился, время отъ времени, блѣднѣе, задумчивѣе, неправильнѣе въ образѣ мыслей, забывчивѣе, и на 24 году отъ роду, во время весны, ночью всталъ потихоньку отъ другихъ, вышелъ на дворъ, приставилъ лѣстницу къ дому конторы, съ вечеру имъ же приготовленную, и повѣсилъ на ней. Другой, найдя себѣ развлеченіе въ употребленіи спиртныхъ напитковъ, черезъ 10-ть лѣтъ послѣ умеръ, лежа, по принятому имъ обыкновенію, у питейнаго дома. Но вотъ важный случай: одинъ волостной писарь до того былъ молчаливъ, особенно у себя дома, что жена его постоянно подозрѣвала его въ невѣрности, и потому, каждый разъ, какъ онъ приходилъ домой откуда бы то ни было, она осыпала его ругательствами всякаго рода; но онъ, по обыкновенію, всегда молчалъ и занимался чѣмъ приходилось: если приходилъ поздно ночью, то ложился спать, если передъ обѣдомъ, то садился обѣдать, и т. п. Когда онъ бывалъ трезвъ, то будто не видѣлъ и не слышалъ жену, тогда ея брань на него не дѣйствовала; но, пьяный, онъ былъ раздражителенъ противъ напрасныхъ упрековъ ея, и разъ, какъ она напустилась на него, поздно пришедшаго изъ гостей, то онъ принялся на нее кричать; когда это нисколько не помогло, а еще болѣе раздражало жену его, и она еще сильнѣе начала бранить его, ругать всячески и упрекать любашками, онъ, не говоря болѣе уже ни слова, взявъ острый ножъ, преспокойно растегнулся, съ одного разу отрѣзалъ у себя дѣтородныя части совѣмъ съ мошонкою, бросилъ ихъ женѣ, говоря «на! возьми и будь покойна!» Когда онъ привезенъ былъ въ г. Чистополь въ больницу, то говорилъ, что ему хочется лучше въ Сибирь, чѣмъ жить здѣсь и быть съ женою. Онъ роста высокаго, лицомъ

блѣденъ, былъ очень худъ и мраченъ; но по выздоровленіи отъ раны пополнилъ и сталъ веселѣе.

Сущность ипохондріи состоитъ иногда въ угнетенной, иногда въ возвышенной, но всегда въ беспорядочной дѣятельности нервной системы вообще и въ частности мозга. Къ сущности ипохондріи должны быть отнесены и тѣ матеріальныя болѣзненные состоянія, кои представлены выше, какъ причины внутреннія — предрасполагающія.

Распознаваніе въ обыкновенной формѣ болѣзни не трудно; но по нѣкоторымъ припадкамъ ипохондрія близко подходит то къ задумчивости (меланхоліи), то къ сумасшествію, то къ бѣшенству, и потому въ этихъ случаяхъ распознаваніе дѣлается затруднительнымъ. Впрочемъ сходство такого рода болѣзней по ихъ формѣ всегда предполагаетъ сходство по ихъ сущности; слѣдовательно большой ошибки въ лѣченіи не будетъ.

Предсказаніе. Въ ипохондріи, происшедшей по закону динамическому, т. е. отъ однихъ внѣшнихъ, вышенчисленныхъ производящихъ причинъ, предсказаніе не опасно для жизни; если же она произошла по закону органическому, т. е. отъ внутреннихъ вышенчисленныхъ располагающихъ причинъ при содѣйствіи, или безъ онаго, со стороны причинъ производящихъ, то предсказаніе можетъ быть опаснымъ, смотря по свойству и важности органическихъ разстройствъ. Между тѣмъ ипохондрія динамическая долѣе продолжается и труднѣе вылѣчивается, нежели органическая.

Исходы: въ здоровье, въ другія болѣзни ума, иногда въ смерть.

Лѣченіе требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Въ ипохондріи динамической отъ несчастія и заботъ, наводящихъ грусть, уныніе и отчаяніе на бѣдныхъ людей въ сельскомъ мірскомъ обществѣ, угнетающемъ и порабащающемъ ихъ неимоверною строгостію, нѣтъ ничего приличнѣе для священника, какъ укрѣплять и успокоивать ихъ внушеніями священныхъ правилъ вѣры, по которымъ и общество сельскаго міра, какъ вообще, такъ и въ частности, должно пещись объ участи бѣднѣе, помогать имъ, предоставлять способы и средства, болѣе или менѣе удобныя къ ихъ жизни. Въ случаѣ неспособности ихъ однихъ, самихъ по себѣ, къ работѣ, не ожесточать и не вводить ихъ въ большее отчаяніе строгимъ за то взысканіемъ, но мѣрами кротости и благоразумія заставлять болѣе поощреніемъ ихъ дѣлать то, къ чему они бываютъ болѣе способны, и не однихъ, а вмѣстѣ съ другими, причемъ больше имъ будетъ развлеченія и охоты къ занятіямъ въ слѣдъ за другими; уединеніе же вредно, какъ для нихъ самихъ, такъ не можетъ быть полезно съ съ ихъ стороны и другимъ. Кромѣ того совѣтовать отклонять всѣ случаи и поводы къ дѣйствию угнетающихъ страстей; а если вліяніе ихъ уже возродилось, то прекращать тотчасъ же всѣми возможными мѣрами, имѣя въ виду, что веселость и спокойствіе души составляютъ два очень важные предмета въ этой болѣзни, такъ какъ и тѣлодвиженіе, какаго бы рода оно ни было. 2) Въ продолженіе лѣта ипохондрикамъ много можетъ

принести пользы купанье въ рѣкѣ и въ морѣ; а зимою обливаніе холодною водою, равно и треніе всего тѣла щетками или суровою холстиною; пища должна быть хорошаго качества, наравнѣ съ прочими жилищными поселянами, какъ-то: щи, кашница, похлебка, мясо жареное и холодное съ хрѣномъ, каша, пироги и проч. А питье — хорошій квасъ и вода. Весною путешествіе ко святымъ мѣстамъ вмѣстѣ съ другими богомольцами бываетъ отличнѣмъ средствомъ къ ихъ успокоенію, словомъ лѣченіе ипохондріи динамической, происшедшей вслѣдствіе причинъ психическихъ, состоитъ въ искусномъ убѣжденіи разума больного, въ доставленіи больному занятій предметами, дѣйствіе которыхъ должно быть противоположно дѣйствію страстей, произведшихъ болѣзнь, и во всякомъ случаѣ склонять его къ упованію въ святой пекущейся объ насъ Промыслъ Всевышняго существа, отъ котораго все зависитъ, при которомъ все бываетъ къ лучшему, и потому каждый изъ насъ, если хочетъ быть истинно счастливымъ, долженъ быть доволенъ своею участію, безъ чего нѣтъ счастья на землѣ ни для кого. Что касается до финскихъ вышеупомянутыхъ племенъ, то разными совѣтами и средствами должно стараться истреблять въ нихъ злопамятность и духъ мщенія, внушая имъ, что злопамятность истощаетъ душевныя силы, причиняетъ продолжительныя упорнѣйшія болѣзни и, мало по малу разрушая здоровье, ввергаетъ въ пучину бѣдъ, несчастій, страданій и въ челюсти самой смерти; напротивъ, ничто такъ не показываетъ величія души, какъ прощеніе обидъ: оно сохраняетъ покой въ обществѣ, облегчаетъ, содѣйствуетъ къ сохраненію здравія, и ведетъ насъ къ счастью. Въ ипохондріи органической, т. е. если страдающій этою болѣзнію когда либо долгое время страдалъ лихорадкою, или замѣчены будутъ въ бокахъ подъ ребрами у него завалы: въ печени (въ правомъ подреберьѣ), или въ селезенкѣ (въ лѣвомъ подреберьѣ), или тугость живота противъ пупка, періодическія боли въ этихъ мѣстахъ, частые запоры на низъ, ворчанія въ животѣ, то въ такомъ случаѣ должно совѣтовать употреблять *въ питье* хорошую свѣжую холодную воду, *сыворотку*, водяной *настой* ягодъ *рябины*, *настой* сухой *коры крушины*; *пищу* не сырую изъ огородныхъ овощей, но *вареную*, какъ *растительную*, такъ и *мясную*. Изъ лѣкарствъ болѣе всего въ этомъ случаѣ полезны разрѣшающе-слабительныя *отвары корней: одуванчика, цикория, пырея, мыльнянки, репейнаго* (№№ 1, 2, 3, 4, 5), одни и съ *мятой* (№№ 17, 18, 19, 20, 21), также употребленіе порошка изъ *ревеня съ кремортартаромъ и магнезіею*, чтобы разрѣшить завалы, уничтожить причину болѣзни, безъ чего доступно только облегчать болѣзнь, а вылѣчивать ее бываетъ невозможно и для самыхъ искусныхъ врачей.

## Кашель.

Опредѣленіе. Подъ названіемъ кашля разумѣется судорожное движеніе воздухоносныхъ органовъ и грудной кѣтки, сопровождаемое боль-

шимъ или меньшимъ звукомъ, происходящимъ отъ порывистаго изверженія воздуха изъ легкихъ.

Раздѣленіе. Кашель бываетъ. 1) *Сухой*, безъ изверженія мокроты, который есть ни что иное, какъ воспаленіе дыхательнаго горла (см. это воспаленіе). 2) *Мокрый*, съ изверженіемъ мокроты, который есть ничто иное, какъ грудной катарръ, особенно горловой. 3) *Кровавый* съ изверженіемъ крови (см. кровохарканіе). 4) *Судорожный* (см. коклюшъ). 5) *Нервный*. 6) *Желудочный*.

Признаки нервнаго кашля: кашель сухой съ перхотою, рѣдко съ изверженіемъ мокроты; отъ бѣга, разговора и другихъ разгоряченій тѣла, онъ не только не усиливается, но еще утихаетъ; но страсти: радость, испугъ, гнѣвъ и проч. легко возбуждаютъ его.

Причины внутреннія (предрасполагающія): слабое, особенно чахоточное, сложеніе.

Причины внѣшнія (производящія): мельчайшія частицы пыли, мѣха, шерсти, бумажной пряжи, льна, пеньки, муки, земли, которыя во время дыханія попадаютъ въ дыхательное горло и поражаютъ нервы грудные, также излишнее и частое употребленіе спиртныхъ напитковъ. Ему подвержены: 1) скорняки, одѣяльщики, вязальщики, шерстобиты, прядильщики хлопчатой бумаги, чесальщики льна; 2) расчесывальщики шерсти; 3) чесальщики и продавцы пеньки и льна, 4) сѣятели, мѣятели, молотильщики, вѣятели зерноваго хлѣба и крупяники или круподеры, 5) также привычные пьяницы.

Предсказаніе въ этомъ кашлѣ опасно для жизни, потому что онъ, по склонности къ переходу въ чахотку, всегда угрожаетъ ею.

Сущность его состоитъ въ пораженіи нервовъ дыхательныхъ органовъ.

Признаки желудочнаго кашля: свободное дыханіе, разговоръ, ходьба, бѣгъ, глубокое вдыханіе его не возбуждаютъ; но онъ усиливается во время жажды, послѣ ѣды, во время пищеваренія, которое при томъ совершается съ трудомъ; больной послѣ употребленія пищи и въ маломъ количествѣ чувствуетъ тягость и давленіе подъ ложечкою.

Причины внутреннія (предрасполагающія) состоятъ въ болѣзненной раздражительности желудка; нерѣдко глисты.

Причины внѣшнія (производящія): продолжительное сидячее согбенное положеніе тѣла; неудобоваримая, тяжелая, жирная, масляная, либо сырая неувареная и невыпеченная пища, невыброженное питье и т. п. Этому кашлю подвержены по быту работъ изъ поселянъ особенно: 1) портные; 2) швеи, вышивальщицы, штопальщицы; 3) сапожники и башмачники.

Распознаваніе легко.

Сущность состоитъ въ слабости желудка и возвышенной его чувствительности.

Предсказаніе, относительно опасности для жизни, *хорошо*; от-

носительно продолжительности *неопредѣленно*; иногда скоро проходить, а иногда продолжается очень долго.

**Лѣченіе** въ нервномъ кашлѣ, состоящее изъ соблюденія правилъ, предохранительныхъ отъ этой болѣзни, содержанія себя относительно пищи и питья и употребленія простыхъ врачебныхъ средствъ, показано для каждаго изъ вышеназванныхъ поселянъ по свойству ихъ работъ *въ особомъ описаніи* въ концѣ этого лѣчебника. Чтожь касается до привычныхъ пьяницъ, у которыхъ бываетъ этотъ кашель по утрамъ, съ перхотью, тошнотою, даже рвотою, чаще сухой, чѣмъ съ мокротою, то для нихъ главное средство есть *воздержаніе* отъ спиртныхъ напитковъ; они должны при этомъ употреблять утромъ и вечеромъ холодный чай изъ *тысячелистника* и *трелистника*, *горечавки*, *полыни*, и постоянно продолжительное время заниматься въ саду, полѣ, огородѣ; сверхъ того вода, перегнанная изъ *корки черемухи*, *вишневыя* и *персиковыя косточки*, *листья вишневаго лавра*, принимаемая по 20—40 и болѣе капель 2—3 раза въ день, оказываетъ существенную пользу въ этомъ кашлѣ.

**Лѣченіе** въ желудочномъ кашлѣ, состоящее въ соблюденіи правилъ предохранительныхъ, содержанія себя и употребленія въ случаѣ простыхъ врачебныхъ средствъ, относительно вышеназванныхъ поселянъ по свойству работъ ихъ, показано *въ особомъ*, для каждаго изъ нихъ, *описаніи* въ концѣ этого лѣчебника. Сверхъ того здѣсь полезны: сначала *нашатырь съ виннымъ камнемъ* (кремортартаромъ) безъ ревеня (№ 65), даваемый въ теченіе 2—3 дней; а потомъ *рвотное* изъ *рвотнаго камня* (№ 184); и наконецъ опять *нашатырь съ кремортартаромъ и ревенемъ* (№ 65). Для поправленія желудка очень полезенъ *холодный чай* изъ *тысячелистника*, *трелистника*, утромъ и вечеромъ, по чашкѣ въ теченіе нѣсколькихъ недѣль. Если желудочный кашель зависитъ отъ глистовъ, то ихъ нужно удалить приличными средствами.

## Трепетаніе сердца.

**Опредѣленіе.** Трепетаніемъ сердца называется всякое чрезмѣрно усиленное и вмѣстѣ ускоренное движеніе сердца, безъ соотвѣтственнаго состоянія цѣлой артеріальной системы (кровеносной).

**Признаки** очень разнообразны; иногда болѣзнь обнаруживается на короткое время и не сопровождается никакимъ другимъ болѣзненнымъ состояніемъ; иногда, напротивъ, бываетъ продолжительна, и притомъ то съ послабленіемъ, то безъ послабленія, и сопровождается дурнотою головы, труднымъ дыханіемъ, потемнѣніемъ зрѣнія и ослабленіемъ вообще чувствъ, охлажденіемъ рукъ и ногъ и разнообразными непостоянными измѣненіями жилогенія; иногда же трепетаніе сердца бываетъ постоянное, безпрестанное.

**Раздѣленіе.** Трепетаніе сердца бываетъ *нервное*, *кровеное* и *органическое*.

Причины трепетанія сердца: 1) *нервнаго* — всѣ сильнодѣйствующія *страсти*: страхъ, испугъ, радость и т. п.; 2) *кровеннаго* — не свободный проходъ крови чрезъ сердечныя пазухи (преддверія сердца), усиленный приливъ къ нему крови, сильныя сжатія и разширенія сердца, бывающія, большею частію, по причинѣ другихъ болѣзней, какъ-то: истерики, ипохондріи, скопленія вѣтровъ въ животѣ, разстроенаго пищеваренія, завазовъ и опухоли печени и селезенки, запоровъ на низъ, глистовъ, гемороя, переноса на грудь чесотки и ломоты; 3) *органическаго* — органическія поврежденія сердца: отолстѣніе, растяженіе, утонченіе, неправильное состояніе заслоночекъ, т. е. ихъ отолстѣніе, окаменѣніе или окостенѣніе, ослабленіе; во всѣхъ этихъ случаяхъ, трепетаніе сердца органическое бываетъ безпрестанное. Трепетаніе сердца *нервное*, нерѣдко и *кровенное*, есть *первоначальное*, такъ напр. ткачи и ткачихи подвержены бываютъ этой болѣзни отъ ихъ работъ въ затруднительномъ сидячемъ положеніи, при безпрестанномъ напряженіи всѣхъ членовъ тѣла, особенно при самомъ мучительномъ потрясеніи предсердія отъ приближенія къ нему берды, *органическое же есть всегда сочувственное*, происходящее по сочувствію отъ другихъ болѣзненныхъ страданій; такъ, пѣвцы, чтецы, нараспѣвъ, проповѣдники, нерѣдко страдаютъ этою болѣзнію, въ слѣдствіе аневризма сердца и большихъ кровеносныхъ сосудовъ; хлѣбники или пекари хлѣбовъ, также носильщики, крющники, бурлаки въ слѣдствіе другихъ органическихъ болѣзней сердца.

Сущность состоитъ или въ излишней раздражительности, или возвышенной чувствительности сердца и происходящемъ оттого неправильномъ его движеніи.

Распознаваніе трепетанія сердца *просто* само по себѣ, но отъ какихъ причинъ оно происходитъ, особенно *сочувственное*, довольно *трудно*.

Предсказаніе въ обоихъ отношеніяхъ *зависитъ отъ* познанія *сущности и важности производящей причины*. Чѣмъ менѣе постоянна причина производящая, и притомъ значенія динамическаго, тѣмъ предсказаніе лучше, и на оборотъ.

Исходы въ *здоровье и смерть*, которою оно оканчивается по причинѣ органическихъ разстройствъ, нарушающихъ кровообращеніе.

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) въ предохраненіе отъ этой болѣзни должно совѣтовать *производить работы*, требующія болѣе или менѣе сильныхъ напряженій въ дѣйствіяхъ рукъ, голоса, грудныхъ и спинныхъ мышцъ, сколько возможно, *съ частымъ отдыхомъ*, а по окончаніи ихъ тотчасъ дѣлать *прогулку на свободномъ воздухѣ*. 2) Почувствовавъ трепетаніе въ груди во время работъ, въ какомъ бы положеніи ни было, стоя ли, согнувшись, на ходуляхъ, или сидя, нужно остановиться, встать прямо и сдѣлать нѣсколько глубокихъ вдыханій, отъ чего легкія разширятся, и кровь свободно польется изъ сердца въ легкія, а изъ легкихъ въ сердце. 3) Дурное *обыкновеніе* въ шутку *пугать* другъ дружку, какъ очень вредное для здоровья вообще и для

здоровья сердца въ частности, должно стараться *искоренять* между людьми: подобно этому бываетъ еще другая невѣжественная *привычка* у многихъ *дразнить* противными впечатлѣніями другаго, не менѣе того *нагубная*, которую также должно стараться уничтожать каждому священнику въ своемъ приходѣ. 4) *Подверженный* трепетанію сердца кромѣ того *долженъ быть умѣренъ во всемъ*: скоро ходить, особенно влѣзать на высоту по лѣстницѣ, съ напряженіемъ не только пѣть, даже говорить, также скоро ѣздить, играть на духовыхъ инструментахъ, употреблять спиртные напитки, пищу слишкомъ питательную и горячительную ему запрещается, но *пища удобоваримая, малопитательная, болѣе растительная, частію рыбная* (ершь, огуль, платица, язь и др. озерныя рыбы) *менѣе мясная* ему позволяется; наилучшимъ *напиткомъ его* должна быть *свѣжая холодная вода* одна, съ кислымъ (клюквеннымъ или лимоннымъ) сокомъ; не гнѣваться и ничѣмъ *не нарушать спокойствіе тѣла и духа*; онъ долженъ по возможности соблюдать болѣе и болѣе *водворять все это*.

Лѣченіе существенное *въ первоначальномъ* (нервномъ и частію кровяномъ) трепетаніи сердца, какъ временномъ или періодическомъ, бываетъ не нужно. Для предупрежденія и поправленія нервнаго трепетанія сердца достаточно правилъ діететическихъ и тѣхъ, какія начертаны для подвергающихся этой болѣзни вышеозначенныхъ поселянъ по быту ихъ работъ, въ особомъ описаніи въ концѣ этого лѣчебника, и состоятъ, главнымъ образомъ, въ удаленіи причинъ, прямо поражающихъ сердце и производящихъ эту болѣзнь. Въ сочувственномъ же трепетаніи сердца потребно удаленіе сочувственно дѣйствующихъ причинъ, которыя, будучи сами болѣзнями, лѣчатся приличными средствами, изложенными при ихъ отдѣльномъ описаніи. Нерѣдко трудно бываетъ распознать, отъ какихъ именно сочувственно дѣйствующихъ причинъ происходитъ сочувственное трепетаніе сердца; въ такомъ случаѣ, зная, что эти причины часто находятся въ животѣ, врачи съ пользою употребляютъ противъ нихъ *разрѣшающія слабительныя*, къ которымъ принадлежатъ: *огуречный разсолъ* (№ 7), *толокно съ медомъ и солью* (№ 72), *отвары* корней: *одуванчика, цикория, пырея, мыльнянки, репейнаго* одни (№№ 1, 2, 3, 4, 5) и съ *мятой* (№№ 17, 18, 19, 20, 21), *отваръ коры крушины* одинъ и съ *горькою солью* (№№ 74, 75), *кислое питье* изъ *кремортарта* (№ 178), *деревянное, льняное, конопляное или миндальное, масло съ яичнымъ желткомъ и сытою*, либо одно *касторовое* (№ 101); *приставленіе пиявицъ* къ заднему проходу (при гемороеѣ); а для притупленія раздражительности даютъ въ сутки по 3—4 *порошка*, состоящихъ изъ *селитры, кремортарта* и *наперсточной травы* (№ 202).

## Трясеніе тѣла.

О П Р Е Д ъ Л Е Н І Е. Трясеніе тѣла есть произвольное сотрясательное сокращеніе сгибающихъ и разгибающихъ мышцъ, преимущественно въ

рукахъ и шеѣ, отъ чего руки и голова при движеніи трясутся, а иногда и все тѣло, и при томъ въ разной степени: отъ легкаго дрожанія до сильнаго трясенія, рѣзкаго подергиванія, толчковъ, потрясеній, причемъ человекъ дрожитъ какъ въ лихорадочномъ ознобѣ, кривляется, шатается, какъ пьяный, переваливается съ боку на бокъ, какъ бы пляшетъ.

Причины: слабость нервовъ и мышцъ, происходящая отъ пьянства, полнокровія, переноса ломоты; чаще трясеніе тѣла есть слѣдствіе удара, сильной горячки, испуга (родимецъ), употребленія ртути, поглощенія ртутныхъ, мышьяковыхъ, свинцовыхъ паровъ, почему оно замѣчается у заводскихъ, фабричныхъ работниковъ, золотарей, рудокопателей, живописцевъ, послѣ буреній киноварью, и у точильщиковъ мелкихъ вещей.

Сущность состоитъ въ неправильной раздражительности нервной системы, управляющей мышцами вообще, и въ особенности рукъ и шеи.

Распознаваніе просто.

Предсказаніе, относительно опасности жизни, *невижно*; но относительно продолжительности оно зависитъ отъ степени болѣзни и причинъ, производящихъ ее. Рѣдко бываетъ она кратковременна и переходяща, развѣ въ легкой степени, и притомъ происходящая отъ пьянства, по прекращеніи послѣдняго, но большею частію бываетъ *хроническая и непрерывная*.

Исходы: въ *здоровье, ударъ и параличъ*. Нерѣдко болѣзнь остается неизлѣчимою на цѣлую жизнь.

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Людямъ, подвергающимся трясенію членовъ по причинѣ излишняго употребленія спиртныхъ напитковъ, надобно совѣтовать оставить послѣдніе; иначе они близки къ удару или параличу, или совсѣмъ неизлѣчимы. 2) Чтобы имъ удобнѣе и безъ вреда для здоровья отстать отъ сдѣланной уже разъ этой дурной привычки, совѣтовать имъ вмѣсто спиртныхъ напитковъ употреблять холодные *настои* изъ горькихъ: *тысячелистника, трилистника, полыни* и т. п., по нѣскольку стакановъ въ день, поутру, передъ обѣдомъ, передъ ужиномъ и на ночь по стакану. 3) Полнокровнымъ изъ нихъ очень полезно пить *холодную воду*, обливаться ею, особенно чаще мочить голову и купаться въ лѣтнее время въ рѣкѣ и морѣ. 4) Никому не совѣтовать употребленіе внутрь ртути и окуриваніе парами киновари безъ совѣта врача. 5) Заводскимъ фабричнымъ работникамъ, непрерывно обращающимся со ртутью (при дѣланіи барометровъ, термометровъ и т. п.) и другими вышеупомянутыми металлами, равнымъ образомъ рудокопателямъ, золотарямъ, должно быть осторожнымъ и *охранять себя отъ поглощенія тѣломъ ихъ металлическихъ паровъ*; для этого нужно имъ покрываться, работать въ кожаныхъ перчаткахъ, чаще умывать лицо и руки и полоскать ротъ водою съ уксусомъ, ходить чаще въ баню и перемѣнять бѣлье: а *лицу употреблять болѣе молочную*; во избѣжаніе запоровъ жевать по немногу



*ревню* или глотать по достаточному количеству *деревянного масла*, которое слабит и защищает от вреднаго дѣйствія металлическихъ паровъ. 6) Золотильщикамъ, кромѣ того, совѣтовать, чтобы рабочія *комнаты* были *пространны и высоки*, въ которыхъ воздухъ могъ бы проходить посредствомъ двухъ, одно другому противоположныхъ отверстій или форточекъ, да и то *быть въ нихъ* только *во время работы*, которая не должна быть постоянно продолжительна, а съ частыми *промежутками для прогулки* рабочихъ на *вольномъ воздухѣ*. Жаровню или *очагъ* въ рабочихъ комнатахъ *ставитъ противъ окна или двери*, а *надъ очагомъ* придѣлать изъ жести или листоваго желѣза *зонтъ*, который бы нижнимъ концомъ, на подобіе навѣса, распространялся и охватывалъ весь ихъ горнъ, а верхнимъ, какъ излучиною, выходилъ въ ближнюю дымовую трубу, или сквозь окна; работники-золотильщики должны отварачиваться отъ дыма, или прятаться какимъ нибудь образомъ, или наклоняться подъ очагъ, или выжидать въ другомъ приличномъ мѣстѣ, пока густой дымъ пройдетъ. 7) Въ случаѣ же происхожденія этой болѣзни отъ переноса ломоты (что бываетъ очень рѣдко у поселянъ), отъ послѣдствій горячки, или отъ металлическихъ паровъ, должно одержимымъ ею совѣтовать *носить теплую одежду*, чтобы открыть поры тѣла и помочь чрезъ то натурѣ выгонять изъ него вредныя частицы испариною и потомъ; при этомъ чаще *ходить въ баню*, париться въ ней, потѣть, а по выходѣ изъ бани, для содержанія испарины, полежать въ теплѣ и напиться *чаю изъ черной липы, сухой малины* и т. п. Фаллоній замѣтилъ, что работающіе въ ртутныхъ рудокопняхъ рѣдко живутъ болѣе трехъ или четырехъ лѣтъ. 8) Чтожъ касается до точильщиковъ, то для нихъ предписаны особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію въ концѣ этого лѣчебника.

Лѣченіе существенное требуетъ искусной врачебной помощи. При трясеніи отъ отравленія ртутью врачи употребляютъ *теплыя ванны съ стурною печенкою, стурныя минеральныя воды, кровочистительныя decoкты*, легкія *слабительныя съ стурою, пиявицы* къ спинѣ при постоянной въ ней боли; потомъ *холодныя ванны, обливанія холодною водою, дождевыя ванны, желѣзныя воды*, — *кавказскій нарзанъ, нацекинскія, литвицкія*. Замѣчено, что эта болѣзнь, какъ скоро она произошла отъ испуга, или отъ горячки, бываетъ большею частію неизлѣчима, при всемъ врачебномъ искусствѣ. Въ трясеніи тѣла, называемомъ «родимецъ», простой народъ съ успѣхомъ употребляетъ *просячій слухъ*. Это слуховыя косточки, величиною съ лѣсной орѣхъ, находящіяся на мышцелѣ верхней поросячей челюсти съ обѣихъ ея сторонъ, противъ каждаго уха по одной, которыя, отнявъ, высушиваютъ, толкутъ, растираютъ въ порошокъ каждую изъ нихъ и, смѣшивая *съ медомъ*, даютъ по одной на пріемъ ежедневно поутру натошакъ одержимому родимцемъ и говорятъ, что 9-ти этихъ косточекъ, принятыхъ въ продолженіе 9-ти дней, бываетъ достаточно для прекращенія болѣзни. Для этого, при

употребленіи въ пищу поросять, эти косточки всегда собираютъ и хранить, какъ цѣлебное средство въ этомъ случаѣ.

## Истерика.

**О п р е д ѣ л е н і е.** Истерика есть высшая степень меланхоліи у женщинъ, обнаруживающаяся безпорядкомъ соображенія, разсудка и воли съ внутреннимъ инстинктивнымъ влеченіемъ къ мужскому полу.

**П р и з н а к и.** Сначала томность, молчаливость, любовь къ уединенію, слезамъ, плачу, таинственнымъ мечтамъ о супружескомъ счастиіи жить вдвоемъ, какъ бы въ одномъ существѣ, робость въ присутствіи пріятныхъ мужчинъ, съ внутреннимъ влеченіемъ къ нимъ. Встрѣча взглядовъ съ ними вводитъ большую въ краску, ласки, а иногда одни разговоры только объ нихъ развиваютъ улыбку, радость, удовольствіе, воодушевленный разговоръ, смѣхъ, хохотъ нерѣдко до слезъ, страстные взгляды и сильное чувство половаго побужденія, сопровождаемаго чувствомъ особенной какой то непріятности въ половыхъ органахъ, и если оно не бываетъ удовлетворено, а иногда и по удовлетвореніи, въ отсутствіи друга сердца, то досада, грусть, печаль, огорченіе, забота, одиночество такъ глубоко западаютъ въ душу, что происходятъ оттого непрерывныя слезы, плачь, рыданіе съ выраженіемъ отвращенія къ жизни, отчаянія безъ всякой видимой къ тому причины; потомъ проходитъ это горестное состояніе на нѣкоторое время, послѣ котораго настаетъ опять: томность, молчаніе, склонность къ уединенію, слезливости, сладкимъ мечтаніямъ, и такимъ образомъ повторяется это динамическое состояніе женщины до тѣхъ поръ, пока она страдаетъ истерикою въ легкой ея степени. Если болѣзнь въ этомъ состояніи не будетъ остановлена и прекращена, то обнаруживаются припадки разстройства душевныхъ способностей, и больная находится въ самомъ жалкомъ состояніи: голосъ разсудка, совѣсти и стыдливости умоляетъ и уступаетъ свое владычество одному необузданному тѣлесному побужденію, которое до того усиливается, что всѣ мысли, всѣ желанія, всѣ дѣйствія имѣютъ предметомъ одно сладострастіе, и тутъ женщина бываетъ готова броситься въ объятія каждому мужчине при малѣйшемъ съ его стороны поводѣ къ тому. Лицо ея какъ бы надувается, краснѣетъ, глаза блещутъ огнемъ страсти, дыханіе тяжелое, горячее, развивается непомерная говорливость. Такъ Буасмонъ, описывая наблюденія о подражаніи крикамъ животныхъ во многихъ нервныхъ страданіяхъ и полагая, что всѣ болѣзненные состоянія этого различнаго подражанія ничто иное, какъ видоизмѣненія истерико-демоно-маніи, эпидемически свирѣпствовавшей въ теченіе многихъ среднихъ столѣтій во Франціи и Германіи, говорить. «я зналъ одну очень набожную даму, неукоризненной нравственности, высокаго ума, которая, среди самыхъ здравомыслящихъ разговоровъ, вдругъ поднимала свое платье». Эти болѣзненные напряженія по временамъ ослабѣваютъ, и больная проливаетъ обильныя ручьи слезъ о произведенныхъ ею по-

ступкахъ. Но по прошествіи нѣкотораго времени припадки опять ожесточаются, съ развитіемъ сильнѣйшихъ маточныхъ спазмовъ, заставляющихъ больную произвольно: либо кричать, кликать (кликуши), въ подражаніе крикамъ животныхъ по собачьи, по кошачьи, по сорочьи, и т. п. съ дикимъ визгомъ, либо говорить дерзко, рѣзко, твердо, неистово, съ несвойственнымъ краснорѣчіемъ въ тѣлѣ другаго злаго духа о предметахъ даже отвлеченныхъ, иногда съ скверноязычіемъ, поругательствомъ надъ святынею, богохульствомъ, нерѣдко между тѣмъ при выраженіи плача и страданія на лицѣ; неистовство доходитъ до бѣшенства, съ припадками столбняка, падучей, и другихъ нервныхъ болѣзней; либо плакать на взрыдъ съ безпрестаннымъ всхлипываніемъ, громкою отрыжкой, самозабвеніемъ, бредомъ въ видѣ разглагольствія, магнетическаго ясновидѣнія съ закрытыми глазами и пѣнящимся клубомъ изо рта. У женщинъ набожныхъ эта болѣзнь проявляется въ другой формѣ: веселость воображается беззаконіемъ; умерщвленіе плоти религіею; отверженіе забавъ и удовольствій, какаго бы рода онѣ ни были, хотя бы самыя невинныя и честныя, непреложнымъ догматомъ вѣры; строгость къ себѣ и къ другимъ безъ всякаго снисхожденія — просвѣщающимъ свѣтомъ и истинною. Жизнь ихъ однообразна, уединенна, обречена ими на страданіе и мученіе по примѣру Христа Спасителя, Котораго часто, будто бы, видятъ во снѣ и на яву и выдаютъ себя за Его любимицы. При этомъ болѣзненномъ состояніи въ цвѣтущемъ возрастѣ, тѣло увядаетъ, лицо, какъ бы красиво ни было, становится пасмурнымъ, угрюмымъ, суровымъ, духъ унылымъ. Обращеніе съ другими болѣе и болѣе дѣлается скучнымъ, тяжелымъ, непріятнымъ и даже отвратительнымъ, жизнь наконецъ становится бременемъ, земное счастье бываетъ уже въ тягость, и если не послѣдуетъ въ жизни этихъ людей никакихъ счастливыхъ переменъ, то онѣ, ослабѣвая въ этомъ заблужденіи отъ ложныхъ понятій объ вѣрѣ, въ полномъ убѣжденіи, что нѣтъ золь, подобныхъ претерпѣваемымъ ими, сами часто полагаютъ конецъ несчастному своему бытію.

**Причины внутреннія (предрасполагающія).** Предрасположеніе состоитъ въ особенной, возвышенной дѣятельности, врожденной или наследственной, нервной маточной системы.

**Причины внѣшнія (производящія):** 1) недостатокъ въ удовлетвореніи полового побужденія, особенно у женщинъ овдовѣвшихъ, или живущихъ долгое время безъ мужей, за отсутствіемъ ихъ въ отдаленныя мѣста для работъ; 2) состояніе яичниковъ, достигшихъ надлежащей зрѣлости и сильно развитыхъ; 3) остановленіе кровей; 4) непріятныя впечатлѣнія; 5) нечистоты въ желудочно-кишечномъ каналѣ; 6) праздность; 7) сидячій образъ жизни; 8) нагота ногъ и нижней части живота и 9) подогрѣваніе послѣднихъ \*).

\*) Такъ въ селѣ Ижевскомъ, Спасаго уѣзда, Рязанской губерніи, гдѣ большею частію живутъ бондари и главные члены семействъ уѣзжаютъ на долгое время (отъ 1, 2, 3 до 4-хъ лѣтъ) для работъ въ Саратовъ, Астрахань, Кизляръ, Одессу и

Изъ числа дѣвицъ подвергаются этой болѣзни тѣ, которыя, войдя въ возрастъ зрѣлыхъ лѣтъ и испытавъ свое терпѣніе прожить, не выходя замужъ, остаются въ дѣвственности и дѣлаются суевѣрно набожными. Эти случаи перѣдки въ разныхъ сектахъ старообрядцевъ и раскольниковъ. Истерикѣ кромѣ того подвержены бываютъ кормилицы, долгое время кормиція грудью и все время находящіяся въ чужихъ домахъ, гдѣ ихъ строго содержатъ, и свѣчницы по причинѣ пахучаго смраднаго салнаго чада во время литъя свѣчь.

Сущность состоитъ въ чрезмѣрной раздражительности и возвышенной чувствительности нервной маточной системы.

Распознаваніе въ высшихъ развитіяхъ болѣзни *легко*, но въ развитіяхъ низшихъ и, притомъ у женщинъ, твердо держащихся правилъ нравственности, распознаваніе *трудно*. Только по точномъ изслѣдованіи причинъ предрасполагающихъ и производящихъ, болѣзнь можетъ быть узнана. Чтожь касается до распознаванія истинной истерики отъ лож-

другіе отдаленные города, оставляя въ домахъ однѣхъ женъ, малолѣтнихъ дѣтей и престарѣлыхъ своихъ родителей, очень многія изъ молодыхъ женщинъ подвергаются истерикѣ и называются кликушамъ. По своему разумнію онѣ причисляютъ эту болѣзнь къ порчѣ посаженіемъ нечистаго духа. Въ 1823 и 1824 годахъ я былъ очевидцемъ, какъ во время обѣдни, особенно въ херувимскую пѣснь, пятнадцать молодыхъ женщинъ ужасно бѣсновались и всѣ съ неистовствомъ кричали бѣсовскимъ голосомъ, что ихъ посадила въ этихъ рабынь Авдошка (одна бѣдная вдова въ томъ селеніи, по имени Авдотья) и не высаживаетъ, что имъ душно въ нихъ, что ихняго брата у ней много, цѣлый полкъ, и она всѣхъ такимъ образомъ мучитъ. Одна изъ нихъ была въ родѣ магнетической ясновидящей; разсказывала о предметахъ отсутствующихъ очень точно и вѣрно; двѣ несомнѣнно краснорѣчивыхъ съ ихъ бытомъ, это была мать съ родною дочерью изъ хорошаго дома, обѣ честнаго поведенія. Мать, имѣвшая около 35-ти лѣтъ отъ роду, была уже нѣсколько лѣтъ безъ мужа, занимавшася работою въ отдаленныхъ мѣстахъ отъ жительства; а дочери было 18-ть лѣтъ; по выходѣ въ замужество, она пробыла съ мужемъ 3 мѣсяца, жила послѣ того безъ мужа 3-й годъ. Мать безпрестанно ввертывала бойкія неприличныя слова и кричала: «я военный, люблю по солдатски» между тѣмъ въ тоже время слезы катились ручьемъ изъ глазъ, и видно было страданіе на лицѣ отъ сознательнаго самосвѣдѣнія дерзкихъ произвольныхъ поступковъ со стороны другаго въ ней духа. Въ удостовѣреніе этого я ее спрашивалъ, когда она пришла въ себя, о причинѣ этой противоположности, она отвѣчала: я все помню, что бываетъ со мною, когда онъ во мнѣ кричитъ, и мнѣ такъ совѣстно и стыдно, что я плачу, а остановить и удержать его отъ этого не могу. Изъ этого видно, что въ духѣ происходитъ произвольное потрясеніе по причинѣ дѣйствія болѣзненныхъ паровъ въ нервахъ чувствованія, точно также какъ происходитъ произвольное трясеніе во всемъ тѣлѣ по причинѣ дѣйствія паровъ спиртныхъ или ртутныхъ въ нервахъ движенія. Дочь же, какъ лучший декламаторъ, въ неистовствѣ, громкимъ свѣтлымъ голосомъ выражалась слогомъ не только приличнымъ, даже пзбраннымъ, въ видѣ особаго говорящаго въ ней духа, причѣмъ употребляла много словъ и выраженій, слишкомъ непонятныхъ для каждой сельской женщины, и дѣйствительно, когда я спрашивалъ ее объ нихъ внѣ болѣзненнаго съ нею припада (въ періодъ послабленія), она отвѣчала, что многое поминтъ, о чемъ говорить въ ней ея духъ, но многого не понимаетъ и не знаетъ, что значать эти слова.

ной, нерѣдко случающейся, то, взявъ въ соображеніе вышеописанные признаки истерики, причины ея (предрасполагающія и производящія), и домашній бытъ больныхъ, довольно извѣстный приходскому священнику, легко можно отличить истинно-больныхъ отъ притворщицъ.

**Предсказаніе**, относительно опасности для жизни, *хорюшо*; относительно продолжительности болѣзни, предсказаніе зависитъ отъ свойства причинъ ихъ удаленности и отъ степени развитія какъ самой болѣзни, такъ и предрасположенія къ ней.

**Исходы:** въ *здоровье*, въ *воспаленіе матки*, въ *маточьяя кровотеченія и близнство*.

**Лѣченіе** діететическое сельской истерики должно быть причинное, состоящее въ удаленіи причинъ, производящихъ болѣзнь; для этого требуется соблюденіе слѣдующихъ правилъ: 1) Поселянамъ, у которыхъ жены подвержены истерикѣ, уѣзжающимъ надолго изъ жительства, надобно совѣтовать жить постоянно дома въ своемъ семействѣ и тутъ находить средства къ пропитанію. 2) Молодымъ вдовамъ пріятнѣе, полезнѣе сообразнѣе п-сь цѣлью жизни выходить опять замужъ; для дѣвицъ же супружество есть главное назначеніе, къ которому призываютъ не только права естественныя, но и гражданскія, божественныя и обязанности житейскія. Отступленіе отъ него, особенно по суетврью и предрасудкамъ, вредно здоровью, тягостно семейству, прѣтврно обществу и невыгодно отечеству. 3) Истерическимъ женщинамъ надобно совѣтовать вести образъ жизни дѣятельный, но не сидя на донцѣ за пряжею и т. п. а сопряженный съ движеніемъ всѣхъ членовъ тѣла. Есть въ нѣкоторыхъ мѣстахъ духовныя лица, которыя успѣшно отчитываютъ эти болѣзни. Дѣйствіе моральнаго чтенія вызываетъ болѣзнь въ послѣднюю высочайшую степень ея развитія. При этомъ отъ безпрестаннаго влканья, повсемѣстныхъ спазмовъ, изступленія, припадковъ падучей, столбняка, судорогъ, бывающихъ и долго продолжающихся попеременно во все время отчитыванія, въ тѣлѣ бываетъ немовѣрно сильная работа, отъ которой чрезмѣрная раздражительность и возвышенная чувствительность нервовъ матки, составляющія сущность болѣзни, притупляются и ослабѣваютъ. Болѣзнь, видимо, освобождается громкими отрыжками паровъ изъ глубины организма чрезъ ротъ, такъ что паръ, въ видѣ пѣнистаго клуба, выходящій съ чрезвычайнымъ напряженіемъ и усиліемъ со стороны всѣхъ членовъ тѣла, считается окончателнымъ излѣченіемъ и изгнаніемъ бѣса. Такъ Рязанской губерніи, Богословскаго монастыря (въ 15-ти верстахъ отъ Рязани) іермонахъ Филаретъ весною въ маѣ мѣсяцѣ отчиталъ одну изъ вышеозначенныхъ истеричекъ села Ижевскаго (бывшаго помѣщичьимъ г. Демидова, нынѣ вольное свободныхъ хлѣбопашцевъ), которая до осенняго престольнаго праздника Казанской Божіей Матери (22 ч. октября), была здорова, а по причинѣ новыхъ, во время трехдневнаго празднованія поселянъ въ то время, соблазновъ и повода къ болѣзни, опять подверглась истерикѣ и кричала голосомъ другаго духа, что онъ опять посаженъ колдуньею Авдотьей; поэтому опять была отчитываема

имъ же, Филаретомъ; но облегченіе было не болѣе, какъ на мѣсяць, а потомъ она опять занемогла тѣми же припадками и кричала словами другаго духа, что онъ не выходилъ изъ рабы Божіей, а въ пятки ея ушелъ и скрылся въ нихъ отъ чтенія; получила же она совершенное освобожденіе, какъ и всѣ другія, тогда, когда мужья ихъ возвратились домой и стали жить дома. При этомъ моральномъ лѣченіи нужно подъ ногами больной полъ устилать ковромъ, или кошкою въ предотвращеніе вредныхъ послѣдствій отъ частыхъ, очень рѣзкихъ и стремительныхъ ударовъ ея головою объ полъ. 4) Безъ этого лѣченія, въ случаѣ остановленія мѣсячнаго очищенія, если есть случай больной поткать или помыть полы, почистить ихъ и стѣны избы скребкомъ, то это для нея будетъ очень полезно. Въ случаѣ если эти средства не будутъ помогать, то избрать другія изъ числа означенныхъ въ этой особо описанной болѣзни. 5) Для постоянного покрытія ногъ и нижней части живота приносить большую пользу ношеніе исподняго мужскаго платья (подштаниковъ) для защищенія этихъ мѣстъ отъ постороннихъ тончайшихъ раздражающихъ частицъ, поступающихъ изъ воздуха, и для тепла, чтобы не имѣть надобности подогрѣваться надъ горшкомъ съ горячими угольями. 6) Мясную пищу и всѣ горячительные напитки имъ запрещаются. Приличнѣйшая для нихъ пища растительная и молочная, питье — вода свѣжая, холодная. 7) Что касается до кормилицъ и свѣчницъ, то для нихъ предписаны особыя правила въ росписаніи рабочихъ поселенъ по ихъ быту и званію.

Лѣченіе существенное въ истерикѣ, состоящее въ уменьшеніи раздражительности нервовъ вообще и маточныхъ въ особенности, бываетъ очень трудно, какъ и во всѣхъ важныхъ нервныхъ страданіяхъ, и потому непремѣнно требуетъ участія со стороны врача, за небытностію котораго должно ограничиться употребленіемъ *холодной воды* въ большомъ количествѣ внутрь, отъ 6 до 12-ти стакановъ въ сутки и болѣе, и снаружи въ видѣ обливаній (съ головы, по спинѣ, поясницѣ и главное по крестцу, производимыхъ изъ рѣшетчатаго отверстія садовой лейки, повторяемыхъ ежедневно по нѣскольку разъ, особенно поутру и ввечеру), или *купанья въ ртуть, холодныхъ ваннъ*; причѣмъ каждый разъ послѣ употребленія холодной воды внутрь или снаружи нужно тотчасъ имѣть достаточное *тѣлодвиженіе*, при которомъ никогда не послѣдуетъ простуды, какъ у солдатъ въ походѣ въ сильные крещенскіе морозы, не смотря на легкость ихъ не мѣховою одеждою. Независимо отъ этого очень полезны *прохлаждающія слабительныя*, повторяемыя ежедневно и черезъ день (№№ 97, 98, 99, 100).

## Спазмы грудныя.

**Определеніе.** Спазмы грудныя обнаруживаются чувствованіемъ сжатія или грудной кѣтки, или грудныхъ органовъ, именно легкихъ и сердца, при затрудненномъ дыханіи, раздутіемъ лицъ, тупости чувствъ и трепетаніи сердца.

**Раздѣленіе.** Спазматическіе грудные припадки, которымъ чаще подвергаются поселине, слѣдующіе: *трудное дыханіе, удушье и щемленіе сердца*. Они бываютъ *первоначальныя*, происходящіе непосредственно отъ ихъ причинъ производящихъ и *послѣдовательныя*, которые происходятъ отъ другихъ болѣзней, напр. воспаленій, коликъ, водянокъ, запоровъ на низъ и многихъ другихъ, къ которымъ они и принадлежатъ.

**Признаки.** Эти болѣзни такъ явны, что признаки ихъ извѣстны всѣмъ и каждому и видны изъ общаго ихъ опредѣленія. Присовокупить слѣдуетъ только то, что трудное дыханіе и удушье всегда бываютъ вмѣстѣ, различаются только степенью; первое слабѣе, послѣднее сильнѣе и сопровождается кашлемъ сухимъ или съ мокротою безъ всякихъ признаковъ лихорадочныхъ; а щемленіе сердца сопровождается болѣзненнымъ стѣсненіемъ и ломотою въ немъ. Бываютъ они временно и постоянно, смотря по причинамъ, отъ которыхъ происходятъ.

**Причины производящія:** 1) динамическія: гнѣвъ, радость, испугъ, страхъ, опасеніе; 2) матеріальныя: пыль при обработкѣ камней, очисткѣ шерсти, тряпья, пуха, молотбѣ муки на мельницахъ, метеніи улицъ: дурной воздухъ, тяжелыя работы грудью. По первымъ (динамическимъ) причинамъ подвергаются болѣзнямъ особенно ипохондрики и истерическія женщины; а по вторымъ (матеріальнымъ) подвержены бываютъ: чесальщицы и продавцы пеньки и льна, сырмятники и кожевники, чистильщицы колодцевъ и помойныхъ ямъ, шелкодѣлатели, свѣчники или салотопы, мельники, крахмальщицы, расчесывальщицы шерсти, шерстобиты, носильщицы, брючники и бурлаки, тряпичники, скорняки, одѣвальные, вязальщицы, прядильщицы, ткачи и ткачихи.

**Сущность** грудныхъ спазмовъ состоитъ въ неправильной раздражительности нервовъ грудной вѣтки, легкихъ и сердца, по которой дѣйствіе ихъ затруднительно, дыханіе несвободно и особенно трудно вдыханіе.

**Распознаваніе** легко и удобно. Удушье очень много сходствуетъ съ одышкою, но отличается отъ нея тѣмъ, что не имѣетъ лихорадочныхъ припадковъ, а одышка сопутствуетъ лихорадкѣ и она, завися отъ воспаления въ груди и отъ чахотки, бываетъ постоянно при этихъ болѣзняхъ.

**Предсказаніе**, какъ относительно опасности для жизни, такъ и относительно продолжительности, состоитъ въ прямомъ содержаніи съ дѣйствіемъ причинъ производящихъ: чѣмъ сильнѣе и постояннѣе послѣднія, тѣмъ опаснѣе и продолжительнѣе бываетъ болѣзнь вообще, и на оборотъ. Въ частности же грудные припадки, происшедшіе отъ причинъ динамическихъ, какъ то: гнѣва, радости, испуга, страха, опасенія, бываютъ не опасны и скоро проходящіе; но припадки, происходящіе отъ вышесказанныхъ причинъ матеріальныхъ, бываютъ опаснѣе и продолжительнѣе первыхъ.

**Исходы:** въ *здоровье*, (черезъ удаленіе причины), въ другія *болѣзни* и въ *смерть* (черезъ задушеніе).

ЛѢЧЕНІЕ грудныхъ спазматическихъ припадковъ должно быть причинное, состоящее въ удаленіи причинъ производящихъ ихъ и въ соотвѣтственномъ положеніи больного, которое бы сколько возможно препятствовало спазматическимъ движеніямъ груди и способствовало вдыханію воздуха. Вообще удобное для этого положеніе бываетъ, стоя выпрямившись и лежа вытянувшись, въ частности же должно совѣтовать соблюдать тѣ правила и употреблять тѣ средства, какія, соотвѣтственно быту вышеозначенныхъ поселянъ, изложены для каждаго изъ нихъ особо въ концѣ этого лѣчебника. Между тѣмъ *питье* изъ *настоя молодой ржи* и *ржаныхъ озимей*, въ видѣ чая, два раза въ день, равно какъ и *тираніе* въ тѣло *свиного сала*, употребляемые постоянно и съ терпѣніемъ, бывають въ грудныхъ страданіяхъ очень полезны \*).

### Спазмы желудочныя.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Спазмы желудочныя обнаруживаются чувствованіемъ напряженнаго противучервообразнаго движенія желудка вверху и сильнаго сжатія его брюшными мышцами съ большимъ или меньшимъ изверженіемъ питьеыхъ, пищевыхъ веществъ и воздуха.

РАЗДѢЛЕНІЕ. Спазматическіе желудочные припадки, наичаще случающіеся между поселянами, суть: *тошнота*, *рвота*, *изжога* (изгага).

ПРИЗНАКИ тошноты состоятъ въ непріятномъ чувствѣ въ желудкѣ, большею частію, предвѣщающемъ скоро имѣющую послѣдовать рвоту (позывъ ко рвотѣ) которою и оканчивается.

ПРИЗНАКИ рвоты: боль, давленіе, урчаніе подъ ложечкою, отрыжка вѣтрами, пищею, пѣною, водою, тошнота и наконецъ рвота, которая появляется или по временамъ, по утру на тощакъ, или послѣ всякаго употребленія пищи; притомъ у больного не замѣчается ни лихорадки, ни особенной боли при давленіи въ сторонѣ желудка. Впрочемъ рвота по ея значенію бываетъ различная: рвота, появляющаяся всякій разъ послѣ употребленія пищи и питья, даже лѣкарства, соединенная съ мучительною болью, означаетъ порчу желудка: его отвердѣнія, язвы, ракъ (очень рѣдко). Если рвота причиняетъ боль въ желудкѣ и во всемъ животѣ, если при продолженіи рвоты больной худѣетъ и желтѣетъ, то рвота указываетъ на желчные камни (рѣдко); если при рвотѣ боли бывають сильны съ боковъ и поясницы, то рвота вѣроятно зависитъ отъ камней въ почкахъ (рѣдко). Рвота у дѣтей, когда они поднимають голову, вставая съ постели и сидятъ, безъ явнаго повода, легкая и короткая, но частая, означаетъ начало воспаленія въ мозгѣ и острую водянку мозга, особенно, если притомъ дитя не весело, искошаетъ глаза, подвержено запору на низъ (рѣдко). Рвота дѣтей на тощакъ съ тошнотою и быстрымъ, неожиданнымъ потокомъ слюны показываетъ глистную болѣзнь (чаще). Упорная продолжительная рвота у дѣтей съ постоянною жаждою, поносомъ,

\*) Др. Здр. 1843 г. № 2 стр. 12.



напряженіемъ и тяжестью подь ложечкою, измѣненіемъ лица, охлажденіемъ рукъ и ногъ, притягиваніемъ ножекъ къ животу, изнуреніемъ всего тѣла, показываетъ размягченіе желудка (очень рѣдко).

Признаки изжоги (изгаги, печии): непріятное чувство подь ложечкою, откуда оно восходитъ вверхъ, — въ ротъ, гдѣ причиняетъ жженіе, оскомину, кислую отрыжку. Это чувство появляется послѣ жирной, сочной пищи, и притомъ чаще у молодыхъ, чѣмъ у пожилыхъ людей.

Причины тошноты и рвоты бываютъ двоякаго рода: 1) или непосредственно дѣйствующія на желудокъ и производящія ихъ, какъ-то: трудноваримая, жирная, невкусная пища, обременяющая желудокъ; изліяніе въ него острой желчи; ослизненіе или излишество въ немъ слизи, кислоты; пьянство; душевное отвращеніе и взглядъ на непріятные предметы; противный запахъ; причемъ полотеры отъ масляной краски, тряпичники отъ сортировки тряпья, сапожники и башмачники отъ кожи, свѣчники или салотопы отъ жирныхъ зловонныхъ частицъ, портные отъ пахучихъ матерій, хожатые за больными отъ дурныхъ испареній, бабки-повитухи отъ послѣ-родоваго очищенія родильницъ, кожевники отъ чищенія и глаженія кожъ,стряпухи и повара отъ мѣдной кухонной посуды. подвергаются тошнотѣ и рвотѣ; лѣкарства, яды, поступившіе въ желудокъ и т. п.; или 2) причины посредственныя, т. е. производящія при посредствѣ другихъ болѣзней тошноту и рвоту, которыя сами по себѣ ничто иное, какъ болѣзни, какъ напр. воспаленіе, затвердѣніе, размягченіе, извы стѣнъ желудка, переносъ дактилагры (подагры), гемороя, ревматизма, чесотки, опухоль и отвердѣніе печени, селезенки, почекъ, желчные почечные камни, наросты въ животѣ, беременность, брюшная водянка, боклюшъ, сильная боль головы, угаръ, ушибы головы, сотрясеніе мозга.

Причины изжоги: скопленіе въ желудкѣ кислоты; слишкомъ кислый или ѣдкій (щелочный) желудочный сокъ; острые съѣденныя вещи.

Сущность тошноты и рвоты одинакова, отличается только степенью и состоитъ при первомъ случаѣ въ слабость, а при послѣднемъ въ сильномъ раздраженіи спазматическомъ (судорожномъ) противу-червообразномъ сжатіи желудка и сосѣднихъ мышцъ, съ присовокупленіемъ понятій о причинахъ, производящихъ это раздражительное состояніе желудка непосредственно и посредственно (см. выше о причинахъ); а сущность изжоги состоитъ болѣе въ верхнемъ воспаленіи слизистой оболочки зѣва и глотки, чѣмъ въ раздражительномъ спазматическомъ противу-червообразномъ движеніи верхней части желудка и пищепріемнаго горла.

Раздѣленіе. Рвота (совокупно съ тошнотою) бываетъ, смотря по вышеизложеннымъ причинамъ, двухъ родовъ: 1) *Первоначальная* (самостоятельная), происходящая отъ причинъ, производящихъ ее непосредственно, и 2) *послѣдовательная*, происходящая и зависящая отъ другихъ болѣзней въ тѣлѣ.

Распознаваніе рвоты (совокупно съ тошнотою) *первоначальной* отъ рвоты *послѣдовательной* основывается на вышеописанныхъ ея при-

знакахъ, по которымъ первая бываетъ временная, случайная, удобно и скоро проходящая совершенно, съ удаленіемъ дѣйствующихъ причинъ; а послѣдняя, болѣе или менѣе постоянная, часто возвращается и не иначе совсѣмъ проходитъ, какъ съ уничтоженіемъ коренной ея болѣзни.

Предсказаніе *въ первоначальной* рвотѣ *хорошо*; потому что она ничто иное какъ усиліе природы, которая въ сбереженіе себя выбрасываетъ все, что для нея излишне и вредно; *въ послѣдовательной* же рвотѣ предсказаніе болѣе или менѣе *не выгодно* и во всемъ зависитъ отъ свойства коренныхъ ея болѣзней.

Исходы рвоты: въ *здоровье*, въ *воспаленіе желудка* и зависящія отъ него другія болѣзни. *Смертію* можетъ оканчиваться только при посредствѣ другихъ болѣзней.

Лѣченіе рвоты діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Въ предохраненіе отъ тошноты и рвоты должны вообще все *оберечь себя отъ* вышеозначенныхъ *причинъ* непосредственно *производящихъ* ихъ, какъ то: не обременять желудка излишнею, неудобоваримою, жирною, слизистою, острою, окисшею пищею и питьемъ, особенно не предаваться пьянству, не употреблять безъ разбора лѣкарствъ, особенно сильно дѣйствующихъ, болѣе или менѣе ядовитыхъ, и самихъ ядовъ, какъ то: брѣпкой водки, сулемы, киновари, пестрыхъ и внутри стержня полыхъ грибовъ и т. п.; чтожь касается до рабочихъ людей, именно: полотеровъ, тряпичниковъ, сапожниковъ и башмачниковъ, свѣчниковъ или салотоповъ, портныхъ, ходящихъ за больными, стряпухъ и поваровъ, то для нихъ изложены, сверхъ того, особыя правила въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію. 2) *Одержимый* рвотою, пока его тошнитъ и рветъ, *не долженъ ничего употреблять* изъ пищи, *кромя тепловатого питья* изъ воды, бульона или молока для вспомошествованія рвотѣ; иначе пища будетъ болѣе и болѣе раздражать желудокъ и въ немъ можетъ произойти воспаленіе. 3) Въ послѣдовательной рвотѣ должно соблюдать кромѣ того тѣ діететическія правила, какія свойственны болѣзни, отъ которой она происходитъ и зависитъ.

Лѣченіе существенное, состоящее въ удаленіи причинъ рвоты, въ остановленіи самой рвоты при различныхъ ея видахъ различно: 1) Въ первоначальной рвотѣ отъ скопленія нечистотъ въ желудкѣ и кишкахъ лучшее средство составляетъ *рвотнослабительное*, состоящее изъ *рвотнослабительной соли* въ растворѣ (№ 184), запиваемое каждый разъ теплотою водою или теплотою *настоямъ ромашки* и т. п. Оно очищаетъ и хорошо промываетъ весь желудочно-кишечный ваналь, сверху до низу. Если какія либо ядовитыя вещества, попавшія въ желудокъ, сдѣлались причиною рвоты, то ихъ должно, какъ можно скорѣе, вывести изъ него, пока не произошло въ немъ воспаленія, для вспомошествованія въ этомъ усиліямъ природы тѣми средствами, какія показаны при лѣченіи воспаленія желудка (см. эту болѣзнь). Рвота запившихъ пьяницъ, разстроившихъ пьянствомъ желудокъ и печень, появляющаяся у нихъ послѣ глубокаго, глухаго, почти сухаго, кашля, излѣчивается *воздер-*

*жаниемъ* отъ пьянства, легковаримою жидкою пищею, *кислыми щами*, *холодною водою* по утрамъ, *огуречнымъ рассоломъ*, *твердымъ питьемъ* (№ 62), *шипучими порошками* (№№ 11, 12), *магнезією съ ревениемъ* (№ 31), *холодною наливкою три и тысячелистника*, *попыны*, *кваси*, *горячавки*, *коломбо*. 2) Въ послѣдательной рвотѣ, происходящей отъ воспаления желудка, употребляется лѣченіе противъ этой болѣзни (см. лѣченіе воспаления желудка). Если рвота произошла отъ переноса на желудокъ ревматизма, *ломоты* (дактилагры-подагры), *чесотки*, *катарра*, отъ залѣченныхъ язвъ на ногахъ, (узнается изъ того, что больной прежде былъ подверженъ какой либо изъ этихъ болѣзней, которыя потомъ вдругъ пропали, и въ слѣдъ за тѣмъ появилось разстройство пищеваренія, а потомъ и рвота, и изъ боли въ сторонѣ желудка подъ ложечкою и мутной, красной мочи), то во всѣхъ этихъ случаяхъ рвотѣ предшествуетъ воспаление желудка, лѣченіемъ котораго должно начинаться лѣченіе и рвоты. Въ этомъ случаѣ нужно пригласить врача, а за неимѣніемъ его по близости поступать, какъ при воспаленіи желудка (см. эту болѣзнь): положить *нарывной пластръ* на ложечку (№ 58); при скрывшейся *ломотѣ* (дактилагръ-подагрѣ) *горчичники* къ ногамъ (№№ 88, 89, 90), сдѣлать *ножную ванну съ золою и горчицею* (№№ 83, 84); при зажившихъ язвахъ поставить *фонтанель* на томъ мѣстѣ, гдѣ были язвы. Если рвота произошла отъ полнокрівія или медленнаго воспаления въ животѣ (узнается изъ тяжести въ животѣ, красноты языка, сухости во рту, особенно по утрамъ, жара и жажды, изъ остановившагося геморoidalнаго либо мѣсячнаго кровотеченія, изъ боли въ животѣ и особенно около печени, желудка), — то здѣсь нужно противувоспалительное лѣченіе: назначить приставленіе *пѣявокъ* къ ложечкѣ, въ количествѣ, соотвѣтственномъ степени болѣзни (6—12), *мягчительныя припарки* на животъ изъ *стѣнной трухи* (№ 125), *льнянаго сѣмени* (№№ 23, 27, 28, 54, 55, 59); внутрь *слизистое питье* (№ 130); *слизистую эмульсію* (№ 131), также *молоко конопляное, миндальное, маковое, ореховое, оршадъ*, *нарывной пластырь* на животъ (№ 58). частыя *промывательныя* (клизирры) изъ *овсянаго отвара* (№ 95). Иногда рвота бываетъ очень упорна отъ скопленія нечистотъ въ толстыхъ кишкахъ (въ слѣпой кишкѣ, въ правой и нижней части живота) и излѣчивается продолжительнымъ употребленіемъ *клизировъ* (№ 95) и *слабительныхъ* изъ отваровъ *чернослива*, *коринки* и *сыворотки съ медомъ*, *селитрою* и *кремортартаромъ* (№№ 97, 98, 99), *вѣнскаго питья* (№ 139), *отвара сухой кори крушины* (№№ 74, 75). Во всѣхъ прочихъ случаяхъ послѣдательной рвоты, болѣе или менѣе упорной, больные должны искать пособія у врачей.

Лѣченіе изжоги, требующее воздержанія надолго отъ пищи жирной, масляной, сочной, острой, производится *противокислотными* средствами: порошкомъ и отваромъ изъ *мѣла*, (№ 187) *магнезіи*, *раковинахъ жерновокъ*, *раковинъ*, *березоваго угля*, *жженога хлѣба*, въ порошокъ по чайной ложкѣ нѣсколько разъ въ день во время непріятнаго чувство-

ванія изжоги, а въ отварѣ, (приготовляемомъ изъ прочихъ средствъ, подобно, какъ изъ мѣла), по рюмкѣ нѣсколько разъ въ день.

## Спазмы кишечныя.

**О П Р Е Д Ъ Л Е Н І Е.** Кишечныя спазмы обнаруживаются чувствованіемъ стягивающихъ болей, распространяющихся по направленію кишекъ и часто сопровождаемыхъ изверженіемъ, большею частію, низомъ, рѣдко верхомъ.

**Р а з д ѣ л е н і е.** Изъ даннаго опредѣленія видно, что кишечныя *спазмы* бываютъ: 1) *безъ изверженія*, или собственно такъ называемая *колика*; 2) *съ изверженіемъ низомъ*, или собственно такъ называемый *поносъ*, иногда 3) *съ изверженіемъ верхомъ* (рвотою низовыми испражненіями), или собственно такъ называемый *завитокъ*.

## Колика.

**О П Р Е Д Ъ Л Е Н І Е.** Колика есть ничто иное, какъ спазмы кишечнаго канала безъ поноса и рвоты.

**П р и з н а к и** формы колики вообще слѣдующія: больные чувствуютъ или тяжесть въ животѣ и напыщеніе, или болѣзненное его подтягиваніе внутрь; потомъ съ большею или меньшею быстротою развиваются боли, стягивающія то весь животъ, то мѣстно, и притомъ переходящія съ одной части живота на другую, больные обыкновенно впадаютъ въ тоску, лицо покрывается блѣдностію и вмѣстѣ холоднымъ водянистымъ потомъ, конечности холодѣютъ, иногда даже нѣмѣютъ, особенно концы пальцевъ, дыханіе нерѣдко дѣлается затруднительнымъ, часто ощущается ворчаніе въ животѣ, послѣдуемое изверженіемъ вѣтровъ то верхомъ, то низомъ, причѣмъ больные обыкновенно получаютъ нѣкоторое облегченіе, а иногда и совершенное успокоеніе, за которымъ однакожь, большею частію, слѣдуетъ новое ожесточеніе, продолжающееся, или съ равною, или еще съ большею силою противъ прежняго. Такіе возвраты, смотря по степени болѣзни, бываютъ болѣе или менѣе многократные, и, въ жесточайшихъ случаяхъ, продолжаются нерѣдко цѣлыя сутки и болѣе.

**П р и ч и н ы** предрасполагающія: возвышенная чувствительность и сильная раздражительность нервовъ.

**П р и ч и н ы** производящія: 1) употребленіе нищи псеудобоваримой, особенно слизистой, незрѣлыхъ плодовъ и рыбной, развивающей въ желудочно-кишечномъ каналѣ газы или вѣтры, при совмѣстной простудѣ отъ мокроты и сырости, или отъ употребленія холоднаго питья; 2) поступленіе въ кишечный каналъ свинца; 3) глисты; 4) отвердѣвшія, испражняемыя вещества, остановившіяся или въ прямой кишкѣ, или въ другихъ частяхъ кишечнаго канала (часто отъ употребленія черемухи въ большомъ количествѣ) и производящія запоръ на низъ; 5) острая желчь, развѣдающая и раздражающая оболочки тонкихъ кишекъ, особен-

но двѣнадцати-перстной; 6) песокъ или камни въ почкахъ; 7) геморoidalное раздраженіе; 8) раздраженіе матки; 9) скрывшаяся внутрь и павшая на кишки матерія, ломотная и ревматическая.

**Раздѣленіе.** По различію причинъ колика бываетъ различна и полчается отъ нихъ свое названіе. Такъ, по причинамъ предрасполагающимъ она бываетъ: *нервная* — отъ возвышенной чувствительности или слабости нервовъ; *воспалительная* — отъ усиленной раздражительности. По причинамъ производящимъ нервная колика бываетъ:

1) Колика *вѣтрная* — происходящая отъ развитія въ кишечномъ каналѣ вѣтровъ. 2) Колика *свинцовая* — отъ поступленія въ тѣло свинца. 3) Колика *глистная* — отъ присутствія глистовъ. 4) Колика *запорная* — отъ запора испражнений на низъ. 5) Колика *желчная* — отъ остроты желчи въ двѣнадцати-перстной кишкѣ. 6) Колика *почечная* — отъ раздраженія, производимаго пескомъ или камнями.

#### Воспалительная колика бываетъ:

1) Колика *геморoidalная* — отъ геморoidalнаго раздраженія. 2) Колика *маточная* — отъ раздраженія матки. 3) Колика *ломотная и ревматическая*, происходящая собственно отъ скрытія внутрь и паденія на кишки матеріи ломотной и ревматической.

**Признаки нервной колики:** чисто нервные припадки, безъ всякихъ воспалительныхъ признаковъ. Особенные признаки нервной колики, кромѣ спазматическихъ болей во всемъ животѣ, сосредоточивающихся противъ пупка уходящаго внутрь, слѣдующія: тяжесть и боль головы, блѣдность лица, холодный потъ, синева пальцевъ, сжатый пульсъ, прекращеніе мочеотдѣленія и испраженія, задній проходъ уходитъ внутрь и запирается спазматически, корчи, отсутствіе мѣстныхъ постоянныхъ болей въ животѣ. Нервной коликѣ подвергаются люди слабые, нервные, чувствительные. Женщины флегматическаго, мокротнаго темперамента, много уже пострадавшія отъ нервныхъ болѣзней и ослабѣвшія отъ трудныхъ родовъ, наиболѣе бываютъ подвержены этой болѣзни.

**Признаки воспалительной колики:** сухость языка, меньшее охлажденіе конечностей, пульсъ болѣе полный и твердый, мочеотдѣленіе не совершенно прекратившееся, и другіе воспалительные признаки. Воспалительной коликѣ подвергаются люди крѣпкіе, здоровые, полнокровные, особенно въ брюшной системѣ.

**Признаки вѣтрной колики.** Вѣтрная колика отличается преимущественно тѣмъ, что животъ бываетъ чрезвычайно натянутъ, раздутъ, жестокъ, звенитъ какъ барабанъ и притомъ ощущается сильное движеніе въ кишечномъ каналѣ вѣтровъ (вурчаніе, бурборизмъ), переходящихъ изъ одной кишки въ другую. Если болѣзнь произошла отъ излишняго употребленія незрѣлыхъ плодовъ, то испраженія бываютъ чрезвычайно кислыя, изжога мучитъ больнаго въ величайшей степени. Вѣтрной коликѣ наиболѣе подвержены вообще люди слабые, у которыхъ ослабѣли силы пищеварительныхъ органовъ, причемъ пищевареніе совершает-

ся слабо, въ особенности рыболовы, баньщики и прачки, чистильщики колодцевъ и помойныхъ ямъ, также портные.

Признаки *свинцовой* колики имѣютъ ту особенность, что животъ бываетъ въ обыкновенномъ состояніи; объемъ его не увеличивается, но боли ощущаются рѣжущія и колючія. Свинцовой коликѣ подвержены бываютъ вообще мастеровые, занимающіеся обдѣлываніемъ свинца или и другихъ металловъ, но при содѣйствіи послѣдняго, въ особенности свинечники, бѣлило-дѣлатели, золотильщики и живописцы, обсаивающіе кисточки, на которыхъ находится краска, содержащая свинецъ.

Признаки *глистной* колики отличаются тѣмъ, что бываютъ скоротечны, часто возобновляются и сопровождаются, въ перемежкахъ, сильнымъ позывомъ на пищу.

Признаки *запорной* колики отличаются сильнымъ побужденіемъ на низъ, часто возобновляющимся, безъ дѣйствительныхъ испражнений; причеиъ ручнымъ изслѣдованіемъ въ животѣ ощущаются твердыя тѣла въ какомъ либо мѣстѣ толстыхъ кишекъ, начиная съ прямой по всему ихъ продолженію; въ прямой кишкѣ такія твердыя тѣла можно ощупывать непосредственно пальцемъ.

Признаки *желчной* колики отличаются жгучимъ жаромъ въ животѣ, горечью во рту, тошнотою, нерѣдко рветъ больнаго желтою, жгучею, горькою желчью; послѣ того становится полегче, но вскорѣ опять наступаетъ такая же рвота. Желчной коликѣ подвержены люди плотнаго и сухаго тѣлосложенія, желчные (холерики), употребляющіе много спиртныхъ напитковъ, вспыльчивые, сердитые и злые.

Признаки *почечной* колики отличаются предшествовавшей или сопутствующей болью въ одной или въ обѣихъ почкахъ.

Признаки *геморoidalной* колики, отличаются предшествующими и сопутствующими ей геморoidalными припадками. Страждущіе гемороемъ бываютъ подвержены этой болѣзни.

Признаки *маточной* колики отличаются предшествующимъ и сопутствующимъ раздраженіемъ маточной системы, при остановившихся мѣсячныхъ или родовыхъ очищеніяхъ.

Признаки *ломотной* и *ревматической* колики отличаются предшествующими ломотными и ревматическими болями, исчезающими обыкновенно съ появленіемъ колики.

Сущность состоитъ съ одной стороны въ неправильной раздражительности нервовъ кишечнаго канала и послѣдующемъ спазматическомъ ихъ движеніи, съ другой стороны въ раздраженіи кровеносной и плототворительной системъ кишечнаго канала, достигающемъ воспалительнаго его состоянія.

Распознаваніе колики, какъ вообще, такъ и въ частности, по признакамъ, свойственнымъ ей, при полномъ ея развитіи, совершенно легко. Но какъ къ сильному развитію колики часто присоединяется воспаление, или и самое воспаленіе служитъ основною причиною колики, то очень легко, безъ точной внимательности, колика можетъ быть принята

за воспаление, а воспаление за колику, особенно если страждущій будетъ крѣпокъ и полнокровенъ, и въ этомъ-то случаѣ часто присоединяется воспаление, и на оборотъ; если воспаление бываетъ у чловѣка мокротнаго, холоднаго, то въ первомъ случаѣ колику можно счесть за воспаление, а во второмъ — воспаление за колику. Распознать же эти два состоянія можно только: 1) По состоянію языка: при воспаленіи онъ обыкновенно бываетъ сухъ и растрескивается, при коликѣ же болѣе или менѣе влаженъ; 2) по качеству мочи, которая при воспаленіи бываетъ красная и малоколичественная; напротивъ, при коликѣ она отдѣляется въ большемъ количествѣ и бываетъ или совсѣмъ не красная, или нѣсколько красная. Если къ коликѣ присоединяется воспаление, то языкъ нѣсколько сохнетъ, но трещинъ не бываетъ, и моча необильная и красноватая.

**Предсказаніе** относительно опасности для жизни зависитъ: 1) отъ степени развитія спазмовъ и воспаления, такъ что чѣмъ сильнѣе спазмы, тѣмъ скорѣе присоединяется воспаление, а чѣмъ сильнѣе воспаление, тѣмъ опаснѣе для жизни; 2) отъ свойства причинъ производящихъ, такъ что чѣмъ легче ихъ удалить, тѣмъ предсказаніе лучше, и на оборотъ. Относительно продолжительности болѣзни предсказаніе зависитъ: 1) отъ свойства каждаго видоизмѣненія колики, такъ что колика нервная вѣтреная продолжается гораздо долѣе, нежели прочія, особенно нежели лютная и ревматическая; 2) отъ свойства причинъ производящихъ, такъ что чѣмъ скорѣе онѣ могутъ быть удалены, тѣмъ менѣе продолжительна болѣзнь, и на оборотъ.

**Исходы.** Въ *здоровье*, съ удаленіемъ причинъ и успокоеніемъ раздраженія; въ *болѣзни* воспалительныя; въ *смерть* чрезъ истощеніе силъ или прямо, или въ слѣдствіе разстройства пищеварительныхъ органовъ.

**Лѣченіе** діететическое должно быть причинное, состоящее въ удаленіи причинъ, производящихъ колику, причемъ требуется соблюденіе слѣдующихъ правилъ: 1) Въ предохраненіе поселянъ отъ вѣтреной колики, которой они часто бываютъ подвержены всѣ вообще, а въ особенности рыболовы, прачки и банщики, чистильщики колодезъ и помойныхъ ямъ (см. въ особой росписи поселянъ по ихъ быту и званію) должно *совѣтовать употреблять пищу удобоварительную*, не сырую, каковы особенно незрѣлые плоды, огородныя овощи: рѣпа, брюква, кочени капусты, горохъ, бобы и сухую, но *вареную печеную, жареную, болѣе мясную, чѣмъ, рыбную, слизистую*, и притомъ каждый разъ, какъ у нихъ обмочилось *платье, перелмывать его на сухое и теплое*, а въ случаѣ употребленія ими нездоровой пищи, отъ которой пучитъ у нихъ животъ и позываетъ на питье, давать холоднаго питья: тутъ должно выпить *рюмку хорошей водки* или простаго хлѣбнаго вина, т. е. сивухи; за неимѣніемъ ея, рюмка крѣпкаго *настоя* перечной, либо стаканъ простой полевой *мяты* можетъ оказать такую же пользу; а для нервныхъ и непривычныхъ къ спиртнымъ напиткамъ людей, также очень подверженныхъ этой коликѣ, даже всегда предпочтается это средство водѣ. 2) Свиначники, бѣглодѣлатели, золотильщики, живописцы и другіе, ко-

торые дѣлаютъ изъ свинца препараты, въ предохраненіе себя отъ свинцовой колики, никогда *не* должны *приниматься за работу на тоцкахъ*; ихъ пища должна быть масляная и жирная, жирные мясные бульоны, супы, похлебки, щи, масляная каша, особенно полбеная. Каждое утро надобно имъ выпивать, кромѣ того, по рюмкѣ деревяннаго свѣжаго масла, съ небольшимъ количествомъ рома, или водки; но какъ этихъ, такъ и другихъ спиртныхъ напитковъ, особенно терпныхъ и кислыхъ, они никогда не должны принимать безъ упомянутой примѣсп. Хоть на короткое время, но *почаще*, должно имъ *выходить на свѣжій воздухъ* изъ рабочихъ комнатъ, въ которыхъ воздухъ испорченъ, и всячески избѣгать запора; если кто подверженъ послѣднему, тотъ долженъ имѣть при себѣ въ карманѣ *ревень* и *жевать* его по временамъ и понемногу, чаще *ходить въ баню* послѣ работы, обмываться, перемѣнять бѣлье и вообще *соблюдать чистоту и опрятность тѣла*, какъ святыню. 3) Тѣ, которые подвержены частымъ возвратамъ колики желчной, должны мало ѣсть мяса и питаться только легкими растеніями и ихъ плодами. Кислое молоко, варенецъ, простокваша также для нихъ полезны, какъ легкія слабительныя и сыворотка. 4) Во избѣжаніе коликъ: почечной, геморридальной, маточной, ломотной и ревматической, нужно *заниматься работами съ движеніемъ всѣхъ членовъ*, особенно рукъ и ногъ, а несопряженными съ сидячимъ положеніемъ: въ предупрежденіе ея, какъ послѣдовательной отъ ломоты и ревматизма, потребно сверхъ того *страдающія* этими болѣзнями *мѣста покрывать* для ношенія *бѣлымъ шерстянымъ онучнымъ сукномъ фланелью*. 5) Всѣмъ вообще заболѣвшимъ и страдающимъ коликою, какого бы она рода ни была, *теплое содержаніе, умываніе рукъ, ногъ и голеней въ теплой водѣ*, прикладываніе на животъ тряпиць или салфетокъ, обмоченныхъ въ теплую воду, обильное *питье слизистыхъ отваровъ ячменя, крутъ полбеныхъ, овсяныхъ, саго и т. п.* также *настоявъ мяты простой, аниса, укропа; мягчительныя припарки къ животу изъ стѣнной трухи, льнянаго сѣмени, травъ проскурняка, мать-мачихи, шалфея*, наконецъ мягчительныя *промывательныя* изъ жидкости этихъ же припарокъ или *ромашки* съ двумя ложками *льнянаго* или *коноплянаго*, либо *деревяннаго масла* и съ распущеннымъ *бѣлымъ мыломъ*, чрезъ каждые два или три часа, очень бываютъ спасительны. 6) Кромѣ того въ вѣтреной коликѣ, если она произошла отъ пищи и питья, при первомъ появленіи признаковъ ея, употребленіе *водки*, особенно *настоенной на анисѣ*, можетъ служить наилучшимъ средствомъ (надобно только остеречься, чтобы не посовѣтовать это средство въ воспаленіи кишекъ, въ которомъ оно вредно, какъ ядъ. 7) *Сухія тренія* живота разогрѣтою рукою или мягкими теплыми ветошками, салфетками, часто повторяемыми, выгоняя вѣтры, ощутительно облегчаютъ больнаго. 8) *Горячій киртчикъ*, завернутый въ ветошку и приложенный къ подошвамъ ногъ больнаго, бываетъ очень полезенъ, если болѣзнь произошла вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ промоchenія, или сырости ногъ, равнымъ образомъ въ коликахъ: маточной, геморридальной, ломотной и ревматической, особенно если послѣднія поя-



вылись отъ скрывшейся ломоты или ревматизма въ ногахъ. 9) Какъ скоро въ вѣтреной коликѣ, происшедшей отъ поносекъ и дурнаго пищева-ренія, дѣлается рвота, которою обыкновенно сама натура выльчиваетъ болѣзнь, то не должно останавливать ее, напротивъ того, надобно помогать ей, давая обильно пить теплой воды, и когда жестокость припадковъ пройдетъ, то больной можетъ приемомъ *ревеня* выгнать и остатки сыро-сти. 10) Есть люди, у которыхъ пища, повидимому совсѣмъ не дѣлаю-щая вѣтровъ, все-таки производитъ ихъ, какъ-то: медъ, яйца и другіе: въ такомъ случаѣ помогаютъ: *ячняя вода*, съ *хлѣбомъ настоенная вода* и т. п. 11) *Сухія тренія* живота разогрѣтою рукою или мягкими ве-тошками и прикладываніе нагрѣтаго кирпича къ подошвамъ ногъ полезны и въ *желчной коликѣ*, геморроидальной, ломотной и ревматической, и въ маточной. Въ послѣдней они должны быть производимы въ нижней части живота, пониже пупка. 12) Отъ рвоты, бывающей иногда въ желчной коликѣ, которую трудно даже остановить, нужно давать настоенную воду съ хлѣбомъ или *мятный настой*. 13) Для портныхъ, сверхъ того, есть еще особыя правила, по ихъ образу жизни (см. расп. поселянъ по ихъ быту и званію).

Лѣченіе существенное едва ли когда потребуется въ коликѣ, ка-кого бы рода она ни была, если будутъ приняты надлежащія мѣры про-тивъ нея по вышеизложеннымъ правиламъ діететическаго лѣченія; но если оно понадобится для 1) успокоенія раздраженія, служащаго основа-ніемъ колики и 2) уничтоженія воспалительнаго состоянія, часто сопро-вождающаго колику, то въ удовлетвореніе перваго побазанія нужно дѣй-ствовать сильнѣе *мягчительными припарками* изъ *сынной трухи* (№ 122), *льнянаго сѣмени* (№ 23), *мякища бѣлаго хлѣба* (№ 26), *ромашки* (№ 27) съ *душицею*, *донникомъ* и др. (№ 54); особенно съ *зорюю* и *цветами мака* (№ 55), съ *мятою*, *божьимъ деревцомъ*, по-рошкою *корки ивовой*, *дубовой* (№ 56); *трениа живота* производить теплыми *маслами*: *деревяннымъ*, *маковымъ*, *льнянымъ*, одними и съ *камфорою* (№ 71), съ *спиртомъ оленьяго рога* (№ 123), *мазью изъ березовыхъ листьевъ*, либо *почекъ* (№ 166). Эти масляныя втиранія въ свинцовой коликѣ болѣе полезны, чѣмъ припарки. *Чай* изъ *ромашки*, *мяты*, *аниса*, *тмина*, какъ вѣтрогонное средство оказываетъ пользу въ вѣтреной коликѣ, особенно при посредствѣ *промывательнаго* (клин-тирь) изъ *овсянаго отвара съ медомъ*, *масломъ* и *мыломъ* безъ солей и укуса (№ 95). Отъ этихъ средствъ вѣтры выходятъ скоро и освобожда-ютъ больного отъ болѣзни. Въмѣсто промывательнаго, въ случаѣ не-удобствъ, можно дать *слабительное* изъ *масла*: *льнянаго* или *деревян-наго*, *прованскаго*, *миндальнаго*, съ *яичнымъ желткомъ* и *сахарною водою*, либо съ *сытою*, или одного *кастороваго*, взятаго изъ аптеки (№ 101), которое въ запорной коликѣ, принятое вдругъ до двухъ столо-выхъ ложекъ, одно кончаетъ все дѣло. Въ запорной коликѣ препятствіе къ прохожденію испражненій находится иногда въ заднепроходной кишкѣ: въ такомъ случаѣ надобно посовѣтовать войти *пальцемъ* въ задній проходъ

и удалить препятствіе. Народное обыкновеніе вставляетъ въ проходъ куски мыла въ этомъ случаѣ очень одобрительно, оно часто достигаетъ желанной цѣли и разрѣшаетъ болѣзнь. Въ желчной коликѣ съ желтухою, кромѣ наружныхъ исчисленныхъ средствъ, полезно употребленіе внутри *сыворотки съ бычачьею желчью*; растворивъ 1—2 золотника послѣдней въ одномъ фунтѣ первой, давать по рюмкѣ черезъ каждые два часа.

Лѣченіе колики глистной, кромѣ вышеозначенныхъ средствъ, требуетъ еще средствъ глистогонныхъ (см. глисты).

Лѣченіе колики почечной. Если она происходитъ отъ песка и камней, узнаваемыхъ по мочѣ, съ которою выходитъ не только песокъ, но нерѣдко и небольшіе камешки, зернистые, то для этого предложены средства въ описаніи каменной болѣзни. А безъ того тѣ же припарки, тѣ же втиранія должны быть употреблены къ бокамъ пояницы, къ которой приглядываются, обыкновенно, *горчичники* (№№ 88, 89, 90), *хрьновникъ* (№ 91) и, въ случаѣ недостаточнаго ихъ дѣйствія, *нарывной пластырь* (№ 58), за неимѣніемъ котораго могутъ быть употреблены *цвѣты жабника*, растущаго вездѣ въ изобиліи, который крестьяне часто употребляютъ вмѣсто мушки.

Лѣченіе колики гемороидальной требуетъ средствъ, употребляемыхъ противъ гемороя закрытаго. Специфическое же превосходное въ этомъ случаѣ средство есть слѣдующее: взявъ кусокъ фланели, обмотить его въ горячую наливку изъ ромашки, выжать, положить на животъ и перемѣнять припарку, какъ скоро она начнетъ простывать.

Лѣченіе колики маточной требуетъ употребленія средствъ, предлагаемыхъ при задержаніи мѣсячныхъ и родовыхъ очищеній. Предшествовавшая *припарка ромашковая* и въ этомъ случаѣ превосходна.

Лѣченіе колики лomotной и ревматической состоитъ въ употребленіи средствъ, вызывающихъ лomotу и ревматизмъ или вообще наружу, или на мѣста, прежде занимаемая ими. 1) Въ первомъ случаѣ приглядываются: *хрьновникъ*, *горчичникъ*, *жабникъ жегунецъ*, либо *нарывной пластырь*, къ животу снаружи противъ мѣсть, одержимыхъ болѣю, а въ послѣднемъ они приглядываются къ тѣмъ мѣстамъ, которыя до того были поражены лomotю или ревматизмомъ, въ той постепенности и порядкѣ, какъ они показаны.

Примѣч. Если колику будетъ сопровождать воспаленіе, то см. воспаленіе кишекъ.

## Поносъ.

Определеніе. Поносъ есть частое, болѣе или менѣе жидкое и многоколичественное испраженіе низомъ, предшествуемое и сопровождаемое кишечными спазмами.

Признаки. Общая форма поноса ограничивается собственно усиленными, ускоренными и учащенными испраженіями на низъ, болѣе

или менѣе неправильнаго качества. Что же касается до частныхъ формъ поноса, то онѣ столько различны, сколько различны его видоизмѣненія.

Раздѣленіе. По присутствію и отсутствію лихорадочныхъ принадлежностей поносъ раздѣляется на *лихорадочный* и *не лихорадочный*. По неправильному качеству самыхъ испражнений поносъ бываетъ: 1) *Сырой*, когда извергаются испраженія, состоящія изъ непереваарившихся пищевыхъ и питьевогохъ веществъ. 2) *Желчный*, когда въ испраженіяхъ находится много желчи. 3) *Мокротный*, когда испраженія обнаруживаютъ слизистое или мокротное свойство. 4) *Водянистый*, (мыть), когда испраженія бываютъ водянисты. 5) *Млечный*, когда испраженія походятъ на млечный питательный сокъ. 6) *Гнойной*, когда испраженія бываютъ гнойныя. 7) *Кровянистый*, когда испраженія обнаруживаютъ присутствіе крови и походятъ на густыя мясныя помои. 8) *Гнилостный*, когда испраженія обнаруживаютъ гнилостныя свойства.

Но главное существенное различіе поноса состоитъ въ его происхожденіи, по которому онъ раздѣляется на:

1) *Первоначальный*, происходящій въ слѣдствіе прямого дѣйствія причинъ производящихъ на желудочно-кишечный каналъ.

2) *Послѣдовательный*, происходящій отъ другихъ болѣзней въ тѣлѣ, который подраздѣляется на: а) *переносный*, происходящій отъ переноса какой либо болѣзненной матеріи съ другихъ органовъ на кишечный каналъ; б) *припадочный*, происходящій въ слѣдствіе общаго болѣзненнаго состоянія тѣла. Сюда принадлежитъ поносъ собственно первоначальный, какъ наи чаще случающійся у поселянъ.

Причины первоначальнаго поноса внутреннія (предрасполагающія):

1) слабость желудка, излишняя раздражительность кишечнаго канала, особенно въ слѣдствіе предшествовавшихъ въ немъ болѣзней, по которой расположены бываютъ къ поносу люди слабые, нѣжные и особенно тѣ, которые перенесли сильную болѣзнь, напр. воспаленіе, горячку и т. п.; а женщины, много потерявшія отъ трудныхъ родовъ. 2) Полносочное тѣлосложненіе, по которому расположены бываютъ къ поносу болѣе слизистому люди мокротные, полные, сырые. 3) Многожелчность, по которой расположены къ поносу болѣе желчному люди желчныя, сердитые, злобныя, у которыхъ отдѣляется много желчи и печень бываетъ раздражительна.

Причины первоначальнаго поноса виѣшнія (производящія): 1) *неудобоваримал* по своему качеству и количеству *пища и питье*; сюда принадлежатъ всѣ излишніе слизистыя вещества, особенно мучная, сдобная, рыбная пища, сладкіе, соленые плоды и овощи, вещества жирныя, масляныя, напр. мясо баранье и свиное, приправа кушаній большимъ количествомъ выжатыхъ маселъ, какъ то: коноплянаго, маковаго, орѣховаго, льнянаго и т. п. жареные въ маслѣ и сметанѣ грибы, особенно болѣе или менѣе вредныя, напр. опенки, сморчки и т. п., вредное и ядовитое вліяніе которыхъ распознается особенно ихъ пестротою и пустымъ корнемъ; всѣ сладкокислыя вещества, особенно составляемыя изъ медовыхъ

веществъ съ кисловатыми, напр. буза, пиво съ медомъ, медъ съ квасомъ, кислыми яблоками и т. п.; дурная, болотная, стоячая, испортившаяся вода. 2) Холодъ, непосредственно дѣйствующій на кишечный каналъ, и вообще *простуда*, по которой происшедшій поносъ называется простуднымъ (катарральнымъ), которому преимущественно бывають подвержены охотники и земледѣльцы въ лѣтнее время, точно также, какъ и натужному, кровавому поносу, который часто начинается и оканчивается этимъ простымъ. 3) Угнетающія страсти: боязнь, испугъ, гнѣвъ и другія душевныя пораженія. 4) Поглощеніе ядовитыхъ веществъ.

Причины послѣдовательнаго поноса, какъ припадочнаго такъ и переноснаго, состоятъ въ многочисленныхъ болѣзняхъ, изъ которыхъ глисты случаются у поселянъ чаще другихъ болѣзней.

Сущность состоитъ въ раздраженіи кишекъ и усиленномъ оттого ихъ движеніи, которымъ кишки извергають остатки пищи.

Распознаваніе поноса отъ другихъ болѣзней вообще *просто*; въ частности же распознаваніе его видовъ требуетъ точнаго изслѣдованія: 1) качествъ испражняемаго; 2) причинъ, какъ предрасполагающихъ, такъ и производящихъ.

Предсказаніе относительно опасности для жизни, большею частью, *неважно*, за исключеніемъ поносовъ припадочнаго и переноснаго, которые очень легко могутъ быть смертельными. Относительно продолжительности болѣзни предсказаніе основывается на слѣдующемъ расчетѣ: всѣ поносы первоначальные нерѣдко проходятъ и сами собою излѣчиваются гораздо скорѣе, нежели всѣ прочіе; поносы переносные скорѣе проходятъ и излѣчиваются, чѣмъ припадочные, за исключеніемъ поноса критическаго, который обыкновенно самъ собою оканчивается въ короткое время, если только кончилась болѣзнь, произведшая его.

Исходы. Въ *здоровье* легко переходять поносы первоначальные; изъ послѣдовательныхъ, обыкновенно, критическій. Въ *другія болѣзни*, какъ то: хроническое ослабленіе кишечнаго канала, выпаденіе заднепроходной кишки, изнуреніе силъ и питанія и разрушительныя изъязвленія кишечнаго канала. Въ *смерть* легко переходять поносы припадочные, разрушительные, гнилостные и другіе, чрезъ изнуреніе тѣла.

Лѣченіе діететическое, въ отклоненіе и удаленіе причинъ, производящихъ поносъ, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) людямъ, *подверженнымъ частымъ возвратамъ* поноса по особенной слабости желудка, или по излишней раздражительности кишекъ, должно въ предостороженіе себя *остерегаться* отъ вреднаго вліянія вышесчисленныхъ *причинъ производящихъ*, именно они должны жить на діетѣ, избѣгать неудобоваримой и не здоровой пищи и питья, беречься отъ простуды, отъ мокроты, отъ всего, что можетъ остановить испарину, уклоняться отъ дѣйствія всѣхъ сильныхъ страстей, какъ то: отъ страха, испуга, гнѣва и др. под. Правила предохранительныя діететическаго лѣченія кроваваго поноса для поселянъ-земледѣльцевъ относятся и къ этому поносу, которымъ очень нерѣдко начинается и оканчивается кровавый,

или натужный. 2) *Подвергающийся* этому поносу периодически, какъ у нѣкоторыхъ людей бываетъ онъ самъ по себѣ, безъ всякихъ причинъ и повода, въ урочныя времена года, какъ то: вссною, а болѣе осенью, у младенцевъ во время прорѣзыванія зубовъ, *не должны опасаться и останавливать его*. Такой поносъ есть стремленіе природы изгнать болѣзнетворную матерію, которая, если бы она осталась въ тѣлѣ, то произвела бы дурныя послѣдствія. Это есть долгъ, который они платятъ природѣ, чтобы послѣ наслаждаться постояннымъ здоровьемъ, особенно если поносъ этотъ не обременителенъ, не изнурителенъ, не болѣзненъ (безъ рѣзи въ животѣ) для одержимаго имъ. 3) *Тогда* самое должно разумѣть и о водянистомъ поносѣ, или *мытъ*, который, какъ скоро онъ происходитъ не вслѣдствіе излишества въ столѣ и нездоровой пищи и питья, но, повидному, безъ причины. или отъ того только, что пища была недостаточно пережевана, не требуетъ никакого лѣченія, ни даже самой діеты; такой поносъ есть не столько болѣзнь, сколько спасительное средство, употребляемое натурою для возстановленія порядка въ работахъ органической фабрики тѣла и къ возвращенію аппетита. Но ежели мытъ произошелъ отъ вышеупомянутыхъ причинъ, т. е. послѣ излишества въ столѣ, или отъ нездоровой пищи и питья, то діета становится нужною, и больной долженъ воздерживаться отъ мясной пищи и питаться кашницею, овсяною, полбеною, пшенной, манною, сарачинскою, гречевою крутою кашею съ масломъ (не съ молокомъ) и другими веществами мучными и овощными, пока обремененный желудокъ возвратитъ свои силы, а съ ними и аппетитъ. Мытъ рѣдко продолжается долгое время, онъ вообще проходитъ чрезъ день, или черезъ два. Если же онъ продолжается долѣе, то зависитъ отъ какой нибудь болѣзненной причины, которую должно стараться удалить. 4) Да и вообще никогда не должно приниматься *лечить поносъ*, какого бы рода онъ ни былъ, *прежде, нежели узнана* будетъ причина его. Когда же причина будетъ найдена, то важнѣе всего обратить вниманіе на *диету; она должна быть прежде нѣсколько снисходительная*: кромѣ кашницъ и кашъ, особенно гречневой крутой, которая, когда вынимаютъ изъ печи и снимаютъ верхнюю съ нея корку, издаетъ особый своего рода букетъ, съ коровьимъ масломъ (но не съ молокомъ), въ томъ числѣ иногда и пшенной молочной и саговой съ краснымъ виномъ и корицею, можно давать также небольшое количество жаренаго мяса, легкаго говяжьяго, куринаго, бараньяго и телячьяго, или теплой студени изъ бараньей головы, а въ питье сухарную, овсяную, ячную воду; *потомъ*, когда больной все-таки ослабѣваетъ отъ болѣзни, діета назначается *строгая*, при которой не позволяется никакой мясной пищи; если и этого недостаточно, то уже слѣдуетъ приступать къ существенному лѣченію лѣкарствами. 5) Въ поносѣ, происшедшемъ отъ простуды или остановки испарины, нужно сверхъ того *теплое содержаніе*, побыть дома въ своей теплой избѣ, мыть себѣ руки, ноги и голени въ теплой водѣ, носить на тѣлѣ, особенно на животѣ, кусокъ онучнаго бѣлага сукна или фланель, и употреблять

всѣ извѣстныя средства къ возстановленію испарины. 6) Въ поносѣ отъ душевныхъ потрясеній страстями *спокойствіе души* и веселость очень нужны. 7) Въ поносѣ отъ ѣдкихъ или ядовитыхъ проглоченныхъ въ желудокъ веществъ больному надобно *пить больше* вышеозначеннаго *слизистаго питья* съ прибавленіемъ *масла льнянаго, деревяннаго, изъ сладкаго миндаля*, или пить одинъ *жирный бульонъ*, чтобы, ослабивъ вредное дѣйствіе тѣхъ веществъ, скорѣе выгнать ихъ вонъ рвотою или усиленнымъ поносомъ. 8) Если поносъ происходитъ отъ употребленія дурной стоячей, озерной, колодезной воды, то употреблять такую воду не должно, а за неимѣніемъ воды лучшей должно ее поправлять, выставя ее въ широкогорлыхъ и чистыхъ глиняныхъ сосудахъ на свободный воздухъ на сутки и на сутки съ половиною; а во время дождя собирать въ большіе глиняные сосуды дождевую воду для употребленія, а въ зимнее время снѣжную; собирать ее нужно, впрочемъ, когда нѣтъ погоды или бури, въ отдаленіи отъ жилищъ, вскорѣ по выпаденіи, въ глиняные сосуды. Собранная такимъ образомъ вода снѣжная и дождевая — наилучшая для употребленія.

Лѣченіе существенное, состоящее въ уменьшеніи раздраженія кишекъ въ поносѣ, нужнымъ бываетъ тогда, когда онъ и самъ собою не проходитъ, и соблюденіе діететическихъ правилъ не приноситъ пользы, между тѣмъ больной видимо ослабѣваетъ, и другія обстоятельства показываютъ, что поносъ ему вреденъ и требуетъ собственно врачебной помощи; за неимѣніемъ же врача по близости должно ограничиться слѣдующимъ: Въ поносѣ отъ простуды, случающемся въ лѣтнее время, особенно въ іюлѣ и августѣ, нужно *произвести потъ пареніемъ въ бань*, теплымъ чаемъ изъ *соломы, сухой малины, чабера, ромашки, бузины, нартваніемъ живота* теплыми салфетками, мѣшками съ овсомъ, съ отрубями, лучше съ золою. Если этого недостаточно, и поносъ упоренъ, то самые упорные поносы, не уступавшіе никакимъ средствамъ, излѣчиваются у взрослыхъ и у дѣтей *отваромъ изъ черники*, употребляемымъ вмѣстѣ съ ягодами, которыя инымъ болѣе нравятся сухія, нежели разваренныя, и равно оказываютъ полезнѣйшее дѣйствіе. (Лучше отваривать ихъ въ простомъ, немурвленномъ горшкѣ). Въ поносахъ, происшедшихъ отъ излишества мочроты, *рвотное* есть самое лучшее лѣкарство; оно очищаетъ желудокъ, помогаетъ другимъ отдѣленіямъ и испражненіямъ, нужнымъ къ изгнанію остатковъ не сваренной въ желудкѣ дурной пищи и засореній отъ поносокъ. *Ипекакуаны*  $\frac{1}{4}$  золотника въ порошокъ съ теплою водою очень хорошо выполняетъ это показаніе. Спустя одинъ, или два дня послѣ рвотнаго надобно дать ползолотника *ревеню* и повторить этотъ пріемъ черезъ день или черезъ два еще разъ, два или три раза, если поносъ будетъ продолжаться. Въ поносѣ, происшедшемъ отъ душевныхъ потрясеній, требуется большая осторожность въ лѣченіи. Какъ рвотныя, такъ и слабительныя тутъ не у мѣста и совершенно бесполезны. Въ этомъ случаѣ помогаютъ собственно *противуспазматическія* средства. Нужно давать больному черезъ каждые 6 или 8 часовъ по 10-ти или 12-ти каплей *лавдана* (шафранной

настоянки опи́я), взятаго изъ аптеки, въ рюмкѣ настоя *валеріаны* (маунъ, буддырьянтъ), или *полевой маты*, до тѣхъ поръ, пока пройдутъ припадки болѣзни. Это же средство употребляютъ съ пользою и въ поносъ, происшедшемъ отъ проглоченныхъ ѣдкихъ или ядовитыхъ веществъ, для уменьшенія раздраженія кишекъ, только въ меньшихъ приемахъ (6—10 кап.) съ питьемъ слизистымъ.

Лѣчение поноса, послѣдовавшаго отъ болѣзни глистной, производится тѣми же средствами, какія употребляются противъ глистовъ.

Поносъ у дѣтей, большею частію, бываетъ: *Желудочный*, обнаруживающійся испраженіями низомъ слизистыми, зелеными, очень зловонными, въ видѣ нарубленныхъ кусковъ, свернувшася молока, вѣтрами и ворчаніемъ въ животигѣ.

*Причиною* такого поноса бываетъ либо худое пищевареніе матери, кормящей своею грудью, отъ того, что она употребляетъ пищу въ излишество или очень грубую, неудобоваримыя яства; или когда она страдаетъ запорами на низъ, или поносомъ, или часто огорчается, груститъ, сердится; либо отъ самого дитяти, когда молоко кормящей худо переваривается у него въ желудкѣ, или когда грудное дитя кормятъ жвачками, даютъ ему соски на рожкахъ не чистые, содержащія въ себѣ окисшее молоко. У взрослога же дитяти поносъ этотъ происходитъ отъ употребленія пищи грубой, неудобоваримой и въ излишество. 2) Поносъ *простудный*, происшедшій отъ простуды, особенно послѣ ванны, бани, оставленія дитяти въ сырость, холодномъ мѣстѣ, на сквозномъ вѣтру.

Лѣченіе поноса, лучше всего, діететическое, состоящее въ правильномъ содержаніи дитяти; для этого *кормящая* своею грудью мать *должна быть осторожна* во всемъ и покойна духомъ, чтобы не испортилось у ней молоко, и это не причинило бы вреда ея ребенку\*), котораго не должно кормить до времени надлежащаго его убрѣпленія ни пирожнымъ, ни жирнымъ, ни овощами, ни зеленью, не подвергать его ни холоду, ни моротѣ, ни сырости, соски на рожкахъ должно содержать въ чистотѣ, чтобы молоко въ нихъ не окисало. Но не только груднымъ, а и взрослымъ дѣтямъ грубая пища, неудобоваримая и въ излишество очень вредна. Эти правила должно особенно соблюдать, если дитя нездорово поносомъ; если

---

\*) Очень замѣчательнъ былъ одинъ случай въ моей практикѣ: для новорожденнаго младенца была избрана кормилицею женщина полная, здоровая, преданная, но съ блѣднымъ и чувствительнымъ выраженіемъ лица и на самомъ дѣлѣ очень сердобольная. На первой же недѣлѣ кормленія ея грудью обнаружилось у дитяти: поносъ, зеленыя испраженія низомъ, боль въ животѣ, а иногда рвота, не уступавшія никакимъ врачевнымъ средствамъ, и дитя въ теченіе мѣсяца до того изнурилось, что совсѣмъ было безнадежно къ жизни. Въ слѣдствіе моего упорнаго настоянія, кормилица замѣнена была другою, тучною, румяною, болѣе безпечною женщиною, и только что дитя стало сосать у нея грудь, какъ оно до изумленія обрадовалось перемѣнѣ и такъ охотно сосало, что всегда и на долгое время лежало спокойно на рукахъ ея; въ слѣдъ затѣмъ всѣ болѣзненные припадки тотчасъ прекратились, дитя сдѣлалось полно, здорово, и не подвергалось болѣе никакой болѣзни. (Др. Здр. 1847 г. № 47, стр. 372.)

же надлежащее содержаніе дитяти одно недостаточно для поправленія здоровья, такъ что дитя слишкомъ тощаетъ и слабѣетъ отъ болѣзни, то слѣдуетъ приступитъ къ употребленію лѣкарствъ. Въ поносѣ желудочномъ, за неимѣніемъ врача, обыкновенно даютъ *ревенный простой сиропъ* (№ 176) по чайной ложечкѣ одинъ и два раза въ день, поутру и на ночь. Если одного этого средства бываетъ не достаточно, зеленія испражненія продолжаютъ и выходятъ какъ бы нарубленными кусками, то причиною тому бываетъ кислота въ кишкахъ; въ такомъ случаѣ хорошо прибавлять къ ложечкѣ ревеннаго сиропа нѣсколько *магнезіи*, либо *толченаго угля* (для маленькихъ дѣтей ежедневно вѣсомъ отъ 6-ти до 8-ми ячменныхъ зеренъ; для взрослыхъ дѣтей болѣе). Въ простудномъ же поносѣ взрослое дитя достаточно напоить на ночь чаемъ изъ липовыхъ или бузиновыхъ цвѣтовъ, либо сбитнемъ, такъ чтобы оно вспотѣло. Для прекращенія же такого поноса у грудныхъ дѣтей, потогонное питье нужно дать кормящей грудью матери (кормилицѣ), а дитятъ сдѣлать *ванну*, потомъ обложить животикъ шерстянымъ платкомъ или фланелью и *держатъ ножки въ тепль*. *Картофельный киселекъ* (желе) одобряется въ поносѣ у дѣтей обоихъ родовъ: онъ уменьшаетъ раздраженіе кишекъ, питаетъ и укрѣпляетъ дитя. Его можно давать черезъ каждый часъ или два по чайной ложечкѣ съ сахаромъ. Въ простонародѣ, при продолжительныхъ поносахъ, съ отличною пользою употребляютъ *отваръ изъ сушеныхъ грушъ*, или *сушеной черники*, и даютъ его пить взрослымъ дѣтямъ раза четыре въ день по половинѣ чайной чашки. Съ тою же цѣлью употребляютъ *сухари черного хлѣба* (хорошо высушенные). Взявъ ихъ шесть золотниковъ, ревеню три золотника, толкутъ все въ тонкій порошокъ и даютъ шесть разъ въ день по полужолотнику на пріемъ въ слабомъ настоѣ ромашки или въ отварной водѣ. *Молоко изъ маковыхъ стѣмянъ*, подслащенное, можно давать одно каждыя два часа по одной или по двѣ чайныя, либо столовыя ложки. *Сиропъ изъ ягодъ черемухи* оказываетъ благотворное дѣйствіе въ простомъ дѣтскомъ поносѣ. Давать его въ началѣ этой болѣзни нужно два, три раза въ день по чайной или десертной ложкѣ, смотря по возрасту. Поносъ прекращается, и дитя успокоивается. Притомъ средство это имѣетъ пріятный вкусъ и охотно принимается дѣтьми. Приготавливаютъ его такъ: взявъ двѣ чайныя чашки спѣлыхъ ягодъ, толкутъ ихъ, раздробляя косточки, въ каменной или деревянной посудѣ, съ прибавленіемъ одной чашки чистой воды, и въ выжатый сокъ прибавляютъ сахару столько, сколько нужно для сдѣланія сиропа. *Припарки* изъ простой *мяты* и изъ *слыной трухи*, прикладываемыя теплыя къ животу, хорошо дѣйствуютъ во всѣхъ видахъ поноса. *Ванны* составляютъ важное вспомогательное, а иногда единственное средство противъ поноса. Чаще дѣлаютъ ихъ съ простою мятою или слыною трухою. Въ изнурительныхъ поносахъ ванны приготавливаютъ изъ отвара телячьихъ и бараньихъ ножекъ, или всего того, изъ чего вывариваютъ мясной бульонъ.

Прим. Завитокъ или рвота низовыми испражненіями есть болѣзнь,



принадлежащая къ числу рѣдкихъ случаевъ, и потому излишне будетъ ее здѣсь описывать.

## Желудочно-кишечныя спазмы.

**О П Р Е Д Ъ Л Е Н І Е.** Желудочно-кишечныя спазмы обнаруживаются спазматическими движеніями и болями желудочно-кишечнаго канала и сопровождаются охлажденіемъ и судорогами конечностей, рвотою и поносомъ вмѣстѣ, а иногда ни рвоты, ни поноса не бываетъ.

**Р а з д ѣ л е н і е.** Желудочно-кишечныя спазмы раздѣляются на: 1) *Сухія*, т. е. не сопровождаемыя ни рвотою, ни поносомъ или собственно такъ называемые *вѣтры*. 2) *Мокрыя*, т. е. сопровождаемыя рвотою и поносомъ вмѣстѣ, или собственно такъ называемая *холера*, появляющаяся въ народѣ или частно (спорадически), или повально (эпидемически).

## Вѣтры.

**О П Р Е Д Ъ Л Е Н І Е.** Вѣтры есть болѣзнь, состоящая въ развитіи газовъ въ желудочно-кишечномъ каналѣ по недостатку въ нихъ упругости и силъ, и въ выходѣ ихъ съ выстрѣломъ, какъ чрезъ пищепріемный каналъ изо рта, такъ и изъ задняго прохода.

**Р а з д ѣ л е н і е.** Вѣтры по различію занимаемыхъ ими мѣстъ и по различнымъ, сопровождающимъ ихъ болямъ составляютъ разныя вѣтренныя болѣзни: 1) *бурчаніе* въ животѣ, когда вѣтры протекаютъ съ шумомъ и безъ боли различныя обороты желудочнаго канала: 2) *тученіе живота*, когда вѣтры скоро расширяютъ желудокъ и кишки, такъ что все подбрюшіе значительно поднимается и напрягается, особенно около подреберьевъ; 3) *вѣтреная колика*, когда вѣтры стремительно и безъ шума, пробѣгая съ одной стороны живота къ другой, собираясь и спираясь въ какой нибудь части кишечнаго канала, производятъ сильныя, острыя, колючія боли. Эта болѣзнь принадлежитъ къ кишечнымъ спазмамъ и тамъ она подробно описана особо. 4) *Барабанное напряженіе живота*, когда вѣтры, собираясь мало по малу въ желудкѣ и кишкахъ въ продолженіе довольно долгаго времени, накопляются въ значительномъ количествѣ, такъ что составляютъ постоянную, не уменьшающуюся надутость или опухоль живота до такой напряженной упругости, что при удареніи онъ издаетъ барабанный звукъ.

**П р и ч и н ы** внутреннія (предрасполагающія): слабость нервовъ желудочно-кишечнаго канала или такое нервическое состояніе тѣла, по которому всѣ расположенныя къ нервнымъ болѣзнямъ, особенно женщины, расположены бывають также ко всѣмъ упомянутымъ родамъ вѣтровъ, изъ которыхъ одни бывають въ одно, другіе въ другое время, иногда они слѣдуютъ одни за другими, а иногда въ одномъ больномъ видимы бывають нѣкоторые изъ нихъ вмѣстѣ.

Причины вѣшнія (производящія). Сырья, вѣтротворныя пищевыя вещества, какъ то: сушенныя и копченныя мяса, бобы, капуста, рѣпа, брюква и др., особенно при сидячемъ образѣ жизни, могутъ производить эти болѣзни при извѣстномъ къ нимъ расположеніи; люди сильные и здоровые рѣдко бываютъ имъ подвержены, развѣ черезчуръ наѣдятся или будутъ пить не перебродившіе еще напитки, содержащіе въ себѣ много упругаго воздуха. Вѣтрамъ подвержены въ особенности шведы, вышивальщицы, кружевницы, штопальницы, или женщины, занимающіяся шитьемъ платья, бѣлья, вышиваніемъ, плетеніемъ кружевъ, штопаньемъ, также чулочники и чулочницы.

Сущность состоитъ въ неправильной раздражительности желудочно-кишечныхъ нервовъ, производящей спазматическое состояніе, при которомъ червообразное (перистолитическое) движеніе желудка и кишекъ и отдѣленіе въ нихъ, болѣе или менѣе, ослабляются и уменьшаются.

Распознаваніе. Сухіе, желудочно-кишечныя спазмы, или вѣтры, отличаются отъ мокрыхъ спазмъ, или отъ холеры, отсутствіемъ изверженія, особенно мокраго.

Предсказаніе зависитъ отъ большей или меньшей удалимости причинъ производящихъ и ихъ важности, такъ что чѣмъ легче онѣ удаляются и чѣмъ онѣ менѣе важны, тѣмъ предсказаніе въ обоихъ отношеніяхъ, т. е. и относительно опасности жизни, и относительно продолжительности болѣзни,—лучше, и наоборотъ.

Исходы: въ *здоровье* (переходятъ только при совершенномъ удаленіи производящихъ причинъ). и въ *болѣзни* воспалительныя. *Смертию* оканчиваются не иначе какъ въ слѣдствіе воспаленій.

Лѣченіе діететическое, состоящее въ удаленіи причинъ predisposing и производящихъ вѣтры, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Всѣ, подверженные вѣтрамъ, до и во время ихъ, должны избѣгать вышеупомянутыхъ причинъ, производящихъ эту болѣзнь, относительно употребляемой ими пищи. 2) Одержимымъ болѣзнію въ особенности должно совѣтовать *взъимать* употреблять одну *воду*, смѣшивая ее съ небольшимъ количествомъ водки, простой или французской; напитокъ этотъ не только предпочитается пиву, но во многихъ случаяхъ превосходитъ и самое вино. 3) *Тѣлодвиженіе* отъ вѣтровъ превосходитъ всякаго лѣкарства, какъ для предотвращенія происхожденія вѣтровъ, такъ и для облегченія изгнанія ихъ; но не медленная прогулка шагомъ, пѣшкомъ, или въ экипажѣ, а труды и дѣятельныя забавы, приводящія въ движеніе всѣ части тѣла, могутъ прогнать вѣтры, исправить predisposing къ нимъ и закончить дѣло блистательнымъ успѣхомъ. 4) Чтожъ касается до вышеупомянутыхъ ремесленниковъ, то для нихъ начертаны особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію въ концѣ лѣчебника.

Лѣченіе существенное состоитъ въ изложеніи лѣкарственныхъ средствъ къ изгнанію вѣтровъ изъ желудочно-кишечнаго канала и предотвращенію возрожденія ихъ посредствомъ укрѣпленія послѣдняго. Наилуч-

шія вѣтродонныя средства, къ которымъ, за неимѣніемъ по близости врача, можно прибѣгнуть, суть: сѣмена *анисовыя, тминныя, укропныя, кинициповыя* и *ароматическія травы*, особенно *мята перечная и простая*, употребляемая какъ чай въ тепломъ настоѣ, отвары *можжевельныхъ ягодъ*, корней: *имбиря* и *цытварнаго*, приготовляемые по примѣру отваровъ, значащихся въ № 1, 2, 3, 4, но употребляютъ ихъ истертые въ порошокъ по половинѣ золотника 4 раза въ день и болѣе съ водою, и даже употребляютъ ихъ и въ кускахъ, разжевывая и проглатывая понемногу, но почаще, какъ ревенъ. Въ случаѣ запора на низъ можно давать *имбирь* въ соединеніи *съ сабуромъ*. Взявъ  $\frac{1}{4}$  золотн. имбирю и  $\frac{1}{2}$  золотн. сабуру, стереть вмѣстѣ и давать по такому приему съ водою нѣсколько разъ въ день, пока достаточно прослабитъ и очиститъ. Простонародное средство, подъ названіемъ *чудное лекарство*, состоящее изъ 3 золотн. сабура, 3 золотн. *нашатиря* и 3 золотн. *крупной водки*, распущенныхъ въ *штофъ* отварной *воды*, дается по рюмѣ отъ 2 до 4 разъ въ день, нерѣдко съ видимою пользою. Когда вѣтры сопровождаютъ приступъ ломоты, то наилучшимъ лѣкарствомъ для нихъ можетъ быть *рюмка французской водки* или *ароматической воды*, приготовленной перегонкою изъ травъ: *душицы, ромашки, мяты* и *полыни*, или настоенный кипяткомъ *имбирь*. Если вѣтрамъ подвержены бывають женщины около того времени, въ которое натурально перестаютъ течь у нихъ мѣсячныя ихъ очищенія, то *кровопусканія* для нихъ въ этомъ случаѣ часто бывають гораздо спасительнѣе, нежели всѣ другія лѣкарства, особенно посредствомъ *пьявокъ* или *рожковъ*, приставляемыхъ къ нижней части живота, поясницѣ и заднему проходу.

## Холера частная (спорадическая).

**ОПРЕДѢЛЕНІЕ.** Холера частная обнаруживается рвотою и поносомъ, охлажденіемъ и судорогами въ конечностяхъ и появляется въ разныя времена года, особенно лѣтомъ, только у нѣкоторыхъ, видимо подвергшихся какому либо болѣзнетворному вліянію.

**ПРИЗНАКИ.** Неприятное ощущеніе подъ ложечкою и перебирание въ животѣ, нерѣдко дурнота, воздушная отрыжка, изверженіе вѣтровъ низомъ, иногда вдругъ рвота и потомъ тотчасъ, или спустя нѣсколько времени, поносъ. Такія изверженія верхомъ и низомъ нерѣдко возвращаются черезъ каждую  $\frac{1}{4}$  часа и даже чаще, а иногда черезъ полчаса и рѣже. Извергаемое какъ рвотою, такъ и поносомъ, прежде обыкновенно состоитъ изъ пищевыхъ и питьевого веществъ, потомъ извергается матерія желчная, а чаще мокротная, слизистая, кислая, нерѣдко сходная съ недовареннымъ бѣловатымъ мяснымъ бульономъ. Съ появленіемъ этихъ изверженій появляются, обыкновенно, корчи въ конечностяхъ, особенно въ нижнихъ, притомъ руки и ноги, а вмѣстѣ и вся поверхность тѣла, чрезвычайно холодѣютъ и въ тоже время покрываются водянистымъ холоднымъ потомъ. Лицо блѣдное, осунувшееся, глаза мутныя, нерѣдко сле-

зящіе, жажда, не смотря на совершенную влажность языка, нерѣдко неутолимая; мочеиспражненіе или частое, малоколичественное, водянистое, или, напротивъ, чрезвычайно рѣдкое и часто совѣсьмъ пріостановленное. Сверхъ того, особенно въ высшихъ развитіяхъ болѣзни, къ сказаннымъ припадкамъ присоединяются спазмы грудныя, особенно трепетаніе и щемленіе сердца: этотъ *періодъ* болѣзни называется *спазматическимъ*. Если натура одна, или при содѣйствіи искусства, превозможетъ болѣзнь, то всѣ сказанные припадки мало по малу ослабѣваютъ, больные, согрѣваясь отъ развитія внутренней теплоты, засыпаютъ и, при повсемѣстномъ тепломъ потѣ, совершенно успокоиваются, оставаясь еще болѣе или менѣе слабыми. Но если ни натура, ни искусство не побѣдятъ болѣзнь, то наступаетъ *періодъ воспалительный*, боли въ животѣ, языкъ сохнетъ, рвота и поносъ сами по себѣ останавливаются, судороги и грудныя спазмы утихаютъ, сухость и жажда становятся постоянными; вмѣсто холода развивается жаръ и волненіе въ крови. Моча малоколичественная, красная, жгучая. Потомъ, если болѣзнь не будетъ побѣждена ни натурою, ни искусствомъ, больные переходятъ въ состояніе, подобное слѣдующему за воспаленіемъ желудка, кишекъ и другихъ внутренностей, и наконецъ умираютъ. Иногда случается, что больные при сильномъ развитіи болѣзни умираютъ въ періодѣ ея спазматическомъ, вслѣдствіе изнуренія, матеріальнаго и динамическаго, безъ всякихъ воспалительныхъ признаковъ въ желудочно-кишечномъ каналѣ.

Причины внутреннія (предрасполагающія). Предрасположеніе состоитъ въ брюшномъ полнокровіи, особенно сопряженномъ съ ослизненіемъ желудочно-кишечнаго канала и изліяніемъ въ него излишней и острой желчи. Впрочемъ при сильной производящей причинѣ болѣзнь очень легко можетъ развиваться безъ всякаго къ ней расположенія, даже при противуположномъ сказанному состояніи тѣла.

Причины внѣшнія (производящія). 1) Неудобоваримая пища собственно качества слизистаго, равнымъ образомъ пища сладковислая, жирная, масляная и особенно не зрѣлыя сырыя овощи и плоды, огурцы, дыни, вишни, коровье масло, свиное сало, ветчина, свинина, особенно малопросольные жареные поросята (холера желудочная — диспептическая). 2) Быстро и сильно развивающееся простудное состояніе желудка и кишекъ, производимое какъ охлажденіемъ поверхности тѣла (простудю кожи), такъ и непосредственнымъ дѣйствіемъ холоднаго питья или кушанья на желудокъ, особенно недавно пресыщенный. Въ такомъ случаѣ холера можетъ называться катарральною (простудою). 3) Въ отроческомъ возрастѣ при сильной мокротности желудочно-кишечнаго канала холеру производятъ круглые глисты, и потому она называется глистною. 4) Злоупотребленіе рвотно-слабительныхъ лѣкарствъ, употребляемыхъ по способу Леруга. 5) У меня былъ случай, гдѣ холера происходила отъ чрезмѣрно излишняго куренія табаку (табачная холера). 6) Буханъ говоритъ, что она можетъ быть причинена сильными впечатлѣніями на

душу, именно сильными страстями, какъ то: страхомъ, гнѣвомъ и проч. (холера динамическая).

Сущность состоитъ въ неправильной раздражительности нервовъ желудочно-кишечнаго канала, сопровождаемой спазмами конечностей и сердца, противу-червообразнымъ (противу-перисталтическимъ) движеніемъ желудка и увеличеннымъ червообразнымъ движеніемъ кишокъ, при обильномъ отдѣленіи и испраженіи въ первомъ и въ послѣднихъ.

Распознаваніе холеры отъ вѣтровъ очень легко по присутствію рвоты и поноса. Отъ кроваваго поноса холера отличается тѣмъ, что 1) поражаетъ вдругъ больного и оканчивается въ 3, рѣдко въ 7 и 8 дней; 2) что кровавое испраженіе въ ней бываетъ рѣдкимъ и случайнымъ явленіемъ, а въ поносѣ кровавомъ постояннымъ и существеннымъ, даже съ начала болѣзни; 3) жиленые или напрасные позывы къ испраженію въ холерѣ не такъ упорны; 4) рвота бываетъ въ кровавомъ поносѣ только случайно, а въ холерѣ, напротивъ, она есть существенный, сопровождающій ее признакъ; 5) кровавый поносъ заразителенъ, а частная холера, напротивъ, нисколько. Отъ повальной холеры частная холера отличается отсутствіемъ синевы поверхности тѣла, особенно конечностей и лица, равно и отсутствіемъ особеннаго блеска глазъ, свойственнаго повальной холерѣ.

Предсказаніе относительно опасности для жизни довольно *хорошо*, такъ что рѣдко больные умираютъ отъ этой болѣзни, особенно если подана будетъ правильная помощь. Въ отношеніи къ продолжительности болѣзни, предсказаніе еще лучше, потому что болѣзнь рѣдко продолжается болѣе трехъ дней. Впрочемъ, если она перейдетъ въ періодъ воспалительный, то можетъ продолжиться гораздо большее время.

Исходы: въ *здоровье* съ удаленіемъ причины, въ *другія болѣзни* — воспаленіе желудочно-кишечнаго канала съ ихъ послѣдствіями. *Смертью* оканчивается или прямо чрезъ истощеніе питанія, или при посредствѣ воспаления съ его послѣдствіями.

Лѣченіе диететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) Въ предохраненіе отъ этой болѣзни, особенно отъ ея возврата, должно совѣтовать быть *осторожнымъ* отъ вреднаго вліянія всѣхъ *причинъ, производящихъ* эту болѣзнь. 2) Больные, одержимые холерою частною, должны употреблять пищу *удобоваримую, питательную*, но въ *маломъ* количествѣ. 3) *Выздоровливающему* отъ этой болѣзни надлежитъ *дѣлать умеренное тѣлодвиженіе*. 4) *Для укрѣпленія* ослабѣвшаго желудка и кишокъ пить нѣсколько времени винный *настой тысячелистника, трилистника, полыни* или другой горечи.

Лѣченіе существенное, состоящее изъ удаленія причинъ болѣзни и уменьшенія раздраженія желудочно-кишечнаго канала, требуетъ по важности и скоротечности болѣзни приглашенія врача, а за неимѣніемъ его по близости должно ограничиться слѣдующею врачебною ограниченою помощію. Такъ какъ рвота и поносъ въ началѣ появленія холеры всегда означаютъ дѣйствіе усилія самой природы къ избавленію се-

бя отъ болѣзнетворной матеріи, то надобно совѣтовать помогать ей въ этомъ, въ слѣдствіе чего больному нужно принимать разъ за разъ, по большимъ рюмкамъ, разжижающія питія, какъ то: сыворотки, сыворотки послѣ паханья, легкаго ячнаго или овсянаго отвара, особенно самаго легкаго, жидкаго цыплячьяго или телячьяго бульона, — которыя не только нужно пить по многу для продолженія рвоты, но и наставлять себя *промывательныя* изъ нихъ чрезъ каждый часъ, для вспомошествованія изверженію низомъ. Потомъ, какъ скоро эти цѣлебныя изверженія продолжаются нѣкоторое время, давать больному пить настоенную на *овсяномъ сушеномъ хлѣбѣ* или *сухаряхъ воду*, чтобы мало по малу умирить и остановить рвоту. *Хлѣбъ* этотъ долженъ быть подсушенъ или *изжаренъ* такъ, чтобы онъ сдѣлался темнокраснымъ, а потомъ онъ варится въ ключевой водѣ: ежели не случится имѣть такого хлѣба, то вмѣсто его можно употребить пшеничный, или въ случаѣ нужды — ржаной, довольно изжаренный. Если это питіе не уймётъ рвоты, а больной видимо ослабѣваетъ и силы его уменьшаются, то давать ему чрезъ каждый часъ, пока не перестанетъ рвота, по рюмкѣ гислага *кремортарнаго питія* (№ 178), въ которое прибавлять по 10-ти капель *лавдана*, взятаго изъ аптеки по рецепту. Если же, напротивъ, рвота и поносъ не изнуряютъ больнаго и силы его не ослабѣваютъ, то не должно очень спѣшить останавливать рвоту и поносъ, а напротивъ, надлежитъ поддерживать ихъ и даже возбуждать, пока они не ослабляютъ больнаго. Послѣ рвоты и поноса, для возбужденія испарины, а если она уже показалась, то для поддержанія и усиленія ея, полезны: теплый *чай* изъ *мяты*, *шалфея* и *липовыхъ цвѣтзовъ*, взятыхъ поровну, либо изъ сухой *малины* и *богородской травы*, съ прибавленіемъ небольшого количества простаго вина, настоеннаго на *древесныхъ угольяхъ*, (для отнятія у него сивушнаго запаха), или французской водки и рома. Этотъ лѣкарственный *пуншевый чай* возбудитъ испарину сильнѣе и поддержитъ силы больнаго. При этомъ очень хорошо укутать себя въ теплое одѣяло, приложить къ подошвамъ ногъ *теплые куртичи*; сверхъ того приложить противъ желудка *фланель* или *кусокъ сукна*, обмоченный въ теплое вино съ *краснымъ уксуомъ*. Какъ скоро больной достаточно вспотѣетъ, надобно всего его вымыть (особенно ноги) въ теплой водѣ, вытереть досуха и дать лечь отдохнуть въ постели или уснуть для вознагражденія потери силъ. Когда жестокость болѣзни такимъ образомъ отъ принятыхъ мѣръ прошла, то для предупрежденія возврата ея нужно продолжать чрезъ нѣсколько времени употребленіе лавдана по малому приему; давать его отъ 10 до 12-ти капель въ рюмкѣ вина два раза въ сутки, въ продолженіе 8—10 дней, съ соблюденіемъ надлежащей осторожности какъ въ пищѣ и питіи, такъ и въ охраненіи себя отъ простуды.

## Повальная холера.

Это болѣзнь индійская, свирѣпствовавшая въ Россіи въ 1830. 1847

и 1848 годах, для пользованія которой правительство всюду и вездѣ назначаетъ врачей: до прибытія же ихъ можно съ успѣхомъ употреблять тѣже средства какъ и при холерѣ частной, — спорадической.

## Злая корча.

**Определение.** Злая корча есть судорожное сократительное движеніе сгибающихъ мышцъ конечностей, такъ что сводитъ руки и ноги съ нестерпимою болью до безпамятства, и движеніе это, на нѣкоторое время переставшее, затѣмъ снова возвращается.

**Признаки.** Сначала чувство нездоровья, лихорадочное состояніе, боль головы и подъ ложечкою, горечь во рту, бѣлый не чистый языкъ, тошнота, а часто и рвота, потомъ жажда, то недостатокъ аппетита, то обжорливость, то запоръ, то чаще поносъ, чувство ползанія мурашекъ по рукамъ, ногамъ и особенно по спинѣ (отличительный признакъ); наконецъ появляется корча въ мышцахъ, которая сводитъ руки, ноги, причиняетъ нестерпимыя боли, больной впадаетъ въ безпамятство, которое вмѣстѣ съ корчею продолжается 5, 10 и 20 минутъ; послѣ этого больной приходитъ въ себя, чувствуетъ слабость, а чрезъ нѣсколько времени опять впадаетъ въ то же состояніе.

**Причины внѣшнія (производящія).** Корча почти исключительно происходитъ отъ употребленія въ пищу ржаного и пшеничнаго хлѣба, испеченнаго изъ муки, которая приготовлена изъ ржи или пшеницы, содержащихъ въ себѣ *черные* большіе *рожки* (спорынья) *изгарь*, *куколь*. Почти ежегодно она появляется у насъ въ разныхъ губерніяхъ осенью, когда крестьяне начнутъ печь хлѣбъ изъ новой ржи, не очищенной отъ рожковъ, самые же рожки зараждаются во ржи, посѣянной на низменныхъ болотистыхъ мѣстахъ, на нивахъ, находящихся въ тѣсу и не освѣщаемыхъ достаточно солнцемъ, также въ сырое, дождливое лѣто.

Сущность злой корчи состоитъ въ лихорадкѣ, неправильной раздражительности сгибающихъ мышцъ конечностей (рукъ и ногъ) и приливахъ крови къ головѣ.

**Распознаваніе** легко.

**Предсказаніе** въ злой корчѣ, относительно опасности для жизни и продолжительности болѣзни, зависитъ отъ удаляемости причинъ производящихъ, при дѣйствіи которыхъ она *опасна* и бываетъ *смертельною*; продолжается она отъ 9 до 14-ти дней и болѣе; въ это время больные, съ удаленіемъ причинъ болѣзни, поправляются, оставаясь долгое время слабыми, а безъ того или умираютъ, или страдаютъ долгое время послѣдствіями болѣзни.

**Исходы:** въ *здоровье* съ удаленіемъ причины болѣзни; въ *другія болѣзни*, именно *рожу*, переходящую въ *омертвѣніе*, лишшающее большого пальцевъ, даже рукъ и ногъ (калѣки), *лишеніе разсудка*, *изнуреніе тѣла*, *водянку* и проч. *Смертію* болѣзнь оканчивается или отъ

удара въ слѣдствіе прилива крови къ головѣ, или отъ послѣдствій другихъ болѣзней.

Лѣченіе діететическое, состоящее въ отклоненіи и удаленіи производящихъ причинъ болѣзни, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) Первымъ дѣломъ должно быть *очищеніе ржи* отъ спорыи и (черныхъ рожковъ), *пшеницы* отъ жужоля, головни, изгари и доставленіе людямъ хорошаго хлѣба. 2) Рожь и пшеницу, содержащія въ себѣ очень много рожковъ, головни, изгари, нужно или очистить отъ нихъ, или же и совсѣмъ не употреблять въ пищу, а назначить на гонку водки; безъ этой мѣры самое искусное лѣченіе не будетъ имѣть успѣха, Люди, уже заболѣвшіе, не выздоровѣютъ, а здоровые непременно заболѣютъ при употребленіи въ пищу такого хлѣба. *Способъ очищенія ржи и пшеницы* отъ этой порчи *знаетъ всякій сельскій хозяинъ* и помѣщикъ или его повѣренный (управитель). 3) За всѣмъ тѣмъ, при употребленіи въ пищу хорошаго хлѣба, должно совѣтовать *разнообразить пищу*, употребляя не одинъ хлѣбъ, а болѣе растительныя огородныя овощи вареныя, печеныя и жареныя, кромѣ пищи рыбной и мясной. Во время свирѣпствованія этой болѣзни между евреями разнаго возраста въ послѣднихъ числахъ декабря 1824 года въ мѣстечкѣ Вышкахъ, гдѣ она при низменной мѣстности и частыхъ пережѣнахъ сырой атмосферы, колеблемой вѣтрами сѣверо-восточнымъ и западнымъ, обнаруживалась подъ видомъ простудной, ревматической горячки съ бредомъ, подергиваніемъ сухихъ жплъ, расслабленіемъ мышцъ, сжимающихъ задній проходъ, корчею въ икрахъ, параличемъ нижнихъ конечностей, поносомъ, икотю, стягиваніемъ живота, стѣсненіемъ въ груди, головокруженіемъ, судорогами, особенно въ лѣвой ногѣ, которая какъ бы выдергивалась изъ своего мѣста, подергиваніемъ пальцевъ въ рукахъ и ногахъ, даже иногда съ сухимъ омертвѣніемъ (антоновъ огонь) на стопѣ, — уѣздный докторъ Ясюковичъ съ видимою пользою назначалъ употребленіе въ пищу растительныхъ плодовъ, а въ питье — воду съ прибавленіемъ подслащеннаго медомъ уксуса и малаго количества кремортарта и отвара маковыхъ головокъ. Это питье способствовало къ удобному испражненію нечистоты желудка и облегчало судорожныя припадки \*).

Лѣченіе существенное, состоящее въ уничтоженіи лихорадки, возстановленіи правильной раздражительности стѣбающихъ мышцъ рукъ и ногъ и уменьшеніи приливовъ крови къ головѣ, — требуетъ, по важности случая и жестокости страданій, приглашенія врача, который для прекращенія этой болѣзни въ мѣстахъ, гдѣ она свирѣпствуетъ между жителями изъ поселянъ, назначается отъ правительства, и которому слѣдуетъ предоставить полную свободу дѣйствія; за небытностію же врача можно съ отличною пользою ограничиться слѣдующею врачебною помощію. Прежде всего очистить желудокъ и кишки отъ остатковъ прежней пищи, и для этого дать больнымъ *домашнее рвотное* изъ масла съ солью

\*) Докторъ Гаевскій Военно-Медиц. Жур. 1825 г. Часть V, стр. 147.



и теплою водою (№ 12), а потомъ, по достаточномъ очищеніи желудка рвотою, давать домашнее *слабительное* изъ *огуречнаго разсала*, масла и меда (№ 7), либо отваръ *сухой коры крушины* одной (№ 74) и съ *горькою солью* (№ 75), или *рвотное* изъ раствора *рвотнаго камня* (№ 184), которое гораздо лучше, потому что оно производитъ рвоту и потомъ послѣ нея слабитъ нѣсколько низою; за тѣмъ черезъ 4—5 часовъ давать слабительное изъ *горькой соли* съ *нашатюрма* (№ 33). Последнее лѣкарство продолжать до прекращенія желудочныхъ припадковъ, очищенія языка и появленія правильнаго аппетита; больного должно слабить 2—3 раза ежедневно. Головные боли унимать *холодными примочками* головы. Боли, корчи и сведеніе рукъ и ногъ лучше всего облегчаются довольно *плотнымъ увиваніемъ* рукъ и ногъ, также сухимъ *трениемъ* и *притарками* изъ *спяной трухи* (№ 122), теплыми *ваннами съ отрубями*, *спяною трухою* и т. п.

## Безсонница.

**ОПРЕДѢЛЕНІЕ.** Безсонница есть болѣзнь, состоящая въ бодрствованіи въ такое время, которое обыкновенно природою назначено для успокоенія.

**Признаки.** Человѣкъ проводитъ ночи и дни безъ всякаго сна и это можетъ продолжаться недѣли, мѣсяцы и болѣе, и притомъ или онъ не спитъ непрерывно во все это время, или же безсонница на нѣкоторое время проходить, а потомъ опять периодически возвращается. Къ этому нерѣдко присоединяются: разнообразныя фантазмы, живо представляющіеся глазамъ больнаго, равно иллюзіи въ органѣ слуха, ощущеніе зуда, тоска и безпокойство въ цѣломъ тѣлѣ; пульсъ ускоренный и учащенный, нерѣдко перемежающійся; лицо блѣдное и вмѣстѣ надутое, глаза красноватые, моча, большею частію, излишне опѣвченна и густая, запоръ на низѣ.

**Причины внутреннія (предрасполагающія).** Предрасположеніе состоитъ въ особенномъ возвышеніи раздражительности общаго чувствилища. Но и раздраженіе брюшныхъ нервовъ, скопленіе желчи въ животѣ, завалы брюшныхъ внутренностей, брюшное полнокровіе, нервныя горячки и ломота также располагаютъ къ безсонницѣ и бываютъ причиною ея.

**Причины внѣшнія (производящія)** суть: всѣ вліянія, непосредственно раздражающія общее чувствилище, какъ то: всѣ внѣшнія механическія вліянія на голову; быстрое и сильное дѣйствіе теплоты, особенно солнечнаго жара, зноя (безсонница у переселенцевъ въ жаркія страны); тревожное состояніе духа, занятаго какою либо заботою, тайною тоскою, ожиданіемъ чего либо особеннаго, слишкомъ встревоженнаго какимъ либо происшествіемъ — радостнымъ, печальнымъ или страшнымъ.

Сущность *со стороны динамической* состоитъ въ тревожномъ, раздраженномъ состояніи мозга (общаго чувствилища) или нервовъ, и въ непрерывной дѣятельности органовъ зрѣнія, слуха, душевныхъ способ-

ностей, особенно мышления; *со стороны матеріальной*: при высшихъ развитіяхъ безсонницы — въ воспалительномъ состояніи общаго чувствилища, а при низшихъ развитіяхъ — въ приливѣ крови къ головѣ. Впрочемъ во многихъ случаяхъ сущность заключается единственно въ однихъ динамическихъ измѣненіяхъ общаго чувствилища, матеріальныхъ же измѣненій никакихъ не бываетъ, или, по крайней мѣрѣ, они не замѣчаются.

**Распознаваніе** совершенно легко.

**Предсказаніе** въ безсонницѣ, относительно опасности для жизни, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, гдѣ слишкомъ развито будетъ воспалительное состояніе общаго чувствилища, почти всегда *хорошо*; а относительно продолжительности зависитъ отъ свойства причинъ производящихъ, (чѣмъ удалимѣе причины, тѣмъ лучше предсказаніе) и отъ разной сущности болѣзни: при динамической сущности болѣзнь продолжается менѣе, а при матеріальной болѣе, но во всякомъ случаѣ не долѣе 42 дней.

**Исходы**: въ *здоровье* съ убываніемъ признаковъ болѣзни, причемъ въ слѣдствіе продолжительной безсонницы бываетъ слабость силъ, истощеніе тѣла, разстройство умственныхъ способностей. Безсонница динамическая скорѣе переходитъ въ здоровье, нежели матеріальная. Въ *другія болѣзни*, каковы напр. помѣшательство ума, воспаленіе общаго чувствилища (мозга), головная водянка и ударъ. *Смертію* обанчиваются безсонница только при посредствѣ связанныхъ болѣзней и никогда сама собою.

**Лѣченіе** діететическое въ безсонницѣ требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) Одержимый безсонницею (безсонный) долженъ имѣть *пребываніе въ полутемной, прохладной комнатѣ, обмывать голову холодною водою и пить ее*. 2) *Вечеромъ*, при отходѣ ко сну, принять тепловатую ванну, или *вымыть всё тѣло*, особенно *руки, животъ и ноги, теплою водою*, а послѣднія сверхъ того и поддержать отъ 8 до 15 минутъ въ водѣ. 3) *Духъ успокоитъ* утѣшительною *бесѣдою*, либо *чтеніемъ* занимательныхъ, убождающихъ книгъ. 4) *Не ужинать*, предъ отходомъ ко сну *прогуливаться* на открытомъ *воздухѣ*, даже до усталости; *ложиться на матрацъ, покрываться не тепло*. 5) Днемъ *заниматься* механическою *работою въ саду, огородѣ*, въ комнатахъ, *точеніемъ, пиленіемъ, щепаніемъ* лучины, игрою на билліардѣ и т. п. но избѣгать умственныхъ занятій, чтобы не раздражить еще болѣе мозга, а привести его и нервы въ усталость, которая всякаго надѣляетъ сномъ. Известно, что *трудолюбіе* и *длительное тѣлодвиженіе* на чистомъ *воздухѣ* и самое строгое *соблюденіе* діететическихъ *правилъ* вообще вылечиваютъ безсонницу, которою въ старости особенно страдаютъ всѣ тѣ, чей духъ занятъ болѣе тѣла. Оттого самъ Сократъ не пренебрегалъ гимнастическими упражненіями; говорятъ даже, что однажды нѣкто Хармитъ, придя къ нему, нашель, что онъ плясалъ совершенно одинъ, и это средство Сократъ употреблялъ у себя дома всегда въ дождливую погоду для равномернаго упраж-

ненія тѣла и доставленія себѣ аппетита и сна. Для многихъ праздно проживающихъ поселянъ самое вѣрное средство скоро уснуть есть чтеніе въ постель. Лежа на лѣвой сторонѣ, при свѣтѣ лампы читать какое нибудь историческое сочиненіе, и какъ скоро почувствуется наклонность ко сну, погасить лампу и перевернуться на правую сторону — вотъ самое лучшее средство уснуть, а по пробужденіи опять погрузиться въ сонъ. Когда король Агеферъ не могъ уснуть, то бралъ лѣтописи и историческія сочиненія и получалъ желаемый сонъ. Точно также поступаютъ у насъ въ Россіи ученѣйшіе мужи, владѣльцы и ихъ управители, поселившіеся и постоянно живущіе въ деревняхъ. 6) Если все это не помогаетъ, то чашка чаю изъ *маковыхъ цвѣтовъ* или *головокъ* предъ отходомъ ко сну доставляетъ иногда покойный сонъ \*). 7) Но главное стараться узнать и удалить причину, производящую болѣзнь, потому что съ удаленіемъ ея большею частію уничтожается и самая болѣзнь.

Примѣч. Люди, подверженные безсонницѣ, должны стараться избѣгать вышеозначенныхъ причинъ, производящихъ послѣднюю.

Лѣченіе существенное назначается тогда, когда діететическое остается бесполезнымъ. Оно, по важности болѣзненной раздражительности въ мозгѣ или его нервовъ, требуетъ приглашенія врача, а за неимѣніемъ его по близости должно ограничиться слѣдующимъ простымъ пособіемъ:

Въ безсонницѣ, происходящей отъ дѣйствія причинъ душевныхъ (динамическихъ, психическихъ) достаточно помогаютъ: примачиваніе головы *холодною водою* одною, а лучше съ *селитрою* и даже съ *нашатыремъ* (№ 93); также примачиваніе головы простымъ *виномъ* однимъ или съ *камфорою*, распуская оной  $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$  золотника въ стаканѣ вина; положенные подъ подушку *листья бѣлены*, трава *мелиссы*; колпакъ или шапочка изъ двухъ ветошекъ, между которыми насыпаны и простеганы ароматическія травы: *мята*, *ромашка*, *душица*, *божье дерево*, *мелисса* и т. п.; но вѣрнѣе успокоиваетъ и даетъ сонъ-колпакъ съ *хмелемъ*. Достаточные могутъ пить на ночь по рюмкѣ *малиги*, отъ которой многіе нерѣдко хорошо засыпаютъ. Врачи даютъ внутрь съ отлпчною пользою: *гофманскія капли* съ камфорою, распуская ея по одному грану (гусочекъ съ зерно коноплянаго сѣмени) въ 15-ти капляхъ, чрезъ часъ до успокоенія; точно также даютъ услащенный *селитряный спиртъ* съ камфорою, а *лавданъ* (шафранную настойку опія) даютъ отъ 7—14—20 капель съ водою, либо на сахарѣ, черезъ часъ или 1 $\frac{1}{2}$  часа до успокоенія; *бѣлену* въ порошокъ 1—2 грана передъ сномъ, съ водою.

Въ безсонницѣ матеріальной, происшедшей отъ причинъ физическихъ, должно прежде всего отвлечь приливъ крови отъ головы къ ниж-

\*) Лѣтнівыя няньки и кормилицы часто усыпляютъ больныхъ младенцевъ чаемъ маковыхъ цвѣтовъ, и притомъ иногда такъ неосторожно, что бѣдныя малютки засыпаютъ на вѣки.

нимъ частямъ тѣла прикладываніемъ въ икрамъ и подошвамъ ногъ *горчичниковъ* (№№ 88, 89 и 90), *хрѣновника* (№ 91) для произведенія на нихъ красноты, и употребленіемъ внутрь *слабительныхъ домашнихъ* (№№ 7, 72 и 74), и *аптечныхъ* изъ *кремортарта* (№ 9), *ревеня* (№ 31), *глауберовой соли* одной и съ нашатыремъ (№№ 33, 34); (хорошо сверхъ того присоединять и *ревень* (№ 65), или *промысла-тельныхъ* (№ 95), а потомъ уже можно употреблять средства успокоивающія и возбуждающія, показанныя въ безсонницѣ динамической. Чтожь касается до постоянного дѣйствія причинъ внутреннихъ, поддерживающихъ болѣзнь, какъ-то: заваловъ брюшныхъ внутренностей и проч., то въ этомъ случаѣ должно совѣтовать больнымъ прибѣгать къ помощи собственно врачебной.

### Ударъ, (пострѣлъ, апоплексія).

**О П Р Е Д ъ Л Е Н І Е .** Ударъ или пострѣлъ есть болѣзнь, поражающая, какъ бы выстрѣломъ, тяжелымъ ударомъ, молніею изнутри человѣка, который притомъ обыкновенно шатается, падаетъ, лежитъ безъ памяти, безъ чувствъ и движенія, но у котораго продолжается біеніе пульса и дыханіе съ большимъ или меньшимъ хрипѣніемъ.

**П р и з н а к и ,** выражающіе форму удара въ разныхъ его степеняхъ. Ударъ поражаетъ человѣка иногда вдругъ, безъ всякихъ предвозвѣстниковъ, и нерѣдко прекращаетъ жизнь въ нѣсколько минутъ и даже секундъ. Въ большей части случаевъ удару предшествуютъ слѣдующіе признаки: головная тяжесть и боль, головокруженіе, лицо или багровое, или синеватое, глаза выпученные и блестящіе, шумъ въ ушахъ, сонливость, тяжелая и невѣрная походка. Всѣ эти признаки иногда продолжаются нѣсколько недѣль, а иногда нѣсколько часовъ, даже минутъ, и тотчасъ болѣзнь вполне развивается, особенно если дѣйствуетъ причина производящая. Развитие болѣзни происходитъ слѣдующимъ образомъ: вдругъ появляются дурнота и сильное круженіе головы, и больной тотчасъ падаетъ безъ чувствъ; нерѣдко при этомъ обнаруживаются судорожныя движенія; лицо синеватое, надутое, глаза скошены или закинута вверхъ, дыханіе тяжелое, рѣдкое и хрипливое, жиловіеніе крѣпкое и частое, особенно въ шейныхъ сонныхъ артеріяхъ, а иногда и самыя вены ударяютъ на подобіе артерій; въ высшихъ же развитіяхъ болѣзни жиловіеніе дѣлается рѣдкимъ, малоощутительнымъ, лицо бываетъ блѣдноватое и осунувшееся, дыханіе рѣдкое, слабое и чрезвычайно хрипливое. Въ обоихъ случаяхъ лицо нерѣдко искажается и нижняя челюсть отпадаетъ отъ верхней. При судорожныхъ движеніяхъ нерѣдко происходятъ быстрыя и произвольныя испражненія незомъ и мочею, а иногда рвота. Но при легкихъ развитіяхъ болѣзни, не смотря на кажущуюся безчувственность, больной сохраняетъ сознаніе о своемъ положеніи, такъ что все происходящее вокругъ него онъ слы-

нить и ощущаетъ, указываетъ различными движеніями и взглядами на мѣсто страданія и какъ бы умоляетъ о помощи.

Причины внутреннія (предрасполагающія). Предрасположеніе, врожденное къ удару, есть особое устройство тѣла, состоящее въ большой головѣ, толстой короткой шеѣ, объемистомъ короткомъ туловищѣ, полусогбенной, какъ бы горбатой спинѣ (сутуловатость), широкихъ плечахъ и груди; у такихъ людей чрезъ толстые и короткіе сосуды кровь толстою струею легко и скоро приливаетъ къ мозгу, прижимаетъ его и подавляетъ; а случайное или приобрѣтенное — происходитъ отъ какого либо предшествовавшаго потрясенія общаго чувствительнаго. Очень много притомъ располагаетъ къ удару полнобровіе.

Причины внѣшнія, (производящія). 1) *Сильныя душевныя быстрыя возмущенія* страстями, какъ-то: гнѣвомъ, страхомъ, испугомъ, радостію; излишне напряженныя и продолжительныя умственныя занятія; *злоупотребленіе спиртныхъ* и вообще опьянѣвающихъ *веществъ*: такъ, поселяне нерѣдко послѣ перепоя, во время пирушекъ въ праздничныя и другіе урочные разгульные дни, умираютъ скоропостижно отъ удара; *тѣлесное движеніе* съ сильнымъ напряженіемъ мышцъ, особенно груди и живота, (атлеты-бойцы), также съ *ношеніемъ* на головѣ и плечахъ *большихъ тяжестей*, отъ чего подвергаются ударамъ носильщики, крѣпильщики и бурлаки, или лямщики; *знойный жаръ*, при которомъ солнечныя лучи падаютъ на открытую голову (жнецы и косцы); *усиленное напряженіе голоса* (пѣвцы, чтецы на распѣвъ или діагоны, проповѣдники и декламаторы и другія духовныя лица); *угаръ* (стряпухи и повара); спертый воздухъ, — *удушливыя газы* (чистодѣлы, могильщики, рудокопы); *низкое положеніе головы* во время сна; *слишкомъ тугое подвязываніе шеи* галстукомъ или платкомъ для сообщенія лицу полноты и свѣжести; *перетягиваніе шеи веревкою*, полотенцомъ, кушакомъ и другаго рода петлею при повѣшаніи и удавленіи; *ушибы*, поврежденія *головы*; *паденіе* съ высокаго мѣста *головою внизъ* на землю и въ воду при утопленіи; ударъ въ голову подушкою, вязанкою сѣна, снопами соломы; *банный жаръ*, особенно когда люди парятся скоро послѣ обѣда въ жаркой банѣ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ происходитъ *кровавый мозговой ударъ*, т. е. въ сосудахъ мозга скопляется напоръ крови, прижимаетъ его, останавливаетъ его дѣйствіе, прорываетъ мозговые сосуды и изливается въ существо мозга, а болѣе на поверхность его. 2) *Чрезмѣрное удовлетвореніе* похоти, ослабляющее нервы и истощающее тѣло у людей, легко подчиняющихся вліанію страстей, предавшихся распутству, рукоблудію, подверженныхъ судорогамъ, столбняку, падучей болѣзни, вытерпѣвшихъ опасныя нервныя горячки, повесившихъ значительную потерю крови, достигшихъ глубокой старости. Во всѣхъ этихъ случаяхъ происходитъ *сывороточный пострѣлъ*, т. е. въ мозгѣ, вмѣсто крови, скопляется безцвѣтная или кровавистая желтая жидкость — сыворотка, которая, подобно крови, угнетаетъ мозгъ и прекращаетъ его дѣйствія. 3) *Обремененіе желудка*

*пищею*, огорченіе, досада, при повально свирѣпствующихъ желчныхъ горячкахъ, воспаленіяхъ печени. Этотъ пострѣлъ замѣчается часто у поселянъ, работающихъ лѣтомъ и осенью въ полѣ, или скоро послѣ обѣда отправляющихся въ жаркую баню, либо вмѣсто бани залязавшихъ въ истопленную печь и парящихся въ ней. 4) *Продолжительный бѣгъ* (загонъ) у бѣгуновъ, скороходовъ; ношеніе не сильныхъ тяжестей на плечахъ; удушеніе чрезъ зажатіе рта и носа: сдавленіе груди колѣнками, *вдыханіе* разныхъ удушливыхъ *газовъ* въ хлѣбныхъ запертыхъ мѣстахъ (сѣятели, мѣрятели зерноваго хлѣба, крупеники или круподеры); въ отхожихъ ямахъ и колодцахъ (чистильщики колодцевъ и помойныхъ ямъ); въ салотопняхъ (свѣчники или салотопы); угольныхъ копяхъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ и многихъ другихъ, нечисленныхъ при мозговомъ пострѣлѣ, дѣлается *легочный* пострѣлъ, при которомъ въ легкихъ происходитъ то же, что при мозговомъ въ мозгѣ, т. е. легкія заливаются и подавляются непомѣрнымъ напоромъ въ кровя отъ несвободнаго прохода ея чрезъ нихъ.

Р а з д ѣ л е н і е. Изъ этого видно, что ударъ бываетъ: 1) *кровяной мозговой*; 2) *сывороточный*; 3) *желудочный желчный*; и 4) *легочный кровяной*.

П р и з н а к и кровянаго мозговаго удара, какъ чаще случашагося, перечислены выше въ общей формѣ его по степенямъ: но въ особенности замѣчаются въ немъ слѣдующія явленія: красное, вздутое, опухшее лицо; красноватые глаза, расширенныя, неподвижныя зрачки; полный, твердый, иногда прерывистый пульсъ; медленное, глубокое, часто хрипливое дыханіе; сначала умноженная теплота въ тѣлѣ, а потомъ охладѣніе рукъ и ногъ и другіе вышеописанныя припадки; въ это положеніе впадаетъ человекъ полнокровный, бывшій до того, по видимому, совершенно здоровымъ, но жаловавшійся на тяжесть въ тѣлѣ, частыя головныя боли, имѣющій врожденное вышеописанное предрасположеніе, почечуйное кровотеченіе, пропустившій срокъ привычнаго кровопусканія, подверженныи запорамъ на низъ, предавшійся сильному вліянію какой либо страсти, особенно пьянству и другимъ вышечисленнымъ причинамъ перваго разряда.

П р и з н а к и сывороточнаго удара, случашагося рѣже перваго, противоположны признакамъ удара кровянаго: блѣдность лица, слабый, едва замѣтный пульсъ, тихое прерывистое дыханіе, а также если больной былъ подверженъ вліянію вышесказанныхъ ослабляющихъ причинъ втораго разряда, и дожилъ до глубокой старости.

П р и з н а к и желудочнаго желчнаго пострѣла: отрыжка, тошнота, нечистый, желтобѣлый языкъ, морщины на лицѣ, желтизна глазъ, вздутіе живота около желудка; больной въ безпамятствѣ часто кладетъ руку на животъ; кромѣ того бываютъ припадки кровянаго пострѣла.

П р и з н а к и кровянаго пострѣла легкихъ: трудное дыханіе, удушье, появляющееся вдругъ и быстро усиливающееся до задушенія; скорое, короткое тягостное дыханіе, быстрый упадокъ силъ, такъ что больной

падаетъ: смертельная тоска, сильное біеніе сердца, головокруженіе, потемнѣніе въ глазахъ, шумъ и звонъ въ ушахъ; холодный потъ на лбу, шеѣ, груди; охлажденіе рукъ и ногъ; больной сильно страдаетъ, но не теряетъ памяти. Болѣзнь оканчивается скоро: въ 24—48 часовъ — смертію или выздоровленіемъ.

Сущность кровяного мозгового удара со стороны силъ (динамическая) состоитъ въ угнетеніи общаго чувствилища, со стороны матеріальной — въ напорѣ и отложеніи въ общее чувствилище крови, отчего и называется кровянымъ; сущность сывороточнаго удара со стороны силъ состоитъ въ истощеніи и слабости общаго чувствилища, или его нервовъ, а со стороны матеріальной въ скопленіи и отложеніи въ него сыворотки, отчего и называется сывороточнымъ. Сущность желудочнаго желчнаго удара одинакова съ сущностью кровяного мозгового удара со стороны какъ динамической, такъ и матеріальной; разность состоитъ только въ томъ, что къ сущности желудочнаго желчнаго удара присоединяются еще понятія о причинномъ первоначальномъ засореніи желудочнаго канала излишествомъ пищи, нечистотами и желчью. Такимъ же образомъ и сущность легочнаго кровяного удара бываетъ совершенно одинакова съ сущностью кровяного мозгового удара со стороны какъ динамической, такъ и матеріальной, съ тою только разницею, что къ сущности легочнаго кровяного удара присоединяются сверхъ того понятія о причинномъ, первоначальномъ угнетеніи легочныхъ нервовъ и въ напорѣ крови въ сосудахъ и въ самомъ существѣ легкихъ.

Распознаваніе удара, какъ относительно видовъ его, такъ и въ отношеніи другихъ болѣзней, по существеннымъ вышеописаннымъ признакамъ, легко и удобно. Въ послѣднемъ случаѣ пострѣлъ *сходствуетъ* отчасти съ *падучею болѣзнію*, *обморокомъ*, *опьяненіемъ* и *угаромъ*; но отличается отъ нихъ тѣмъ, что въ падучей болѣзни бываютъ судороги, въ обморокѣ — слабый, едва примѣтный пульсъ и такое же дыханіе (что означаетъ слабое движеніе сердца и легкихъ), чего въ ударѣ почти не бываетъ; а въ опьяненіи и угарѣ не уничтожается движеніе, и сверхъ того замѣчается въ первомъ случаѣ винный запахъ изо рта. Впрочемъ во всѣхъ этихъ болѣзняхъ (кромѣ обморока или смертоподобія), также какъ и въ пострѣлѣ, бываетъ приливъ крови къ мозгу, а въ высшей степени онѣ переходятъ въ пострѣлъ. Кромѣ того ударъ сходствуетъ нѣсколько съ *истерическими припадками клякуницъ*; но послѣдніе сопровождаемы бываютъ судорогами, обыкновенно привычными; но главное сходство удара — съ обмираніемъ (смертоподобіемъ), въ которомъ пульсъ пропадаетъ, движеніе груди бываетъ непримѣтно, а лицо покрывается смертною блѣдностію и проч. Дабы не обмануться въ этомъ случаѣ и не счесть еще живаго человѣка мертвымъ, должно обратить вниманіе на темпераментъ больного, его сложеніе, образъ жизни и на болѣзнь, которымъ онъ былъ подверженъ прежде.

Предсказаніе относительно опасности для жизни зависитъ: 1) отъ степени развитія болѣзни, такъ что чѣмъ болѣе развита бо-

лѣзнь, тѣмъ она опаснѣе; *сильная апоплексія смертельна*, а *легкая опасна* тѣмъ, что больной отъ нея хотя не умираетъ, но часто остается парализованнымъ; 2) отъ степени предрасположенія; *чѣмъ болѣе предрасположеніе*, хотя бы оно было врожденное, хотя бы случайное, *тѣмъ предсказаніе хуже* и на оборотъ. Относительно продолжительности болѣзни, предсказаніе зависитъ: 1) отъ степени предрасположенія; и 2) отъ свойства причинъ производящихъ и ихъ удалимости, такъ что при причинахъ динамическихъ (со стороны страстей или душевныхъ потрясеній) предсказаніе лучше, а при матеріальныхъ хуже, и *чѣмъ удобнѣе скорѣе удалить причину болѣзни, тѣмъ предсказаніе лучше*, и на оборотъ. *Кровяной ударъ*, мозговой, легочный и желудочный *опаснѣе сывороточнаго*, а *последній продолжительнѣе первыхъ*. Въ частности, признаки, *предвѣщающіе* апоплексію суть: постоянная и сильная боль въ какой нибудь части головы въ пожилыхъ лѣтахъ (за 40 лѣтъ), оцѣпенѣніе членовъ, частыя круженія головы, сильное уменьшеніе памяти, минутныя забвенія или нѣкотораго рода затмѣнія разсудка, кровотеченіе изъ носа у человѣка за 50 лѣтъ и болѣе, затруднительная рѣчь, скрежетъ зубовъ во снѣ, холодъ конечностей, неправильная ломота въ пальцахъ рукъ и ногъ, сонливость, шумъ въ ушахъ, ночное душеніе или навалъ, что называется въ простонародіи «давить домовой»; невольное теченіе слезъ, хрипливое дыханіе, трясеніе губъ, косоротость. Признаки, *выгодныя* въ апоплексіи: отсутствіе храпѣнія, удобное глотаніе вливаемой больному въ ротъ жидкости, знаки чувствительности отъ укола или щипанія и лихорадка, если по мѣрѣ продолженія ея уменьшаются признаки болѣзни. Если при уколѣ и щипаніи одной части, напр. которой нибудь части руки или ноги, знакъ чувствительности является въ другой, т. е. больной отдернетъ руку или ногу не ту, которая уколота или ущипнута, а другую, — то это значить, что уколота нога или рука, по выздоровленіи больного, останется парализованною. *Признаки, опасныя* въ апоплексіи: ежели съ появленіемъ лихорадки больной становится труднѣе, если пострѣломъ пораженъ больной, изнуренный продолжительною болѣзнію, если онъ не можетъ глотать и совершенно безчувственъ. *Признаки смертельныя*, безнадежныя: когда лицо больного теряетъ свой цвѣтъ, становится багровымъ, синеватымъ, темнѣетъ, тѣло безчувственно, поражено парализованно, руки и ноги быстро холодѣютъ съ появленіемъ въ нихъ судорогъ.

**Исходы.** Ударъ переходитъ иногда быстро въ *здоровіе* въ теченіе нѣсколькихъ дней, даже нѣсколькихъ часовъ, если только скоро будетъ подана помощь, болѣею же частію переходитъ медленно, при постепенномъ уменьшеніи признаковъ, свойственныхъ ему. *Болѣзни*, въ которыя переходитъ ударъ, суть: парализъ, разныя разстройства ума и общее изнуреніе. *Смертью* оканчивается обыкновенно скоропостижно, въ слѣдствіе совершеннаго подавленія либо истощенія дѣятель-



ности мозга и послѣдовательнаго совершеннаго прекращенія всѣхъ органическихъ отправленияхъ.

ЛѢЧЕНІЕ ДІЕТЕТИЧЕСКОЕ состоитъ въ удаленіи вышеназванныхъ причинъ, которыя могутъ произвести ударъ, и по удаленіи которыхъ больной предохраняется отъ него; для этого человѣкъ, имѣющій предрасположеніе къ удару, или предвѣстники послѣдняго, особенно если былъ уже разъ подверженъ ему, долженъ соблюдать въ предохраненіе себя слѣдующія мѣры: 1) *Держать ноги въ теплѣ* и никогда не оставлять ихъ долго мокрыми, *голову въ холодѣ*, а *желудокъ въ голодѣ*; 2) *спать съ возвышенною головою*; (для этого изголовье у постели его должно быть повыше), не кутать голову подъ одѣяло, а *по утрамъ обливать ее холодною водою, купаться въ рѣкѣ, быть умереннымъ въ пищѣ*, какъ можно *рѣже псть говядину*, воздерживаться отъ употребленія вина, водки, кофе, *не ужинать*, а пить на ночь стаканъ холодной воды, или по крайней мѣрѣ никогда не ложиться спать съ полнымъ желудкомъ. 3) *Не терять запоровъ* на низъ и употреблять по временамъ легкое *слабительное* изъ *огуречнаго разсла* (№ 7), *толокна* (№ 72), *горькой соли* (№ 73), *горькой воды* и селитры съ *кремортартаромъ* (№ 181), либо *промывательное* (глистиръ). 4) *Избѣгать* вліянія сильныхъ страстей, *заниматься легкою работою* на открытомъ *воздухѣ*, но не до усталости или разгоряченія тѣла, прогуливаться ежедневно пѣшкомъ, носить на голыхъ ногахъ шерстяные чулки, — но не носить ничего *тѣснаго около шеи*. 5) *Не пропускать срока* для *нривычнаго кровопусканія*, которое лучше дѣлать весною, предъ осенью, и кромѣ того, во всякое другое время, при замѣчаніи тягости въ тѣлѣ, лѣнности, сонливости, головной боли, выпускать изъ вены руки 2—3 чайныя чашки или глубокую тарелку, смотря по тѣлосложенію. 6) *Носить искусственную язву* (источникъ, фонтанель) на рукѣ ниже плеча. 7) Если угрожаетъ ударъ по причинѣ засоренія желудка пищею, желчью, какъ нерѣдко бываетъ у людей мокрыхъ, тучныхъ, любящихъ пресыщаться, то принимаемое во время *рвотное* въ растворѣ (№ 184) можетъ предохранить отъ удара. 8) Въ случаѣ приступа удара, или пораженія пострѣломъ, *одежда на больномъ должна быть просторна*, особенно стараться, чтобы *около шеи* его было свободно и чтобъ *воздухъ* въ покоѣ былъ *свѣжъ* и *часто возобновляемъ*, а на *бедргахъ* его должно сдѣлать перевязки, или собственныя его *повязки стянуты покрывче*, чтобы не допустить кровь изъ ногъ возвращаться въ верхъ. 9) Чтожь касается до атлетовъ, бойцовъ, носильщиковъ, брючниковъ, лямщиковъ или бурлаковъ, пѣвцовъ, проповѣдниковъ, свѣчниковъ или салотоповъ, чистильщиковъ колодцевъ, помойныхъ ямъ, чистодѣловъ и др., то для нихъ сверхъ того начертаны особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію въ концѣ этого лѣчебника.

ЛѢЧЕНІЕ СУЩЕСТВЕННОЕ имѣетъ цѣлью возстановить дѣйствіе мозга, освободить его отъ угнетенія, давленія, прижатія. При

этомъ нужно помнить, что гораздо чаще это угнетеніе или прижатіе происходитъ отъ скопленія и изліянія крови, чѣмъ отъ истощенія и слабости. Сообразно вышеописаннымъ видамъ удара, нужно прежде всего опредѣлить, по вышеописаннымъ признакамъ, какой пострѣлъ предстоитъ лѣчить: кровяной отъ угнетенія полнокроемъ, или сывороточный отъ истощенія или слабости. Во всякомъ случаѣ тутъ нужно немедленное приглашеніе врача (даже и по прошествіи приступа), которому дать полную свободу дѣйствовать по его усмотрѣнію: за немнѣніемъ же его по близости должно ограничиться слѣдующею помощью, болѣе простыми средствами. Въ кровяномъ мозговомъ пострѣлѣ, распорядившись тотчасъ снять съ больного тѣсное одѣяніе, дать головѣ его возвышенное положеніе, и охолодить достаточно его комнату; въ ту же минуту больному непремѣнно назначить *пустить кровь изъ руки* посредствомъ широкаго разрѣза вены для того, чтобы кровь потекла быстро и непрерывною, ровною, толстою струею; кровь должна течь изъ жилы до тѣхъ поръ, пока пульсъ не сдѣлается мягкимъ, слабымъ и ровнымъ (безъ перерывовъ), а дыханіе тихимъ, и пока больной хотя сколько нибудь не придетъ въ себя, вздохнетъ, поворотится, откроетъ на время глаза. Если кровь перестанетъ течь изъ одной руки безъ всякой перемѣны въ положеніи больного, то назначить пустить кровь изъ другой руки, или изъ той же самой, но изъ другой ея вены. Если пульсъ дѣлается слабымъ, малымъ, а въ положеніи больного не происходитъ никакой перемѣны къ лучшему, то, оставивъ кровопусканіе, приставить къ вискамъ, за ушамъ, къ шеѣ 20—40 большихъ, лучшихъ, голодныхъ *тыявицъ*; на затылкѣ поставить нѣсколько *рожковъ*. При остановленіи геморроидальнаго или мѣсячнаго (у женщинъ) кровотеченія, пиявицы припускаются въ первомъ случаѣ вокругъ задняго прохода, а въ послѣднемъ вокругъ отверстія предъмасточника, по краямъ наружныхъ дѣтородныхъ частей. Если послѣ кровопусканія не послѣдовало облегченія, а пульсъ опять сдѣлается полнымъ и крѣпкимъ, то чрезъ 6—8 часовъ врачи назначаютъ повтореніе кровопусканія. Вслѣдъ за кровопусканіемъ употребляютъ *отвлекающія* средства къ кишкамъ и къ кожѣ: *клизмы* чрезъ каждые полчаса, изъ настоя ромашки съ полустаканомъ уксуса, двумя столовыми ложками поваренной соли и полложкою горчицы. Когда больной придетъ въ себя и можетъ глотать, то дать ему *слабительное* изъ *кремортуртара съ нашатыремъ и рвениемъ* (№ 65); снаружи: на голову класть *холодныя примочки* изъ воды со льдомъ, сѣгомъ, селитрою, *обливать* голову, лицо и грудь *холодною водою*; на плечи и шкуру *горчичники* (№№ 88, 89 и 90) и *хрѣмьники* (№ 91), а на затылокъ *нарывной пластырь* (№ 58). Притомъ приставить четырехъ человекъ по два на каждую сторону больного для *растиранія* рукъ и ногъ *щетками*, либо суконками, мочалками, портянками, валиками, онучами и т. п. Но не подносить подъ носъ никакого остраго спирта, уксуса, дыму, жженого пера, которые тутъ вредны и только усиливаютъ приливъ крови къ головѣ; также не должно давать и рвот-

наго. Какъ скоро больной придетъ въ себя и попроситъ пить, то давать ему *пить* вдоволь *сыворотку* съ творога одну, либо съ свѣжю холодною водою. Если при такомъ лѣченіи въ продолженіе сутокъ не послѣдуетъ улучшенія въ положеніи больного, то мало надежды на дальнѣйшій успѣхъ лѣченія: обыкновенно на 3—6 день усиливается приступъ пострѣла и убиваетъ больного; но когда замѣтна въ больномъ переменна къ лучшему, то сказанное лѣченіе, кромѣ кровопусканія, нужно продолжать безъ перемены, и особенно налегать на употребленіе слабительнаго и холодныхъ примочекъ къ головѣ, повторять горчичники или хрѣновники и поддерживать дѣйствіе нарывнаго пластыря. Поправляющійся больной еще долго долженъ быть остороженъ въ употребленіи пищи: не ѣсть мяса, не пить ни вина, ни кофе, сохранять сколько можно душевное и тѣлесное спокойствіе, избѣгать жара, дѣйствія солнечныхъ лучей на голову, тѣсной одежды и проч.

Въ сывороточномъ пострѣлѣ, бывающемъ у нѣжныхъ чувствительныхъ, малокровныхъ, худощавыхъ людей, обыкновенно употребляется возбуждающее и отвлекающее лѣченіе, но рѣдко съ успѣхомъ. Должно совѣтовать съ подобными больными поступать такъ: къ вискамъ за ушами поставить 10—20 *пѣвицъ*, голову обмывать *холодною водою* съ *уксусомъ*, руки и ноги *растирать* щетками, суконками и т. п., прикладывать къ нимъ *горячую золу* въ мѣшкахъ, узкогордые *кувшинны* съ *горячею водою*, плотно заткнутые, чтобы вода изъ нихъ не вылилась, *горчичники* къ икрамъ ногъ и на плечи или пониже ихъ, которые, держа до произведенія ими красноты, слѣдуетъ повторять, перекладывая съ одного покраснѣвшаго мѣста на другое здоровое, а на затылокъ *нарывной пластырь* (№ 58). Ставить чрезъ 1—2 часа вышеозначенные *клизмы* съ уксусомъ, солью и горчицею. Къ носу подносить *нашатырный спиртъ* и *крепкій уксусъ*, которыми также *растирать* виски, ладони и *подъ ложечкою*. Когда больной придетъ въ память и будетъ жаловаться на шумъ и звонъ въ ушахъ, головокруженіе, неясное зрѣніе (пятна предъ глазами), то можно давать ему сначала по чайной, а потомъ по столовой ложкѣ хорошаго *старого вина* (малага), а за неимѣніемъ винограднаго, можно давать и простаго *хлѣбнаго вина*, — *горьлки*, *настойку* въ видѣ жидкаго чая изъ *корня* и *цвѣтговъ бараньей травы* съ *гофманскими* или *мятными каплями* (по 2—5 капель) черезъ часъ, полчаса и даже  $\frac{1}{4}$  часа, смотря по степенн болѣзни.

Въ желудочномъ желчномъ пострѣлѣ полезны прежде всего, какъ и въ кровяномъ мозговомъ, *кровопусканіе*, *холодныя примочки* головы, а потомъ *рвотное* изъ *рвотнаго камня* въ растворѣ (№ 184); послѣ рвоты, которою извергается множество не переваренной пищи, желчи и газовъ, полезны *клизмы* и *слабительное* изъ *кремортартара* съ *нашатыремъ* и *ревенемъ* (№ 65). Если больной поправляется медленно, или остается въ прежнемъ положеніи, то нужно въ такомъ случаѣ пригласить врача, который можетъ счесть нужнымъ повторить крово-

пущаніе, рвотное или другое что, въ чемъ должно убѣждать больного, а врачу не препятствовать и дать полную свободу дѣйствовать.

Въ кровавомъ ударѣ легкихъ прежде всего надобно освободить легкія отъ залившей ихъ крови, а потомъ отъ скопившейся въ нихъ слизи; для этого немедленно назначить больному *пустить кровь*, которая должна течь до тѣхъ поръ, пока не облегчится дыханіе, что послѣдуетъ по наполненіи 1—1½ и даже двухъ глубокихъ тарелокъ. Когда дыханіе сдѣлается свободнѣе, но больного давитъ мокрота и мучитъ кашель, тогда дать ему *рвотное* (какъ и въ желудочномъ пострѣлѣ), которое ускоритъ отхаркиваніе мокроты; послѣ того стараться отвлечь кровь отъ легкихъ, *растирая руки и ноги щетками, суконками*, прикладывая къ ногамъ *горячіе кирпичи*, завернутые въ ветошку или въ салфетку, *кувшины узкогорлые съ горячею водою*, плотно заткнутые, на плечи и грудь *горчичники* (№№ 88, 89 и 90), *мушку* или нарывной пластырь (№ 58) между лопатокъ; напоить больного *чаемъ* изъ *мелиссы* съ *гобманскими каплями* или *виномъ*. При дѣятельномъ и успѣшномъ лѣченіи больной поправляется быстро. Но если на 2—3 день развивается жаръ, усиливается кашель, особенно сухой, появляется трудное дыханіе, колотье, тяжесть въ груди, то нужно принять мѣры какъ противъ воспаленія и обратиться за пособіемъ къ врачу, за неимѣніемъ же его по близости ограничиться тѣми средствами, какія показаны противъ воспаленія легкихъ.

**З а м ѣ ч а н і е.** Но во всѣхъ видахъ удара въ лѣченіи поселянъ непременно нужно соображаться съ частными правилами по ихъ быту и званію, начертанными въ концѣ этого лѣчебника въ особомъ описаніи.

## Параличъ.

**О п р е д ѣ л е н і е.** Параличъ есть потеря чувствованія и движенія, или только одного изъ этихъ отправленій, во всемъ тѣлѣ, или въ нѣкоторыхъ членахъ его, и часто слѣдуетъ за ударомъ.

**П р и з н а к и:** уменьшеніе, или и совершенное уничтоженіе чувствованія и движенія въ какой либо части тѣла появляется въ разной степени: въ легкой, слабой степени, чувствованіе и произвольное движеніе только ослабѣваютъ, во второй они совсѣмъ прекращаются, а въ третьей, высшей степени, онѣмѣніе простирается на кровообращеніе и питаніе; въ онѣмѣлой части тѣла ослабѣваетъ біеніе пульса и уменьшается теплота, самая часть становится холодною, худѣетъ, сохнетъ, мертвѣетъ и превращается въ мумію.

**Р а з д ѣ л е н і е** паралича состоитъ въ его видоизмѣненіяхъ, которыми суть слѣдующія: 1) *Параличъ полный*, когда въ тѣлѣ или въ какой либо части его не проявляется ни чувствованія, ни движенія. 2) Параличъ не полный, когда при органической раздражительности чувствительность проявляется только въ нѣкоторой степени. 3) *Онѣмѣніе*, когда пораженная часть теряетъ чувствительность и нѣсколько

затрудняется въ произвольныхъ движеніяхъ. 4) *Параличъ половинчатый*, когда поражается которая либо половина тѣла, а другая остается здоровою. 5) Параличъ *перекрестный*, когда поражается съ одной стороны, напр. съ правой, верхняя конечность (правая рука) а съ лѣвой — нижняя (лѣвая нога) и на оборотъ. 6) Параличъ *нижнихъ конечностей* (ногъ).

Примѣч. Сверхъ того параличъ можетъ появляться и въ другихъ частяхъ тѣла и причинять болѣзни подъ разными названіями: въ мозгѣ — безуміе, глупость, въ глазахъ — слѣпоту, въ ушахъ — глухоту, въ груди — одышку, въ пищепріемномъ горлѣ — трудное глотаніе, въ дыхательномъ горлѣ — безгласіе, въ языкѣ — нѣмоту, въ желудкѣ — невареніе пищи, въ кишкахъ — запоръ, въ дѣтородныхъ частяхъ — беспдіе (невстаниху) и бесплодіе, въ рукахъ — онѣмѣніе, невлаждніе рукою и т. п.

Причины внутреннія. Предрасположеніе состоитъ въ слабой дѣятельности или общаго чувствиліща, или другой какой либо части нервной системы, а эта слабая дѣятельность зависитъ отъ случайныхъ поврежденій существа (организациі) мозга или нервовъ, или отъ врожденныхъ. Какъ тѣ, такъ и другія одинаковы, какъ и въ ударѣ, и состоятъ либо въ угнетеніи, либо въ пзнеженіи нервовъ. Угнетеніе нервовъ происходитъ, какъ и въ бровяномъ ударѣ, отъ напора крови мѣстнымъ приливомъ ея и общимъ полнокровіемъ, переноса болѣзненной матеріи, отъ разныхъ болѣзней живота и т. п., а истощеніе — отъ судорогъ, надучей болѣзни, чресленного ревматизма, простудной ломоты, броваваго поноса, цынги, венерической болѣзни; изъ этого видно, что *параличъ есть болѣзнь болѣе послѣдовательная*, происходящая въ слѣдствіе другихъ болѣзней, но *рѣдко* бываетъ *первоначальная*, происходящая отъ причинъ внѣшнихъ, непосредственно дѣйствующихъ и производящихъ его.

Причины внѣшнія (производящія). 1) Механическія насилія, какъ то: прижатіе нервовъ перевязкою, опухолью, наростомъ, вывихомъ, переломомъ, ушибомъ; поврежденіе ихъ улоломъ, порѣзомъ и другаго рода пораненіемъ. 2) Пьянство. 3) Холодный и сырой воздухъ; такъ, огородники, при разработкѣ болотистыхъ мѣстъ, подвергаются нерѣдко онѣмѣнію ногъ. 4) Остановленіе привычныхъ испражнений. 5) Скрытіе внутрь нагожныхъ сыпей и особенно неправильное лѣченіе оспы (у дѣтей). 6) Ядовитые металлическіе пары ртути, свинца, мышьяка (у рудокоповъ, золотарей и другихъ мастеровыхъ; обращающихся часто съ этими металлами). 7) Неумѣренное употребленіе чая, кофе (у промышленниковъ). 8) Электричество при пораженіи молніею; рыболовы морской электрической рыбы, особенно въ южномъ океанѣ, часто подвергаются онѣмѣнію рукъ и ногъ отъ прикосновенія къ ней. 9) Недостаточное тѣлодвиженіе, особенно рѣдкое упражненіе какаго либо органа. 10) Душевные потрясенія: испугъ, радость, внезапный страхъ. 11) продолжительныя умственные и тѣлесныя занятія. 12) Распут-

ство, — неумѣренность въ любовныхъ наслажденіяхъ и многія другія причины, общія съ причинами удара во всѣхъ его видахъ.

Сущность со стороны силъ (динамической) состоитъ въ бездѣйствіи какой либо части нервной системы, а со стороны матеріальной въ тѣхъ измѣненіяхъ нервовъ и другихъ частей, на которыя дѣйствуютъ вышеисчисленные причины паралича.

Распознаваніе *просто*.

Предсказаніе. Параличъ излѣчивается вообще очень трудно. Излѣчимость его зависитъ: 1) *отъ продолжительности*: чѣмъ застарѣе параличъ, тѣмъ труднѣе онъ излѣчивается; 2) *отъ мѣста*: параличъ мозговой отъ удара и другой какой либо болѣзни мозга самый опасный; половинный параличъ, если голова не поражена, не такъ опасенъ; съ нимъ доживаютъ до глубокой старости; параличныя: слѣпота, глухота, трудное глотаніе, задержаніе мочи, излѣчиваются очень трудно; 3) *отъ причины*: параличъ отъ переноса болѣзненной матеріи и другихъ виѣшнихъ причинъ, особенно душевныхъ потрясеній, дѣйствующихъ прямо на нервы, излѣчивается легче, чѣмъ отъ нерва, угнетеннаго прижатіемъ опухоли, нароста, а еще болѣе нерва поврежденнаго; 4) *отъ степени*: параличъ одного чувствованія или движенія легче излѣчивается, чѣмъ потеря того и другаго вмѣстѣ; появленіе въ параличномъ мѣстѣ боли, судорогъ благоприятно; параличъ съ увяданіемъ, сухостію онѣмѣлой части — неизлѣчимъ; 5) *отъ возраста больного*: параличъ удобнѣе излѣчивается въ молодыхъ и среднихъ лѣтахъ, чѣмъ въ преклонныхъ; 6) *отъ повтореній*: въ параличѣ опаснѣе возвратъ, нежели первый приступъ, и рѣдко кто выдерживаетъ третій ударъ.

Исходы. Въ *здоровьѣ* параличъ переходитъ при постепенномъ возвратѣ въ прежнее здоровое состояніе чувствительности, движенія и другихъ отравленій, свойственныхъ пораженной части. *Смертію* оканчивается или быстро, подобно удару, производя остановку въ важнѣйшихъ для жизни отравленіяхъ, или, напротивъ, постепенно и медленно, разстроивая отравленія одно за другимъ и такимъ образомъ истощая питаніе и силы больного.

Лѣченіе діететическое, состоящее въ удаленіи причинъ паралича, какъ болѣзни, большею частію, послѣдовательною, происходящей въ слѣдствіе другихъ болѣзней, требуютъ *соблюденія* тѣхъ *правилъ*, какія изложены *въ предшествовавшихъ* параличу *болѣзняхъ*. Такъ напр., если параличъ произошелъ въ слѣдствіе удара, то должно совѣтовать соблюденіе правилъ, означенныхъ въ діететическомъ лѣченіи удара. Если параличъ произошелъ въ слѣдствіе застарѣлаго ревматизма (ломоты), то руководствоваться правилами діететическаго лѣченія ревматизма и проч.; чтожь касается до паралича, происходящаго непосредственно отъ вреднаго дѣйствія на тѣло какой либо изъ вышеисчисленныхъ виѣшнихъ, производящихъ эту болѣзнь, причинъ, то должно совѣтовать по возможности удаляться, избѣгать, или *быть осторожнымъ противъ вреднаго вліянія* ихъ. Для огородниковъ, рыболововъ,

золотарей и другихъ мастеровыхъ, обращающихся съ ртутью, свинцомъ и мышьякомъ, изложены *особыя правила въ росписаниі поселянъ* по ихъ быту и званію.

Лѣченіе существенное паралича, очень труднаго къ излѣченію, должно предоставить врачу, который прежде всего старается опредѣлить, отъ чего зависптъ параличъ: отъ угнетенія, или отъ ослабленія нервовъ; потому что въ двухъ этихъ видахъ паралича лѣченіе бываетъ противное, — полезное въ одномъ и вредное въ другомъ; за неизмѣнимъ же врача по близости должно ограничиться слѣдующимъ пособіемъ, состоящимъ изъ болѣе простыхъ, или менѣе сложныхъ средствъ, соотвѣтственно разнымъ видамъ и причинамъ этой болѣзни.

Лѣченіе паралича всеобщаго, какъ полнаго (безъ чувствованія и движенія въ тѣлѣ), такъ и неполнаго (съ нѣкоторою степенью чувствованія и движенія), у молодыхъ, крѣпкихъ и сильныхъ людей бываетъ одинаково съ лѣченіемъ кровянаго удара, отъ котораго невозможно отличить его; потому что этотъ видъ паралича есть настоящій ударъ, происходящій отъ угнетенія нервовъ кровію. Въ этомъ случаѣ надлежитъ скорѣе совѣтовать больному *кровопусканіе изъ вены руки и пиявочное*, какъ сказано въ кровяномъ ударѣ, потому что кровопусканіе необходимо и бываетъ спасительно въ недавнемъ параличѣ этого рода; ежели же оно будетъ употребленно противъ паралича застарѣлаго, то будетъ бесполезно. Потомъ употреблять и всѣ другія средства, какія показаны въ существенномъ лѣченіи кровянаго (мозговаго, легочнаго) удара.

Лѣченіе всеобщаго (полнаго и неполнаго) паралича у стариковъ, или у людей слабыхъ и нѣжныхъ, происходящаго отъ слабости нервовъ, во всемъ противоположно предшествовавшему лѣченію и сходствуетъ съ лѣченіемъ нервнаго сывороточнаго удара. *Пища* больного въ этомъ случаѣ должна быть *теплая, разжижающая и возбуждающая*, какъ напр. ароматическія и пряныя произрастенія, а именно: рѣдьба, чеснокъ, лукъ, горчица и т. п.; въ *питье* можетъ онъ употреблять *хорошее вино и водку съ водою*. *Сухія тренія* пораженныхъ частей тѣла мягкою щеткою, губкою, варишкою, или нагрѣтою рукою бываютъ полезны. Равнымъ образомъ полезно бываетъ прикладываніе *нарывнаго пластыря* (№ 58), который въ параличѣ ногъ прикладывается къ нижней части поясицы, а въ параличѣ рукъ къ нижней части шеи и къ верхней части спины. Если этого средства употребить почему либо невозможно, то надлежитъ натирать пораженныя параличемъ части тѣла *летучею мазью* изъ деревяннаго масла съ *нашатырнымъ спиртомъ* (№ 76) и *камфорною* (№ 77) съ *спиртомъ оленьяго рога* (№ 123), либо *камфорнымъ масломъ* (№ 72). Многіе одобряютъ въ этомъ случаѣ натираніе больныхъ частей *крапивою*. Золотарямъ и другимъ мастеровымъ, обрабатывающимъ металлы, особенно полезны *сѣрные минеральныя воды и грязи*, гдѣ онѣ есть, употребляемыя въ ваннахъ. Но Бюргавъ излѣчивалъ этого рода параличи посред-

ствомъ пара *вишнего спирта*, надъ которымъ онъ сажалъ больныхъ своихъ нагишемъ \*).

Лѣченіе паралича ревматическаго, происшедшаго въ слѣдствіе застарѣлой простудной ломоты, состоящаго въ бездѣйствіи мышцъ, совершенно одинаково съ лѣченіемъ застарѣлаго ревматизма, и потому должно совѣтовать употреблять тѣ средства, какія, соотвѣтственно пораженнымъ параличемъ частямъ, исчислены въ застарѣломъ ревматизмѣ мышцъ. Сверхъ того *ношеніе* на голомъ тѣлѣ *платья, ночеваніе въ муравейномъ гнѣздѣ* и напитааннаго муравьинымъ запахомъ, нерѣдко оказываетъ большую пользу. Въ южной части Россіи, изобилующей произрастеніемъ винограда, *ванны съ виноградными выжимками* весьма полезны. Не менѣе того полезны бываютъ ванны *съ бардою* на винокурныхъ заводахъ, и *съ пивными дрожжами* на пивоварняхъ. Эти три послѣднія средства помогаютъ и въ параличѣ, происходящемъ отъ цынготной (скорбутной) болѣзни.

Лѣченіе паралича половинчатаго и перекрестнаго, происходящаго всегда почти отъ кровянаго мозговаго удара, одинаково съ лѣченіемъ послѣдняго. Бываютъ однако случаи, что половинчатый параличъ поражаетъ ту половину тѣла, которая была непосредственно подвержена простудѣ отъ сырости и сильнаго упора вѣтра, особенно въ ненастное время. Въ такомъ случаѣ *теплое содержаніе* больнаго, *растираніе* ослабѣвшихъ членовъ *бодяго*, вареною въ деревянномъ маслѣ (золотникъ тертой бодяги на  $\frac{1}{2}$  рюмки масла), *камфорною*, распушенною въ винѣ, водкѣ, или деревянномъ маслѣ (№ 72), *березовою мазью* (№ 166) простою и *детьярною* (№ 167) оказываютъ хорошую пользу. Втираніе этихъ средствъ особенно полезно тотчасъ по выходѣ изъ бани, въ которой, напередъ натерши всю пораженную половину тѣла *тертою ртутью съ солью*, и попотѣвъ нѣсколько въ пару на полкѣ, напарить ее намыленнымъ березовымъ вѣнникомъ, обмыть мыльною водою на чисто, переменить бѣлье, надѣть тулупъ и выдти; по выходѣ натереть вышеозначенными средствами страждущую половину тѣла и покрыть суконною, либо шубнымъ лоскутомъ, а всего лучше *заячьєю шкурою*, шерстью обращенною къ тѣлу. Такимъ образомъ продолжать втираніе мазей по нѣскольку разъ въ день; въ баню ходить раза два въ недѣлю

\*) У меня въ практикѣ былъ одинъ случай, въ которомъ это средство оказалось превосходнымъ. Поселянинъ, страдавшій долгое время ломотою въ ногахъ и пользовавшійся неоднократно у простыхъ лѣкарокъ парами киповари, подвергся наконецъ, по причинѣ злоупотребленія этого лѣченія, параличу въ рукахъ и ногахъ. Но когда, по назначенію моему, каждый день онъ садился ногой посреди ванны на маленькой скамейкѣ, по концамъ которой въ канфоркѣ горѣлъ спиртъ, причѣмъ ванна покрывалась одѣяломъ, то большой день ото дня поправлялся болѣе и болѣе, и послѣ принятыхъ такимъ образомъ 14 сухихъ спиртныхъ ваннъ въ продолженіе двухъ недѣль совершенно выздоровѣлъ. Кромѣ того каждый разъ, по выходѣ изъ ванны, отъ выступившаго пота онъ обмывался теплою водою съ простымъ домашнимъ мыломъ.



до выздоровленія. Внутри при этомъ полезно употреблять раза два въ день по рюмкѣ вина съ *калфорю*, золотникъ которой довольно распу- стить въ штофѣ горѣлки. Въ недавнемъ половинчатомъ параличѣ, про- исшедшемъ отъ простуды, большею частію бываетъ достаточно этихъ средствъ. Простолюдины прибѣгаютъ въ этомъ случаѣ нерѣдко къ *на- рамъ кала лошадиного, коровьяго* и др., но эти пары не болѣе быва- ютъ дѣйствительны, какъ пары изъ *ароматическихъ травъ* и даже простой *стнной трухи* и припарки изъ нея.

Въ параличѣ языка больной долженъ чаще *полоскать ротъ* свой *водкою съ горчицею*, или держать во рту кусокъ сахара, налитаннаго *ландышинымъ спиртомъ*. Также полезно для больного чаще принимать по ложкѣ *горчичнаго стьмени*; не худо для него *жевать корицу* и *им- бирь*, или другое какое либо вещество горячительнаго и раздражающаго свойства. Корень *дикаго бульдырьяна* также есть превосходное средство въ этомъ случаѣ. Его даютъ настоенный вмѣстѣ съ *шалфеемъ* въ винѣ, или ползолотника порошка этого корня въ рюмкѣ вина, три или че- тыре раза въ день.

Въ параличѣ нижней части заднепроходной кишки и пузыря, над- лежить снаружи прикладывать *припарки* или *прилочки*, сдѣланныя съ *листомъ мелиссы, душицы, льснаго тмина, чабра, расмарина* и т. п.

Лѣченіе онѣмѣнія. Когда терпнуть и нѣмѣютъ однѣ только ноги, то надлежитъ *тереть ихъ мягкой щеткою*, или *грубою хол- стиною*, и въ тоже время натирать *летучею мазью*, состоящею изъ деревяннаго масла съ нашатырнымъ спиртомъ (№ 76), спину больна- го, начиная съ половины до самаго крестца, или лядвей. Если эти средства остаются безуспѣшными, то можно приложить *нарывной пла- стырь* (№ 58) къ нижней части спины и къ верхней части поясницы. Если же терпнуть и нѣмѣютъ руки, то употребляютъ тѣже средства, но должно тереть у больного позвонки шейные и спинные, т. е. отъ шейной ямки до середины спинной кости ихъ хребта, и въ случаѣ, если понадобится употребить нарывной пластырь, то его должно прило- жить между плечъ. Внутри употребляется въ этомъ случаѣ *нашатыр- ный спиртъ известковый* (съ известью), получаемый изъ аптеки. Его даютъ по 12-ти капель въ двухъ ложкахъ воды, ежедневно два раза, поутру и ввечеру, и продолжаютъ давать эти приемы не болѣе недѣли.

Параличъ нижнихъ конечностей (ногъ) имѣетъ, большею частію, свои особые признаки: больной замѣчаетъ сначала соимянную грызу- щую боль и слабость въ одной или обѣихъ рукахъ, переходящія потомъ въ ноги; иногда боль, давленіе, ползаніе мурашекъ чувствуется и въ спинѣ; въ походкѣ больного замѣчается особенная поступь; онъ пере- валивается съ боку на бокъ, шатается, оступается, по временамъ даже какъ бы волочить ноги по землѣ, на походкѣ скоро устаетъ, и легко падаетъ. Въ этомъ положеніи болѣзнь можетъ оставаться нѣсколько лѣтъ, и потомъ переходитъ въ совершенное невладѣніе ногами, набо-

нець параличъ сообщается кишкамъ (упорный запоръ на низъ), моче-  
вому пузырю (задержаніе или запоръ мочи), легкимъ (удушье), гла-  
замъ (слѣпота, темная вода), ушамъ (глухота), языку (нѣмота) и  
мозгу (нервный пострѣлъ). Этотъ параличъ почти всегда зависитъ отъ  
страданія спиннаго мозга, что можно узнать, проводя вдоль спины  
губку, намоченную въ горячей водѣ, причемъ въ какомъ либо мѣстѣ  
спины больной замѣчаетъ что то особенно непріятное, или просто боль.  
Это страданіе спиннаго мозга всего чаще воспалительное, и первоначально  
происходить отъ повихнутія шеи у дѣтей, при поднятіи ихъ за голову,  
или ушиба при паденіи спиною на что либо выступающее (на уголь  
камня, край таза, порогъ и проч.), отъ искривленія спины у золотуш-  
ныхъ, одержимыхъ англійскою болѣзнію дѣтей; особенно часто этотъ  
параличъ бываетъ слѣдствіемъ излишней растраты, въ молодыхъ лѣ-  
тахъ, мужскаго сѣмени, также отъ переноса на позвонки и спинной  
мозгъ ревматизма, ломоты, любострастной болѣзни. При лѣченіи прежде  
всего надобно обращать вниманіе на спину и тѣ мѣста, гдѣ отъ прове-  
денія по спинѣ губки съ горячею водою, будетъ замѣчена боль, или  
просто чувствительность; нужно неоднократно приставить *пѣльвицы* и  
прикладывать *холодныя примочки* до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ  
боль; послѣ того въ самомъ мѣстѣ боли нужно приложить *нарыв-  
ной пластырь* (№ 58) и держать его для нагноенія, какъ можно  
долѣе. При этомъ, внутрь даютъ съ успѣхомъ скипидарное масло по  
20—30 капель; взрослымъ четыре раза въ день, въ теченіе 3—5 не-  
дѣль, а врачи на мѣста, обнаженные отъ кожицы мушкою, кладутъ  
*мазь* съ вытяжкою (экстрактъ) *чилибухи, красавицы, морфия*.  
Всего лучше въ этой болѣзни напередъ посоветоваться съ врачомъ,  
особенно тамъ, гдѣ есть *минеральныя воды*, какъ то: *сѣроводородныя*  
и др., (на Кавказѣ, въ Сергіевскѣ, Бугурусланскаго уѣзда), *железисто-  
сѣрнокислыя* и *горько-солянныя*, (въ Солнгаличѣ Костромской губерніи),  
*сакскія*, (въ Евпаторіи) и *астраханскія грязи*, которыя въ параличѣ  
ревматическо-ломотномъ, въ онѣмѣніяхъ и параличахъ рукъ и ногъ,  
въ слабости нервовъ и вялости мышцъ, послѣ продолжительныхъ бо-  
лѣзней, оказываются очень полезными. Но д-ръ Н. Шрейберъ (въ Брестъ-  
Литовскѣ употребляетъ съ отличнымъ успѣхомъ *живыхъ муравьевъ*),  
въ лѣченіи онѣмѣнія, невладѣнія членовъ и паралича нижнихъ конеч-  
ностей, даже тогда, когда всѣ другія извѣстныя средства, отъ этихъ  
болѣзней, не приносили никакой пользы. Прикладываніе живыхъ му-  
равьевъ къ онѣмѣлымъ и параличнымъ частямъ тѣла дѣлается слѣ-  
дующимъ образомъ: взять живыхъ муравьевъ съ гнѣздомъ, всыпать  
ихъ въ мѣшки или наволочки величинны и длины, соответствующей  
той части, къ которой желателно ихъ приложить. Если къ верхнимъ  
или наружнымъ членамъ, то мѣшки должны быть такъ длинны, чтобы  
руки или ноги могли всѣ вмѣститься, каждая порознь, и надѣвши мѣшки  
на нихъ, завязать такъ плотно, чтобы муравьи не могли выползти.  
По приложеніи муравьевъ, больной чрезъ нѣсколько часовъ ощущаетъ

ползаніе этих насекомыхъ, которыя, ползая по тѣлу и кусая его, возбуждаютъ въ немъ, какъ бы отъ электрической искры, чувство вздрагиванія, сострясенія и пріятной теплоты, распространяющееся по всему тѣлу. Кроме того, муравьи эфирно-летучимъ своимъ началомъ, производятъ столь сильное возбужденіе въ тѣлѣ, что больной разгорячается и такъ много потѣетъ, какъ отъ паровой бани, когда бы онъ въ сильномъ жару парился въ банномъ. Страждущимъ онѣмѣніемъ надобно держать муравьевъ два или три дня, потомъ день отдохнуть, послѣ опять замѣнить ихъ свѣжими и продолжать употребленіе до тѣхъ поръ, пока цѣль достигнута будетъ \*). Былъ случай, что совершенный параличъ нижней части тѣла (безъ движенія и чувствительности), не уступавшій продолжавшемуся пять недѣль лѣченію, заключавшемуся въ растираніяхъ камфорнымъ спиртомъ, мушгахъ и употребленіи проносныхъ, и происшедшій отъ обыкновенія лежать на травѣ, сѣнѣ, голой землѣ, проводить ночи подъ открытымъ небомъ и подвергаться всякимъ непогодамъ, былъ излѣченъ *холодными ваннами и съченіемъ крапивою*. Всякій вечеръ, больной садился до половины тѣла въ холодную воду; потомъ *растирали* ему парализованныя части *фланелью* съ полчаса; наконецъ сѣли ихъ крапивою. Черезъ пятнадцать дней лѣченія, улучшеніе было значительное; тогда прекратили сѣченіе крапивою, продолжали только холодныя ванны и *сухія тренія*. Черезъ три мѣсяца больной совсѣмъ вылѣчился \*\*).

Лѣченіе паралича цынготнаго (скорбутическаго) и любострастнаго (сифилитическаго, венерическаго) одинаково съ лѣченіемъ этихъ первоначальныхъ болѣзней.

## Обморокъ, обмираніе (смертоподобіе).

**Опредѣленіе.** Подъ именемъ этой болѣзни разумѣется большее, или меньшее отсутствіе самосвѣдѣнія (памяти), чувствованія и движенія, сопровождающееся слабымъ или совсѣмъ остановившимся дыханіемъ и біеніемъ сердца и артерій.

**Раздѣленіе.** Смотря по тому, въ какой степени бываетъ обморокъ, онъ имѣетъ три видоизмѣненія: 1) *слабость*, дурнота (первая, легкая степень обморока); 2) *обморокъ*, собственно такъ называемый (вторая, сильная его степень — *sincope*) и 3) *обмираніе* или *смертоподобіе* (последняя сильнѣйшая его степень — *asphyxia*).

**Признаки:** внезапная блѣдность лица, головокруженіе, шумъ и звонъ въ ушахъ, помраченіе въ глазахъ, причемъ не замѣчается большой перемѣны въ пульсѣ; больной помнитъ и сохраняетъ чувство, но не въ состояніи говорить, — таковы признаки первой степени этой болѣзни или слабости. Если же при этомъ пульсъ значительно ослабѣ-

\*) Др. Здр. 1838 г. № 2, стр. 9 и 10.

\*\*) Др. Здр. 1848 г. № 31, стр. 243 и 244.

васть, замедляется или и совершенно останавливается, дыханіе едва замѣтно, а дѣйствія чувствъ нервовъ и мозга еще не прекращаются, больной слышитъ происходящее около него, чувствуетъ боли отъ укола его иглою, между тѣмъ не имѣетъ силы произвести движеніе, открыть глаза, заговорить, пошевелить рукою; то такое болѣзненное состояніе больного означаетъ, что онъ находится во второй степени обморока, или собственно въ обморокѣ. Но когда при этомъ пульсъ совершенно останавливается, дыханіе становится незамѣтнымъ, тѣло охлаждѣваетъ, лицо покрывается синевою блѣдностію, — больной, лишаясь чувствъ и памяти, ничего не чувствуетъ и не помнитъ, что съ нимъ происходило; то такое его болѣзненное состояніе означаетъ обморокъ въ сильнѣйшей степени, или собственно такъ называемое обмираніе (смертоподобіе, мнимая смерть (asphyxia)).

Причины внутреннія (предрасполагающія): 1) Избытокъ крови или полнокрое, въ слѣдствіе котораго расположены бываютъ къ этой болѣзни люди крѣпкаго сложенія, здоровые, преимущественно же юные, молодые; 2) недостатокъ крови или малокрое, по которому расположены къ этой болѣзни люди, напротивъ, слабые, изнуренные неутомимою дѣятельностію или предшествовавшими тяжкими болѣзнями, какъ-то: нервною горячкою, холерою, судорогами, продолжительнымъ кровотеченіемъ, поносомъ и т. п. 3) болѣзни: истерика, сильное кровотеченіе, чахотка, боль въ кишкахъ, поносъ, особенно натужный, глисты, завалы и т. п.

Причины внѣшнія (производящія): сильное неожиданное душевное потрясеніе радостію, испугомъ; обремененіе желудка пищею, особенно дурною, или объяденіе; внѣшній жаръ солнечный и печной въ избахъ (трубочисты при чищеніи трубъ горячихъ печей), спершійся душный воздухъ (въ церкви при многолюдномъ стеченіи народа въ большіе праздники); послѣ-родовое время (родильницы): испаренія сильно пахучихъ растений, особенно одуряющихъ (наркотическихъ), напр. бѣлены, дурмана, опія, конопли, мака; употребленіе спльныхъ рвотныхъ и слабительныхъ, щелочные пары горячаго котла (прачки); угольные пары (свѣчники или салотопы); вредныя испаренія отъ сложенного въ кучу зерноваго хлѣба и хранящагося въ запертомъ не провѣтриваемомъ мѣстѣ (сѣятели, мѣрители, молотильщики, вѣятели зерноваго хлѣба, крупеники или круподеры); тонкій паръ, отдѣляющійся изъ чановъ, гдѣ квасится виноградъ, въ пивоварняхъ, погребахъ, гдѣ много винограднаго вина (виноградари, пивовары и переливщики острыхъ хмѣльныхъ напитковъ); гнилыя испаренія (газы), спертые въ мѣстахъ, возобновляемыхъ воздухомъ (чистодѣлы, могильщики, чистильщики колодезевъ и помойныхъ ямъ); угаръ отъ неперегорѣвшихъ угольевъ, рано сгуганныхъ печей и т. п.; паденіе съ высоты, удары, нанесенные въ голову, грудь и проч.

Сущность. Первая степень обморока (слабость, дурнота) состоитъ въ слабости нервовъ; вторая его степень, (обморокъ) состоитъ

въ значительномъ замедленіи или и совершенномъ остановленіи кровообращенія, а слѣдовательно въ прекращеніи дѣйствій сердца и легкихъ, какъ главныхъ органовъ обращенія крови при продолжающемся дѣйствіи со стороны чувствъ, нервовъ и мозга. Последняя же степень обморока (обмираніе, смертоподобіе, мнимая смерть) состоитъ въ прекращеніи дѣйствія какъ сердца и легкихъ, такъ нервовъ и мозга, которые сохраняютъ еще всѣ условія внутренней ихъ жизни и бываютъ способны дѣйствовать и проявляться въ дѣйствіи своемъ опять тою же виѣшнею видимостію жизни, при возстановленіи ея, какъ искра подъ пепломъ при ея раздуваніи.

**Р а с п о з н а в а н і е** обморока во всѣхъ его степеняхъ, по соображенію признаковъ съ причинами, предрасполагающими и производящими, бываетъ просто и легко. Обморокъ, и въ особенности обмираніе, сходствуетъ съ припадками удара и падучею болѣзнію, но въ послѣднихъ больные совершенно ничего не чувствуютъ, какъ въ обмираніи, отъ котораго онѣ отличаются тѣмъ, что происходятъ болѣе отъ внутреннихъ причинъ, а обмираніе всегда почти происходитъ отъ дѣйствія причинъ виѣшнихъ; падучая же болѣзнь сверхъ того отличается сопровождающею ее судорогою, особенно сведеніемъ большихъ пальцевъ къ ладонямъ рукъ и пѣнистою мокротою у рта, равно и періодичностью приступа, такъ что по соображеніи признаковъ и причинъ обморока, самое обмираніе легко отличить отъ этихъ болѣзней.

**П р е д с а з а н і е** въ обморокѣ зависитъ отъ его степени и причины: обыкновенный обморокъ, происшедшій отъ духоты, спертаго воздуха, растительныхъ испареній, испуга, радости, усталости, голода, въ истерикѣ, поносѣ легко и скоро проходитъ самъ по себѣ, или по удаленіи его причины; опаснѣе обморокъ отъ изнуренія тѣла, болѣзней, потери крови; также опасенъ обморокъ, которымъ начинается лихорадка. *Продолжительный обморокъ опасенъ* тѣмъ, что остающаяся долго безъ движенія кровь створаживается и своими свертками запруждаетъ кровяные сосуды, какъ пробкою. *Обмираніе всегда опасно* и бываетъ предверіемъ смерти, если не будутъ приняты нужныя мѣры къ возбужденію видимыхъ дѣйствій въ отправленіяхъ органической жизни.

**И с х о д ы:** 1) *Въ здоровьѣ,* 2) *въ другія болѣзни* и 3) *въ смерть* (чаще всего обмираніе).

**Л ѣ ч е н і е** діететическое, состоящее въ удаленіи причинъ болѣзни, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) *Людямъ* молодымъ, сильнымъ, крѣпкимъ, *полнокровнымъ*, подверженнымъ обмороку, для предупрежденія его должно совѣтовать *употребленіе пищи легкой*, удобоваримой, состоящей единственно изъ *плодовъ и овощей*, а *питье* изъ *свѣжей ключевой воды*; притомъ имѣть *достаточное тѣлодвиженіе*, но не до усталости, достаточный сонъ, но не продолжительный. 2) *Людямъ слабымъ, малокровнымъ*, подверженнымъ обмороку, для предупрежденія его совѣтовать употреблять часто, но въ маломъ количествѣ, *пищу легкую, удобоваримую, питательную*, какъ-

то: мясной отваръ или бульонъ, супъ, похлебки, свѣжія яйца, вареныя въ смятку, студень, поджаренные ломтики хлѣба съ масломъ, сухари, намоченные въ теплое винъ, съ сахаромъ и корицею. 3) Въ обморокъ, происходящемъ отъ кровопусканія, или кровотечения, совѣтовать *больнаго* тотчасъ *положить на постель*. Людямъ же, подверженнымъ обмороку, должно совѣтовать, для предупрежденія его, всегда *пускать кровь*, въ случаѣ надобности, въ *лежащемъ положеніи*. Еслижь обморокъ продолжится при всемъ этомъ болѣе обыкновеннаго, то надлежитъ *дать больному понюхать* немного *уксуса* и даже *выпить его* съ водою. 4) *Пахучія*, особенно одуряющія *вещества*, всѣ *удалить* отъ больнаго или *перемѣстить* его въ *другой чистый, свѣжій*, болѣе или менѣе *открытый воздухъ*. 5) *Женщинамъ* нѣжнымъ и страдающимъ маточными припадками, *подверженнымъ обморокамъ послѣ родовъ*, въ предупрежденіе ихъ *совѣтовать* укрѣплять *себя* и *освѣжать свѣжимъ воздухомъ*, *впускаемымъ въ покои* родильницъ. 6) Чтожь касается до трубочистовъ, прачекъ, сѣятелей, мѣятелей, вѣятелей, молотильщиковъ зерноваго хлѣба, крупениковъ, виноградарей, пивоваровъ, переливщиковъ острыхъ хмѣльныхъ напитковъ, чистодѣловъ, могильщиковъ, чистильщиковъ колодцевъ и помойныхъ ямъ, то для нихъ изложены діететическія правила особо, въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лѣченіе существенное, состоящее въ возбужденіи движенія остановившагося кровообращенія, требуетъ возбудить дѣйствіе сердца, кровеносныхъ сосудовъ и легкихъ. Средства для этого, смотря по различію причинъ обморока, различны; обыкновеннѣйшія изъ нихъ и лучшія слѣдующія: *отрыскиваніе* лица, груди *холодною водою*, *прохладный, свѣжій, чистый воздухъ*, *прохладный вѣтерокъ*, *развязаніе, растегиваніе, распоясываніе тѣснаго платья, положеніе больнаго съ возвышенною головою, треніе висковъ, шеи, груди, подъ ложечкою, спины, рукъ и ногъ суконками, фланелью, шерстяными варежками, чулками съ уксусомъ*, смѣшаннымъ пополамъ съ водою, *муравейнымъ, березовымъ, розмариннымъ спиртомъ*; а если больной можетъ глотать, то вливаютъ ему въ ротъ двѣ или три ложки *уксуса*, смѣшавъ его съ количествомъ воды въ четверо или въ пятеро большимъ, потому что крѣпкія жидкости бываютъ вредны въ обморокъ при полнокровіи. При обморокъ у людей изнуренныхъ, слабыхъ, истерическихъ, *поднесеніе къ носу* разрыванной, красной, *свѣжій луквицы, жженого пера*, крѣпкаго *ароматнаго уксуса, летучаго* (амміачнаго нюхательнаго) *спирта*, крѣпкихъ и *душистыхъ травъ*, какъ-то: руты, шафѳея, мяты, розмарина и проч., съ положеніемъ больнаго на постель, одѣваніемъ и треніемъ ему ногъ, лядвей, рукъ и всего тѣла теплою суконкою и др. под., оказываетъ большую пользу. Если этого недостаточно, то надлежитъ малокровному больному пустить въ ротъ нѣсколько капель *водки* или *рома*, а если онъ можетъ глотать, то дать выпить немного теплаго *вина* съ *сахаромъ* и *корицею* (эта смѣсь составляетъ

превосходное укрѣпляющее питье), либо 10—15 гофманскихъ капель съ сахаромъ или холодною водою. Подъ ложечку (желудочная впадина) приложить суконку или фланель, намоченную въ теплое винѣ или водкѣ, или *горчичникъ*, не худо класть сверхъ всего этого подъ подошвы *грѣтые куртки*, или бутылки, наполненные теплою водою. Какъ скоро обморокъ бываетъ дѣйствіемъ слабительнаго или рвотнаго, слишкомъ крѣпкаго и ѣдкаго, то надлежитъ пользоваться больнаго такъ же, какъ отъ отравленія; слѣдовательно надо давать ему въ достаточномъ количествѣ *молоко, деревянное масло, ячменную воду, теплую воду* и проч., ставить *мягчительныя промывательныя* изъ отваровъ крупъ овсяныхъ, ячменныхъ, льнянаго сѣмени съ ромашкою и масломъ, а послѣ, когда онъ очувствуется, давать ему для укрѣпленія желудка питательную пищу чаще, но понемногу, съ присоединеніемъ къ ней овсянаго киселя съ маковымъ молокомъ. Еслиже обморокъ произойдетъ отъ непомѣрнаго употребленія пищи, особенно худокачественной, то *рвотное* есть самое лучшее средство къ избавленію себя отъ него; по этому надо способствовать ей, давая пить больному побольше теплаго питья, или нѣсколько стакановъ легкаго *настоя* изъ цвѣтовъ *ромашки* и др.; а спину велѣтъ поглаживать голою, теплою рукою. При этомъ, если больнаго не будетъ рвать безъ содѣйствія этому, то можно безъ опасенія посоветовать ему принять  $\frac{1}{4}$  золотнига порошка *рвотнаго корня* (аптекауаны). Нерѣдко случаются обмороки въ продолженіе болѣзней. Такъ напр. въ началѣ злокачественныхъ лихорадокъ случающійся обморокъ, который означаетъ обыкновенно засореніе въ желудкѣ или скопленіе испорченныхъ мокротъ, проходитъ отъ рвотнаго изъ раствора *рвотнаго камня* (№ 184), которое очищаетъ желудочно-кишечный каналъ рвотою и послѣдующимъ за нею испражненіемъ на низъ, послѣ того надлежитъ давать больному *уксусъ* внутрь въ соединеніи *съ водою*, полагая одну часть уксуса на 4 и на 5 частей воды, либо *лимонный сокъ*, а снаружи растирать имъ виски, подъ ложечкою и подносить подъ носъ для нюханія. Обмороки, случающіеся въ болѣзняхъ, сопровождаемыхъ непомѣрною рвотою, поносомъ, кровотеченіемъ, особенно послѣродовымъ, и другими выпораживаніями, должны быть пользуетмы такъ, какъ и происходящіе отъ слабости у людей изнуренныхъ, малокровныхъ, о чемъ сказано выше, и сверхъ того надлежитъ стараться объ умѣреніи такихъ выпораживаній. Въ обморокахъ, случающихся подъ конецъ сильнаго приступа перемежающейся лихорадки, или при каждомъ ожесточеніи горячки, надлежитъ подкрѣплять силы больнаго, давая ему по большому стакану хорошаго вина съ водою. Продолжительный глубокий обморокъ лѣчится какъ обмираніе, о которомъ говорится въ наставленіи объ оживленіи мнимоумершихъ, какъ-то: утопленниковъ, давленниковъ, замерзшихъ и проч.

Прим. Если въ обморокъ у молодыхъ полнокровныхъ людей, послѣ пляски во время праздничнаго гулянья, замѣчается краснобагровое, припухшее лицо, посинѣвшія губы, трудное дыханіе, то нужно посо-

вѣтовать *пустить кровь*, соображаясь однако съ особыми частными правилами, означенными въ описаніи рабочихъ поселянъ по ихъ быту и званію.

## Навалъ, кошмаръ.

**О П Р Е Д Ъ Л Е Н І Е.** Кошмаръ есть давленіе во снѣ, когда человѣкъ чувствуетъ необыкновенную на себѣ тяжесть, причемъ ему снится, что его давятъ люди, звѣри, скоть, что на него навалился кулъ овса, муги, бревно, глыба земли, камень и пр.; спящій тщетно старается избавиться отъ давленія, хотеть встать, подвинуться, но не можетъ; наконецъ вскрикиваетъ и просыпается съ радостію, что избавился отъ задущенія. Въ простонародіи это называютъ: дѣдушка (домовой) наваливается.

**П р и з н а к и.** Навалъ этотъ появляется въ первые часы сна, у однихъ людей довольно рѣдко, безъ всякаго вреда для ихъ здоровья, у другихъ же почти каждую ночь, и частымъ нарушеніемъ сна, а равно и самъ по себѣ, разстроиваетъ наконецъ здоровье.

**П р и ч и н ы.** 1) Пища, когда человѣкъ плотно поужинаетъ и скоро потомъ ложится спать; 2) полнокрое общее во всемъ тѣлѣ, или мѣстное скопленіе крови въ животѣ и груди; 3) положеніе во снѣ на спий безъ возвышенія головы, причемъ пища, кровь и вѣтры напирють на желудокъ, подъ ложечку.

Сущность состоитъ въ прижатіи, стѣсненіи брюшныхъ и грудныхъ нервовъ.

Лѣченіе діететическое, состоящее въ удаленіи причинъ, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) подверженный навалу или вовсе *не* долженъ *ужинать*, или же ѣсть немного и притомъ легкую пищу, не производящую вѣтровъ — супъ, кусокъ мяса, яйца, молоко; не ѣсть на ночь плоды, *ложась спать выпивать стаканъ холодной воды*; 2) *засыпать на боку*, а не на спинѣ, и *давать голову возвышенное положеніе*; 3) стараться *имѣть ежедневное свободное испражненіе низомъ*; *при частой отрыжкѣ и вѣтрахъ, принять на ночь порошокъ магнезии въ укропной водѣ, раковьяхъ жерновокъ, жженого хлѣба въ порошокъ*.

Лѣченіе существенное рѣдко требуется въ этой болѣзни. Эта потребность зависитъ болѣе отъ частнаго груднаго полнокроя при упорномъ привычномъ запорѣ. Въ этомъ случаѣ больной, страдающій наваломъ, долженъ обратиться за совѣтомъ къ врачу.

## Безгласіе.

**О П Р Е Д Ъ Л Е Н І Е.** Безгласіе есть болѣзнь, опредѣляющаяся самимъ названіемъ, т. е. когда голосъ или совсѣмъ пропадаетъ, или же дѣлается слабымъ, охриплымъ.



**Раздѣленіе.** Безгласіе бываетъ *первоначальное*, происходящее непосредственно отъ простуды горла, при напряженіи голоса (у пѣвцовъ, чтецовъ, проповѣдниковъ) гортани, (при катаррѣ) или *послѣдовательное*, происходящее отъ другихъ болѣзней, какъ-то: золотухи, любовстрастной болѣзни, гортанной или горловой чахотки, паралича, какъ слѣдствія пострѣла или удара, разширенія сердца, легочной чахотки, грудной водянки и проч.

Сущность состоитъ въ первоначальномъ или послѣдовательномъ страданіи слизистой оболочки, выстилающей гортань и одѣвающей гортанныя связки (голосныя струны).

**Предсказаніе.** Безгласіе *первоначальное не опасно* для жизни, но нерѣдко бываетъ *продолжительно*, когда поддерживается вліаніемъ постоянно дѣйствующей причины. Безгласіе *послѣдовательное* во всемъ зависитъ отъ той *болѣзни*, отъ которой оно происходитъ, или бываетъ ея припадкомъ.

**Лѣченіе.** Простудное безгласіе лѣчится снаружи теплыми *припарками* изъ *спынной трухи* (№ 122), *свѣжей заячьей кожи* (№ 161), *свѣчнаго хорошаго сала съ мукою* (№ 149), ношеніемъ на шею *бумаги съ мыломъ*, втираніемъ въ шею *летучей мази* (№ 76), а внутрь *груднымъ чаемъ* изъ *соломы, сухой малины, цвѣтотъ липовыхъ, бузиновыхъ* и т. п., *гогелъ-могелемъ*. Отъ продолжительной охриплости, взявъ драхму *свѣжаго хрѣна*, разрѣзаннаго на куски, кипятку 2 унца, настаивать въ тепломъ мѣстѣ, процѣдить и потомъ прибавить мелкаго сахара, сколько нужно для вкуса; по временамъ принимать по чайной ложечкѣ, проглатывая жидкость медленно \*). Въ предотвращеніе возврата при умываніи лица полезно мыть и шею жидкимъ мыльнымъ растворомъ и обтирать ее потомъ сухимъ полотенцемъ, не смывая водою мыльный растворъ, остающійся въ порахъ кожи. Безгласіе послѣдовательное золотушное лѣчится какъ золотуха; а любовстрастное (венерическое, сифилитическое) и отъ другихъ болѣзней требуетъ безусловно пособія врача, къ которому и должно совѣтовать обращаться въ этомъ случаѣ.

## Бѣшенство (бѣшеное сумасшествіе).

**Опредѣленіе.** Бѣшенство или бѣшеное сумасшествіе обнаруживается безпорядкомъ или какою нибудь одной, или всѣхъ душевныхъ способностей, при постоянномъ неудовольствіи противъ предметовъ окружающихъ, сопряженномъ съ большимъ или меньшимъ стремленіемъ къ ихъ разрушенію и уничтоженію, и при всегдашнемъ, большемъ или меньшемъ, напряженіи процессовъ плототворенія.

**Признаки,** выражающіе обыкновеннѣйшую форму бѣшеннаго сумасшествія, слѣдующіе: Питаніе тѣла сильное, такъ что по вѣш-

\*) Др. Здр. 1843 г. № 26, стр. 204.

нему виду больной находится въ цвѣтущемъ здоровьѣ: лицо, особенно глаза, выражаютъ напряженіе душевныхъ способностей; пріимчивость развита въ высшей степени, такъ что впечатлѣнія душевныя (психическія, динамическія) дѣйствуютъ на больного быстро и живо, а впечатлѣнія физическія, напротивъ, очень слабо. Въ слѣдъ за сдѣланнымъ впечатлѣніемъ обнаруживается въ больномъ особенная внимательность, распространяющаяся на большее или меньшее число окружающихъ предметовъ, сопутствуемая видимымъ отвращеніемъ къ этимъ предметамъ и стремленіемъ къ ихъ уничтоженію; въ это время лицо надувается, краснѣетъ, багровѣетъ, глаза блестятъ, иногда наливаются кровью; сила больного, стремящагося къ разрушенію ненавистнаго для него предмета, возрастаетъ въ 10 разъ и болѣе противъ здороваго состоянія. Но если ненавистный предметъ удаленъ, то больной, мало по малу, а иногда вдругъ утихаетъ. Во время пароксизма бѣшенства кожа, большею частію, бываетъ жестка и суха, жиловіеніе полное, крѣпкое, отдѣленія и испражненія, особенно на низъ, задержаны; между тѣмъ аппетитъ доходитъ до прожорливости, пищевареніе очень сильное, потому что самая грубая и разнородная пища легко перерабатывается, кромѣ того развиваются сильныя побужденія къ нѣкоторымъ веществамъ, какъ-то: къ табуку, который больные съ жадностію не только нюхаютъ, но даже ѣдятъ, пьютъ много вина, содержатъ себя не чисто до отвратительности, находятъ наслажденіе въ нечистотахъ разнаго рода, даже въ собственныхъ испражненіяхъ, которыми пичкаютъ и себя, и товарищей своихъ; спятъ больные мало, а нерѣдко по нѣскольку недѣль сряду не спятъ вовсе. Между признаками достойными замѣчанія должно считать и слѣдующіе: непрерывное умственное занятіе больныхъ или однимъ, или вдругъ многими извѣстными имъ предметами, такъ что въ теченіе короткаго времени сумасшедшій вычисляетъ неизмѣрное число предметовъ разнородныхъ, не имѣющихъ между собою никакого отношенія; у нѣкоторыхъ больныхъ при сужденіи о предметахъ иногда раскрываются идеи очень высогія, сильныя и свѣтлыя, заслуживающія всеобщаго удивленія, подобно какъ у кликушъ. Въроятно это происходитъ по тому же непонятному закону, по какому совершается ясновидѣніе. Бываетъ иногда, что болѣзнь эта далеко отступаетъ отъ описанной здѣсь ея формы, и многіе исчисленные признаки представляются совершенно въ противоположномъ видѣ, напр. вмѣсто лица, цвѣтущаго здоровьемъ, оно бываетъ блѣдное, очевидно болѣзненное; вмѣсто большой говорливости, молчаливость; вмѣсто идей свѣтлыхъ, совершенное безразсудство и т. д. *Теченіе* этой болѣзни бываетъ, или *продолжительное* (хроническое) неопредѣленное, или скоротечное, *не-продолжительно возвращающееся*.

Причины внутреннія (предрасполагающія) доселѣ неопредѣлены. Извѣстно только то, что болѣзнь бываетъ часто наследственной. Давленіе на мозгъ, происходящее отъ болѣзненнаго состоянія въ немъ, какъ то: отвердѣнія, размягченія, перерожденія, нагноенія, наростовъ

на внутренней поверхности черепа, располагаетъ къ бѣшенству и производитъ его.

Причины внѣшнія (производящія): страсти, сильно дѣйствующія на мозгъ и возбуждающія его, какъ то: чрезвычайная радость, внезапный страхъ, постоянное напряженіе мыслительныхъ способностей, особенно соображенія и разсудка (у поселянъ особенно опасеніе и боязнь порчи), сильныя пораженія чувствъ быстрыми внезапными впечатлѣніями отъ дѣйствія свѣта, звуковъ, и вообще всѣхъ впечатлѣній, сильно дѣйствующія на ощущение, какъ то: сильный холодъ, сильный жаръ; механическія вліянія, потрясающія мозгъ; раздраженіе желудочно-кишечнаго канала глистами; раздраженіе матки въ слѣдствіе или наступленія мѣсячнаго очищенія, или беременности, или неудовлетворенія побужденія; раздраженіе печени камнями, раздраженіе почекъ пескомъ и мочевыми камнями; изъязвленіе кишекъ; аневризма аорты, или самаго сердца.

Сущность состоитъ въ сильномъ раздраженіи мозга, сопровождаемомъ иногда воспаленіемъ его, и въ особенномъ доселѣ непонятномъ качественномъ измѣненіи его дѣятельности. Сюда же относятся и тѣ органическія поврежденія, какъ самого мозга, такъ и другихъ органовъ, исчисленные между причинами.

Распознаваніе. Бѣшенство *сходствуетъ* только съ *воспаленіемъ мозга*. Различіе между этими болѣзнями состоитъ въ слѣдующемъ: въ бѣшенствѣ не бываетъ горячки; а если она и бываетъ, то появляется на время и потомъ совершенно утихаетъ, между тѣмъ при воспаленіи мозга постоянная горячка; въ бѣшенствѣ больные очень прожорливы и имѣютъ особенную наклонность къ употребленію веществъ самыхъ отвратительныхъ; при воспаленіи мозга, больные ничего не ѣдятъ; наконецъ, бѣшенство начинается безъ лихорадки; напротивъ, воспаленію мозга предшествуетъ и сопутствуетъ сильная лихорадка.

Предсказаніе. Болѣзнь опаснѣе для жизни, если она происходитъ отъ сильнаго органическаго расстройства. Продолжительность болѣзни зависитъ отъ большей или меньшей возможности удалить причины. Сумашествіе бѣшеное, характера болѣе динамическаго, зависящее отъ расстройства душевныхъ способностей, безъ органическихъ расстройствъ, большею частію скоро проходитъ; въ противномъ же случаѣ, оно остается на цѣлую жизнь, и если происходитъ отъ отолстѣній и затвердѣній мозга, то болѣзнь дѣлается тихою.

Исходы въ *здоровье, друія болѣзни, смерть*. Болѣзни, въ которыя переходитъ бѣшенство, слѣдующія: задумчивость, потеря какой либо одной способности, особенно памяти; въ безуміе и во многія другія, которыя бываютъ очень разнообразны. Смертію оканчивается или отъ удара, или отъ сильнаго кровотеченія, или отъ сывороточныхъ отложеній въ мозгъ и проч.

Лѣченіе діететическое, состоящее въ удаленіи причинъ болѣзни и принятіи мѣръ къ охраненію какъ самого больнаго отъ вредныхъ

для него бѣшеныхъ его поступковъ, такъ и окружающихъ его предметовъ, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) Какъ скоро замѣчено будетъ въ комъ нибудь такое бѣшенство, то ему должно напередъ, *сложивъ руки на груди, обвить ихъ полотенцемъ и завязать*, чтобы онъ не могъ освободить ихъ и дѣйствовать, съ опасеніемъ для него и для другихъ къ нему близкихъ людей, *потомъ, приготовивъ рубаху съ короткими длинными рукавами и освободивъ ему руки, надѣть ее на него такъ, чтобы руки въ рукавахъ были сложены крестообразно на груди, а концы рукавовъ завязаны позади тѣла его* на нижней части спины и на верхней поясницы. Въ предотвращеніе же сумасброднаго бѣганья и выскакиванія на дворъ и улицу должно обѣ ноги его *забинтовать* полотенцемъ и, завязавъ крѣпко, положить на ровное теплое постланное мѣсто на полу или нарахъ (широкіе прилавки, пристѣнники). 2) Стараться *содержать* его *въ покоѣ* и тѣломъ и душою; *ненавистные предметы* отъ него *удалять* и объ нихъ не говорить и не упоминать иначе, какъ съ увѣреніемъ, что они уничтожены, выставляя разныя, какія только можно, убѣдительныя доказательства и даже примѣрные опыты \*). 3) Къ играмъ приставлять гор-

\*) Въ Казанской губерніи, татары съ успѣхомъ излѣчиваютъ это бѣшеное сумасшествіе такъ: приглашаютъ тотчасъ къ больному муллу, двухъ, трехъ и болѣе, сколько есть ихъ по близости и въ окрестностяхъ; эти читаютъ надъ головою его алкоранъ, и больной затихаетъ, лежа съ развязанными руками и ногами лицомъ ницъ и грозясь по временамъ пальцемъ въ который нибудь уголъ комнаты. Его спрашиваютъ при этомъ, кто его испортилъ; онъ обыкновенно не сказываетъ, приносятъ заряженное холостымъ зарядомъ ружье или пистолеть, показываютъ ему, говоря, что они застрѣлятъ того, кто его испортилъ, если онъ скажетъ, — но онъ все не сказываетъ; въ слѣдъ за этимъ надъ головою его стрѣляютъ въ тотъ уголъ, куда онъ грозился пальцемъ, и больной, сильно вздрагивая, приходитъ нѣсколько въ себя и начинаетъ высказывать имена его порчунцовъ; имена тѣ муллы записываетъ и, записавъ каждое имя особо, отрѣзываетъ лоскутокъ бумаги, на которомъ оно написано. Потомъ опять читаютъ и опять заряжаютъ ружье или пистолеть, показываютъ ему и опять надъ его головою стрѣляютъ въ тотъ же уголъ. Больной вздрагиваетъ сильнѣе прежняго и болѣе прежняго приходитъ въ себя и въ это время или говоритъ, что уже обо всѣхъ сказалъ, или запинаясь и говорить, что ему не вѣдятъ сказывать болѣе; въ такомъ случаѣ опять продолжаютъ читать, и опять заряжаютъ ружье или пистолеть, показываютъ ему, говоря, что бы онъ не боялся и сказалъ, кто еще его портилъ, они его застрѣлятъ. Если на кого показываетъ, то мулла записываетъ имя на бумагѣ и лоскутъ съ именемъ отрѣзываетъ; потомъ, если замѣчаютъ, что больной еще не совсемъ пришелъ въ себя и не обо всемъ еще сказалъ, опять точно также стрѣляютъ. Больной еще сильнѣе вздрагиваетъ и еще болѣе поправляется въ своихъ чувствахъ. Въ первыхъ числахъ января 1852 года я былъ очевидцемъ этого успѣшнаго способа излеченія въ татарской казармѣ, состоящей при фабрикѣ сельца Мурасы (имѣніе генералъ-майорши Вахметевой), гдѣ одинъ молодой татаринъ, здороваго и крѣпкаго сложенія, безъ всякой, повидимому, причины, подвергшись этого рода бѣшенству, былъ допущенъ съ моего согласія, при мнѣ, къ этому обычному ихъ способу излеченія. Послѣ троекратнаго выстрѣла изъ пистолета надъ его головою въ уголъ онъ показалъ на четверыхъ своихъ деревенскихъ обывателей татаръ, какъ на пор-

*чичники*, которые надо держать постоянно то на той, то на другой икрѣ, для постоянного отвлеченія крови отъ головы, отъ которой сверхъ того отгонять приливъ ея *капельнымъ поливаніемъ холодной воды* съ достаточной высоты на темя головы больного, *примочками* ея изъ *воды съ уксуомъ, льдомъ и снѣгомъ, настоемъ мяты*. 4) Главнымъ образомъ совѣтовать: *отправить такого больного какъ можно скорѣе въ лазаретъ*.

ЛѣЧЕНІЕ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЪ ЭТОЙ СТОЛЬ ВАЖНОЙ БОЛѢЗНИ ДОЛЖНО СКОРѢ ПРЕДОСТАВИТЬ ВРАЧУ, ИМѢЯ ВЪ ВИДУ, ЧТО И У САМЫХЪ ИСКУСНЫХЪ ВРАЧЕЙ ОНО БЫВАЕТЪ ЗАТРУДНИТЕЛЬНО И ЧАСТО БЕЗУСПѢШНО.

## КЛАССЪ ВТОРОЙ

### БОЛѢЗНИ КРОВИ.

**ОПРЕДѢЛЕНІЕ.** Болѣзни крови обнаруживаются болѣзненными признаками, показывающими неправильное состояніе кровотоверенія и кровообращенія, безъ важныхъ впрочемъ первоначальныхъ болѣзненныхъ переѣнъ (припадковъ), выражающихъ неправильное состояніе другихъ системъ и другихъ отправленияй.

Наи чаще случающіяся болѣзни у поселянъ, принадлежащія къ этому классу, слѣдующія: *угаръ, цынга, кровотечения: носовое, маточное, кровохарканіе, геморрой, кровавое мочетеченіе*.

### Угаръ.

**ОПРЕДѢЛЕНІЕ.** Угаръ обнаруживается первоначально головою тяжестью и болью, развивающеюся преимущественно въ вискахъ, силь-

чюновъ его, опять легъ ницъ лицомъ на нары, смотря дико въ одинъ и тотъ же уголь; имена тѣ мулла записалъ, лоскутокъ бумаги съ именами отрѣзалъ, зарядил еще пистолеть, показали ему, и онъ самъ (больной), выстрѣливъ въ уголь, сказалъ: ну, теперь всѣхъ кончили! Этотъ послѣдній, котораго я убилъ теперь, говорилъ онъ, больно мнѣ грозилъ, торча въ углу головою. Больной всталъ, былъ повоенъ духомъ; я подошелъ къ нему, и онъ мнѣ на все отвѣчалъ и говорилъ со мною хорошо, увѣряя меня, что болѣе съ нимъ ничего не будетъ. Тутъ муллы велѣли ему лечь и сожгли на немъ поверхъ рубашки всѣ лоскутки бумаги съ именами и обкурили его сѣрою; больной выздоровѣлъ и не подвергался уже болѣе этой болѣзни. Утверждаютъ, что тѣмъ скорѣе призовутъ мулла въ подобномъ случаѣ, тѣмъ скорѣе и надежнѣе они вылѣчиваютъ, и что этотъ способъ лѣченія возможенъ только въ первые три дня болѣзни, а если этотъ срокъ пропустить, то больной остается неизлѣчимымъ для нихъ, и тогда его отправляютъ въ лазаретъ. Вѣроятно, что этотъ способъ лѣченія, какъ основанный на удаленіи производящей динамической причины, только и доступенъ въ началѣ болѣзни, пока она не застарѣлась и не произвела болѣзненныхъ органическихъ переѣнъ въ мозгъ и его нервахъ.

нымъ біеніемъ височныхъ артерій и прерывистымъ, соотвѣтствующимъ жилобіенію, шумомъ въ ушахъ, съ послѣдующимъ постепенно-возрастающимъ отупѣніемъ чувствъ, сонливостію и совершеннымъ безчувствіемъ.

**Признаки.** Сначала тяжесть и тупая боль въ головѣ, потомъ головная боль въ вискахъ, распространяющаяся на подбровныя части и на самыя глаза, которые у многихъ угорѣвшихъ сильно ломятъ и заливаются кровію, шумъ въ ушахъ, то какъ отдаленный звукъ колокола, то какъ шумъ вѣтра, соотвѣтствующій біенію артерій (кровобіющихся жилъ); жилобіеніе полное, сильное, но неровное. Замѣчательно, что всѣ эти признаки гораздо раньше появляются тогда, когда угорѣвшіе выходятъ на чистый воздухъ. Въ слѣдъ за этимъ нерѣдко появляется сильная склонность ко сну, очень похожая на ту, которая бываетъ при замерзаніи человѣка. Если угорѣвшіе предаются сну, то сонъ бываетъ глубокой до безчувственности, причемъ лицо обрѣзывается и какъ бы втягивается, почти всегда очень блѣдно, а окружность глазъ и губъ синяя; пульсъ становится малымъ и слабымъ, часто перебивающимся и нерѣдко сливающимся. Тутъ, если не будетъ подана надлежащая помощь, больные умираютъ. Смерти предшествуютъ слѣдующіе признаки: рѣдкое и храпливое дыханіе, сопровождаемое нерѣдко появленіемъ черноты въ носу и пѣны во рту, жилобіеніемъ плывучимъ и едва ощутительнымъ, притомъ иногда глаза быстро вскрываются и также очень быстро то появляется, то опять исчезаетъ смертельная снѣговая бѣлизна или ручныхъ кистей, или однихъ пальцевъ.

**Причины внутреннія.** Предрасположеніе состоитъ въ полнокровіи, въ густотѣ крови, особенно при недостаткѣ окисленія.

**Причины внѣшнія (производящія).** Единственная причина — измѣненный углекислый газъ, состоящій изъ газовъ, отдѣляющихся при горѣніи, углекисленнаго и углеводороднаго (чадъ). Газы видимо горящихъ угольевъ не такъ вредны, какъ скрытно и тихо тлѣющихъ; особенно вредны газы каменныхъ и дубовыхъ угольевъ (дубовые угли наичаще причиняютъ угарь); чадъ раскаленныхъ каменныхъ угольевъ, сальныхъ свѣчъ, чадъ воска, масла, ворвани, стеарина также вреденъ; но такъ какъ онъ отзывается пригорѣлымъ запахомъ, то отъ него скоро можно остеречься. Угольный чадъ, будучи легче воздуха, въ комнатахъ занимаетъ верхній слой воздуха, зимою вѣется синевою около замерзшихъ окошекъ, и потому въ топленныхъ избахъ, въ баняхъ, люди чаще и легче угораютъ на полатахъ, печкахъ, хотя бы прочій воздухъ спертаго мѣста и совершенно былъ хорошъ и здоровъ.

**Сущность въ первомъ періодѣ болѣзни, т. е. до появленія безчувственности, состоитъ со стороны динамической въ сильномъ напряженіи раздражительности кровеносной системы, особенно общаго чувствительнаго (мозга); со стороны матеріальной въ обугленіи крови и начинающемся развитіи разрѣшимости ея. Во второмъ періодѣ, т. е. при безчувственности, сущность состоитъ со стороны динамической, въ отуп-**

пѣніи раздражительности, преимущественно мозга, а со стороны матеріальной — въ разрѣшимости крови съ явственнымъ уменьшеніемъ ея въ системѣ артеріальной (кровобіющихся сосудахъ) и съ увеличеніемъ ея количества въ системѣ венальной (крововозвратныхъ сосудахъ).

**Р а с п о з н а в а н і е.** По признакамъ болѣзни угаръ очень походитъ на отравленіе наркотическими ядами, отъ котораго впрочемъ его не трудно отличить, какъ скоро будетъ извѣстна причина производящая.

**П р е д с к а з а н і е** относительно опасности для жизни зависитъ отъ степени развитія болѣзни. Относительно продолжительности ея, предсказаніе всегда хорошо, потому что болѣзнь болѣе 6 или 8 часовъ рѣдко продолжается.

**И с х о д ы.** Въ *здоровье* переходитъ, когда будетъ удалена производящая причина, и когда будутъ уничтожены всѣ болѣзненные перемѣны, произведенныя ею. *Болѣзни*, въ которыя переходитъ угаръ, суть: ударъ мозговой и кровотеченія, особенно носомъ, продолжительныя изнуренія, разстройство душевныхъ способностей, особенно примчивости (очень рѣдко). *Смертью* оканчивается чаще всего при посредствѣ мозгового удара.

**Л ѣ ч е н і е** діететическое, состоящее въ удаленіи причинъ болѣзни, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) Въ предохраненіе отъ угара должно совѣтовать *хорошо устроить печи*, особенно *вышки*, и *имѣть* надлежащій *присмотръ* за *топленіемъ* комнатъ, *избѣ*, *бань* и *закрываніемъ трубъ* не прежде, какъ сгорѣвшіе угли покроются золою, и *дрова* для топленія *употреблять* сухіе березовые, осиновые, еловые, а *не дубовые, не каменный уголь или кизель* и пр. 2) Кто только почувствуетъ малѣйшіе признаки угара, или заподозритъ его дѣйствіе на себя, даже и до этого, только при одной мысли, какъ бы не угорѣть, долженъ, *для испытанія себя, выйти на чистый свѣжій воздухъ*, въ которомъ онъ тотчасъ почувствуетъ его дѣйствіе въ головѣ, если угорѣлъ, и тогда онъ уже не долженъ входить въ угарное мѣсто до тѣхъ поръ, пока угаръ пройдетъ, какъ въ его головѣ, такъ и въ самомъ мѣстѣ его пребыванія. 3) Головную боль отъ угара, кромѣ чистаго свѣжаго воздуха, облегчаетъ *частое нюханіе тертаго хрѣна съ уксуомъ*, который надо, положивъ въ стаканъ, накрыть ломтемъ чернаго хлѣба, что бы не выдыхалась его крѣпость. 4) На лобъ и виски угорѣвшаго полезно прикладывать *квашеную капусту, ветошку*, намоченную въ холодной водѣ, либо съ *завернутымъ въ нее льдомъ, снѣгомъ*. 5) *Пищу употребляютъ не должно* нѣгагой, пока продолжается головная боль, а *пить воду съ кислымъ, клюквеннымъ, брусничнымъ, лимоннымъ сокомъ*, либо съ *уксусомъ*.

**Л ѣ ч е н і е** существенное, соотоящее въ возбужденіи раздражительности и приведеніи въ чувство больного, требуетъ помощи для угорѣвшаго до безчувственности самого врача, за неимѣніемъ котораго по близости слѣдуетъ поступить слѣдующимъ образомъ: прежде всего *перенести* больного *на самое открытое мѣсто* въ домѣ, даже на

дворъ, въ садъ и т. п. Послѣ того его должно *раздѣть, посадить на стулъ, скамью или на полъ, прислонивъ спиною къ стѣнѣ; голову надо ему держать прямо* и уставить ее такъ, чтобы она не могла качаться во время подаванія вспоможеній; когда все это будетъ устроено, то многіе люди, перемѣняя одинъ другаго, въ случаѣ усталости, *безпрестанно должны вспрыскивать ему лицо самою холодною водою* съ большою силою и въ извѣстномъ разстояніи, употребляя для этого стабань, ковшигъ, кружечку и т. п. Воду черпать припасенными ведрами, въ которыхъ ее должно непрерывно дополнять по мѣрѣ того, какъ она тратится. Эту операцію должно производить съ помощью многихъ людей попеременно, съ довольно большою силою и продолжать нѣсколько часовъ безостановочно, или до тѣхъ поръ, пока не будутъ примѣчены нѣкоторые знаки жизни, оказывающіеся небольшою нотою. Тогда можно *открытъ ротъ безчувственно угорьвшему* и стараться *держать его открытымъ* посредствомъ владыванія ему между зубами небольшихъ деревянныхъ осколочговъ, чтобы онъ могъ пропустить ложку воды, съ семью или восемью каплями *нашатырнаго летучаго спирта*. Въ ноздри же ему *вставляютъ* бумажки, свернутыя на подобіе *свѣтильни* и налитанныя нашатырнымъ спиртомъ, которыя нужно чаще перемѣнять. Потомъ опять очень послѣшно приняться за вспрыскиваніе холодною водою, потому что перерывъ при этомъ долженъ быть самый короткій, и продолжать его, переставая по временамъ для того только, чтобы дать ему проглотить нѣсколько ложекъ холодной воды съ каплями нашатырнаго спирта по прежнему, до тѣхъ поръ, пока больной, видимо, не почувствуется и не начнетъ даже выговаривать словъ. За нотою послѣдуетъ рвота и дрожаніе во всемъ тѣлѣ. По приведеніи его такимъ образомъ въ память и чувство надлежитъ перенести его на нагрѣтую слегка постель и тереть теплыми салфетками. Трениемъ этимъ должны заняться двое, одинъ натирать туловище, а другой конечности; давать ему нюхать нашатырный летучій спиртъ и принять нѣсколько ложекъ воды съ каплями того же спирта. При всемъ томъ въ *комнатѣ* надобно *содержать свѣжій воздухъ*, а иначе выздоровленіе его могло бы быть только минутное; если же онъ впадетъ опять въ прежнее состояніе безчувствія, то надлежитъ опять начать вспрыскиваніе холодною водою и продолжать его, такъ какъ выше сказано объ этомъ; сверхъ того нужно еще ставить *промывательныя*, особенно если голова бываетъ тяжело больна, и *ножныя ванны*, простыя и сложныя (№№ 83, 84).

### Цынга (скорбутъ).

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Цынга обнаруживается первоначально козлинымъ запахомъ отъ больного, припухlostью, вяlostью и кровоточностью десень, а при дальнѣйшемъ развитіи синими пятнами и полосами на ногахъ, переходящими въ растворительное изъязвленіе, тяжестію и без-



дѣйствительностью ногъ при правильномъ состояніи душевныхъ способностей.

**П р и з н а к и:** блѣдныя синеватая, грязныя, припухшія, рыхлыя десны, которыя зудятъ, отъ легкаго прижатія течетъ кровь; тяжелый вонючій запахъ изо рта, шаткость и выпаденіе зубовъ, слабый, медленный пульсъ, блѣдное и одутлое лицо, синія пятна на ногахъ (голеняхъ) и отѣкъ, въ которомъ, какъ въ тѣстѣ, отъ давленія пальцемъ, остается впадина, медленно исчезающая; ломотная боль въ суставахъ, особенно въ колѣняхъ и ступняхъ; усталость и одышка, даже послѣ легкаго движенія; лѣнность и отвращеніе отъ всякихъ занятій; грустное расположеніе духа; вонючая испарина; густая, вонючая, мутная моча, скоро переходящая въ гніеніе. Въ дальнѣйшемъ теченіи цынги и въ высшей ея степени появляются частыя кровотечения изо рта, носа, горла; кровь при этомъ бываетъ жидка, темна, трудно створаживается, даетъ мало творогу, много сыворотки, легко загниваетъ; слабость увеличивается до того, что больной, при легкомъ движеніи и даже стоя, падаетъ въ обморокъ, синѣя, даже при этомъ по всему тѣлу разливаются отъ ногъ черныя пятна, сообщающія больному страшный видъ; на разныхъ частяхъ тѣла и особенно на голенихъ, появляется отвердѣніе кожи и отгрываются часто обширныя, кровоточивыя, синія, губчатыя, рыхлыя, вонючія язвы, переходящія безъ особенной явной причины въ помертвѣніе, которымъ уничтожаются цѣлыя члены.

**П р и ч и н ы** внутреннія (предрасполагающія). Предрасположеніе состоить или во врожденной, или въ приобрѣтенной наклонности крови къ разрѣшимости, а эта наклонность зависитъ отъ худой обисляемости крови. Предрасположеніе врожденное бываетъ иногда не только въ цѣлыхъ семействахъ, но и въ цѣлыхъ поколѣніяхъ.

**П р и ч и н ы** внѣшнія (производящія) суть всѣ условія, препятствующія окисленію крови и вмѣстѣ съ тѣмъ сообщающія ей вещества противуположительныя, какъ-то: сырой, холодный или теплый, нечистый, спертый воздухъ, налитанный людскою испариною, дыханіемъ, мрачною, туманною атмосферою, болотными парами; пища и питье гниlostныя, тухлыя, долго лежавшія соленыя и копченныя испортившіяся мяса, хлѣбъ и сухари заплеснѣвшіе, тухлая, соленая, вода, неопрятное содержаніе тѣла, на которомъ скопившаяся и сгустившаяся нечистота, оставаясь долгое время, всасывается и относится въ массу крови; задержаніе испражнений, особенно мочи, пота и на низъ, продолжительный недостатокъ свѣта, огородныхъ овощей, тѣлеснаго движенія; душевныя огорченія, особенно печаль, уныніе и зависть. По этимъ причинамъ подвергаются цынгѣ крестьяне, живущіе въ тѣсныхъ, сырыхъ, холодныхъ избахъ, въ которыхъ вмѣстѣ съ хозяевами поимъщаются телята, барашки, поросята и проч. Если притомъ такіе крестьяне, послѣ неурожая, въ теченіе зимы терпятъ недостатокъ въ хорошемъ здоровомъ хлѣбѣ, квашеной капустѣ, буракахъ, огурцахъ; то съ приближеніемъ весны, въ мартѣ, февралѣ и даже ранѣе, развивается цын-

га, сначала между бѣднѣйшими и наиболѣе нуждающимся поселянами, а потомъ между достаточными жителями, принимая видъ повальной болѣзни, такъ что не только всѣ члены семейства, всѣ жители селенія занемогаютъ цынгою въ разной степени, но болѣзнь распространяется, или лучше сказать открывается, разомъ во многихъ уѣздахъ и губерніяхъ. Такъ, послѣ неурожая хлѣба и огородныхъ овощей, къ веснѣ 1852 года, цынга открылась въ разныхъ губерніяхъ Россіи въ огромномъ размѣрѣ и была причиною значительной смертности между крестьянами; впрочемъ, съ наступленіемъ теплаго, яснаго, весенняго времени, эта болѣзнь быстро ослабѣваетъ, и заболѣвшіе скоро выздоравливаютъ. При этомъ нужно замѣтить, что цынготные весной легко подвергаются перемежающимся лихорадкамъ, которыя у нихъ бываютъ особенно упорны, принимаютъ опасный видъ (т. е. соединяются съ обмороками, больные обмираютъ по выраженію крестьянъ) и оставляютъ послѣ себя завалы въ животѣ, брюшную водянку, отѣкъ ногъ и пр. Не менѣе того цынга появляется между жителями въ приморскихъ, болотистыхъ мѣстахъ, въ тюрьмахъ, больницахъ, казармахъ, разныхъ многолюдныхъ воспитательныхъ и учебныхъ заведеній (семинаріяхъ), на корабляхъ при продолжительныхъ мореплаваніяхъ. Кромѣ того бываютъ подвержены цынгѣ: также рыбаки, занимающіеся продажей рыбы, нерѣдко тухлой, испортившейся, тгачи и тгачихи, живущіе въ низменныхъ и сырыхъ комнатахъ, фабричные, работающіе сидя, торгаша, сидящіе въ лавкахъ и прилавкахъ, пряхи, мотальщицы и всѣ мастерские и женщины, ведущія сидячую жизнь.

Сущность болѣзни состоитъ въ жидкой, водянистой, темноватой крови, которая утратила свою жизненность, свои плотныя, составныя части, и чрезъ то получила наклонность къ нагноенію.

Распознаваніе легко. Иногда цынга сходствуетъ съ сифилитическою (венерическою) болѣзнію, но отличается отъ послѣдней не только изслѣдованіемъ причинъ происхожденія, но и самымъ осмотромъ ея: 1) скорбутъ падаетъ на зубы и десны, а венерическая болѣзнь, напротивъ, на язычекъ, желѣза, называемыя миндальными и на поднебенье; 2) скорбутическія боли болѣе бродящи, непостоянны и поверхностны, нежели венерическія; 3) въ скорбутѣ страдаетъ всегда болѣе или менѣе животъ, а въ венерической болѣзни обыкновенно голова и конечности, и наконецъ 4) цынготныя раны несравненно мокрѣе, нежели венерическія.

Предсказаніе относительно опасности для жизни и продолжительности болѣзни зависитъ: 1) отъ большей или меньшей удаляемости причинъ ея и 2) большей или меньшей степени ея развитія, такъ что чѣмъ удобнѣе и скорѣе удаляется дѣйствующая причина болѣзни, тѣмъ менѣе она бываетъ опасна и продолжительна, и на оборотъ; равнымъ образомъ чѣмъ слабѣе болѣзнь, тѣмъ она безопаснѣе и скорѣе проходитъ, и на оборотъ; *хорошими признаками* въ скорбутѣ считаются пятна (если только они цвѣтомъ не темныя и не черныя). и

кровотечения; а признаками *опасными* считаются: давление въ груди, поносъ, чувствительныя и безпрестанныя боли во внутренностяхъ живота, преимущественно въ кишкахъ, которымъ они угрожаютъ омертвѣніемъ (антоновъ огонь).

**Исходы.** Въ *здоровье* переходитъ довольно легко, съ пособіемъ и безъ пособія, единственно при условіяхъ, противоположныхъ условіямъ, производящимъ эту болѣзнь, если только она не достигла послѣдней степени своего развитія. *Болезни:* всеобщее истощеніе, гнилая горячка, водянка, особенно подкожная и брюшная. *Смертію* оканчивается при посредствѣ этихъ болѣзней.

**Лѣченіе** діететическое цынги, состоящее въ удаленіи причинъ, производящихъ ее, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) Предъ наступленіемъ весны, особенно когда поселяне терпѣли недостатокъ въ хорошей пищѣ, приваргѣ, чистомъ и просторномъ помѣщеніи и проч., если при этомъ у нихъ распухаютъ и синѣютъ десны, дурно пахнетъ изо рта, изъ десенъ легко течетъ кровь, даже при жеваніи хлѣбной корки; если они протпвъ своего обыкновенія лѣнивы, все лежатъ, жалятся на ломоту въ ногахъ, имѣютъ блѣдное, обрюзглое лицо, отекишия ноги, синія пятна и язвы на ногахъ, либо слишкомъ отвердѣлыя части (особенно икры); если такіе люди, особенно дѣти, стоя въ церкви падаютъ въ обморокъ, имѣютъ большой позывъ на лукъ, хрѣнь, рѣдкую, кислую капусту, квасъ и проч., то всѣхъ ихъ нужно отдѣлить, *помѣститъ въ свѣтлыя, чистыя, просторныя избачъ*, расположенныхъ окнами на югъ, или востокъ, но не на сѣверъ или западъ. 2) *Чтобы въ избачъ больныхъ не было никакой сырости* (а для этого не мочить пола, не разливать воды и не держать ее въ ушатахъ, ведрахъ): *чтобы больные просыпались рано, не лежали долго въ постеляхъ*, тотчасъ бы вставали по восходѣ солнца, если позволяетъ время года и погода, *выходили бы на свѣжій воздухъ* и даже проводили значительную часть времени на открытомъ воздухѣ и на солнышгѣ. Воздухъ и солнечный свѣтъ лучшія противуцынготныя средства: первый возбуждаетъ дыханіе (больные, сами не замѣчая, на открытомъ воздухѣ невольно часто и глубоко вдыхаютъ); дыханіе же ускоряетъ и оживляетъ всѣ дѣйствія на землѣ, а потому и въ нашу кровь вливаетъ, такъ сказать, новую жизнь. Цынготные больные, по внутреннему побужденію, сами хотятъ оставаться подолѣе на солнышгѣ, сладко засыпаютъ и пробуждаются съ бодростію и свѣжестію въ тѣлѣ. 3) Изъ състныхъ припасовъ въ *пищу* и питье должно *назначать: лукъ, чеснокъ*, (на Кавказѣ народъ отъ цынги избавляется *черемшою* — родъ дикаго чеснока, избилгующаго тамъ) *горчицу*, сырой тертый *картофель*, *рѣдкую, квашеную капусту*, *свекловичу* (буракъ), *соленые огурцы*, разную *свѣжую огородную зелень*, *кислые плоды*, *лимоны*, *квасъ*, *сыровецъ*, *брагу*, *пиво*, *пивныя дрожжи*. Всѣ эти вещи, какъ противуцынготныя средства, употребляются цынготными больными сами по себѣ и въ приваргѣ, въ видѣ окрошки для завтрака, щей, борщу; особенно дѣйстви-

тельные лимонный сокъ и пивныя дрожжи, употребляемыя въ *питье* съ водою, и *пиво*, настоянное на *свѣжемъ хрѣмѣ*. Для питья цынготнымъ также полезны: *уксусъ съ водою*, *квасъ*, простой и бурачный сыровецъ, *вода съ хрѣновымъ сокомъ*, *березовый сокъ* свѣжій и окисшій и *молоко*. Болѣзнь отъ этихъ средствъ обыкновенно проходитъ, если приступитъ къ употребленію ихъ прежде, нежели она возрастетъ до значительной степени своего развитія, только для счастливаго успѣха надлежитъ продолжать ихъ долгое время. 4) Если будетъ замѣчено, что болѣзнь зависитъ отъ сидячей жизни, или отъ беспокойныхъ страстей, каковы: горестъ, страхъ, и т. п., то больнымъ должно имѣть, сверхъ того, ежедневно столько *тѣлодвиженія* на вольномъ воздухѣ, сколько имъ позволятъ ихъ силы, т. е. *тихое*, но постоянное *упражненіе* тѣлесныхъ силъ или *прогулки*, дѣлаемая утромъ, спустя 2—3 часа по восхожденіи, а вечеромъ предъ закатомъ солнца очень полезна. 5) Такъ какъ скорбутическія больные обыкновенно бываютъ грубы, нетерпѣливы и сучливы, то полезно доставлять имъ случаи къ ихъ развлеченію пріятнымъ обществомъ, или какими нибудь забавами. 6) *Содержаніе* больныхъ должно быть *полупрохладное*, не выше 14° теплоты, при этомъ *обливаніе* ихъ *чистою*, 20°—22° водою, повторяемое *ежедневно*, оказываетъ большую пользу. 7) Въ предупрежденіе возврата этой болѣзни каждый человѣкъ, который былъ уже одержимъ скорбутомъ, долженъ отказать отъ снѣдей, состоящихъ изъ веществъ животныхъ, или, если и употреблять ихъ, то не болѣе одного раза въ день, да и то какъ можно менѣе; онъ долженъ *питаться* только *молокомъ* и *растениями*, преимущественно вышеупомянутыми *огородными овощами*; всѣ *напитки* его должны быть *подкислены*, также и *горячія кушанья*; сверхъ того ему необходимо всякое утро принимать *отваръ* изъ корней *конскаго шавеля*, по стагану и по рюмкѣ *водки*, настоянной на *сосновыхъ шишкахъ*. Въ лѣтнее же время могутъ все это замѣнить *плоды*: *земляника*, *малина*, *вишни*, *смородина*, *яблоки*, *всякаго рода груши* и проч. Ихъ должно употреблять всѣмъ страдавшимъ когда нибудь скорбутомъ, или имѣющимъ къ нему предрасположеніе. 8) Чтожь касается до вышеупомянутыхъ рабочихъ людей, какъ-то: рыбаговъ, ткачей, фабричныхъ, торгашей, пряхъ, мотальщицъ, всѣхъ мастеровыхъ и женщинъ, ведущихъ сидячую жизнь, и оттого подвергающихся цынготной болѣзни, то для нихъ изложены особыя, сверхъ того, правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лѣченіе существенное, состоящее въ направленіи соковъ (крови) и силъ, требуетъ употребленія отвара *моладыхъ сосновыхъ однолѣтнихъ отростковъ*, *шишекъ* и *корня ира*, которые, впрочемъ, лучше всего настаивать въ водкѣ и давать цынготнымъ два раза въ день по рюмкѣ или и болѣе, и первый сверхъ того въ пивѣ, приготовленномъ слѣдующимъ образомъ: взявъ *моладыхъ сосновыхъ однолѣтнихъ отростковъ* двѣ части, налить *тринадцатю частями* воды и въ приливномъ сосудѣ (котлѣ, горшкѣ, корчагѣ) варить до кипѣнія, такъ чтобы въ

сильномъ жару долго упаривалось, какъ обыкновенно дѣлають съ простымъ хлѣбнымъ пивомъ. Потомъ оставшуюся третью часть отрошковъ положить въ бочку и послѣ вылить отваръ, не давъ ему еще остынуть, т. е. въ теплое прибавить добрыхъ пивныхъ дрожжей; чтобы составленное пиво имѣло довольноное броженіе и закисло, нужно ему стоять семь дней, въ первые дни совсѣмъ незакупореннымъ, а въ послѣдніе пять дней закупореннымъ, но не крѣпко, послѣ же хранить для употребленія. Лучше варить это пиво въ закупоренныхъ сосудахъ. Отростки, оставшіеся послѣ отвара, слитаго въ бочку, должно выжать и выжатое слить туда же. Это пиво имѣетъ блѣдно-желтый цвѣтъ, довольно жидко и прозрачно какъ выжатый лимонный сокъ, островато, горьковато, кисловато, нѣсколько солено и какъ бы вяжеть, имѣетъ ароматный, пріятный запахъ. Отъ долгаго стоянія оно не портится, но дѣлается свѣтлѣе, и спиртуозность въ немъ значительно усиливается. Его употребляютъ по бутылкѣ въ день въ три или четыре приема, но, привыкнувъ къ нему, можно употреблять его вмѣсто обыкновеннаго питья \*). Отличное противоцинготное средство также *морозика* (ягода), *ложечная трава* (редечные листы) и *чаберъ* (въ видѣ чая); ягода употребляется моченою, а трава въ настойкѣ съ водкой, приваркѣ, салатѣ; чаберъ, растущій въ изобиліи въ южныхъ губерніяхъ Россіи и около Дуная, простолюдины употребляютъ съ большою пользою отъ цынги: на 3½ золтн. сухой травы наливають до ½ фунта горячей воды и настойку даютъ пить по стакану, также обмываютъ и примачиваютъ на ветошкѣ синія пятна и цынготныя язвы \*\*). Этихъ средствъ: свѣжаго воздуха, солнышка и противуцинготной діеты, достаточно для излѣченія обыкновенной цынги. *Пивная дрожжи*, употребляемыя снаружи въ видѣ примочекъ и внутрь каждыя 2 часа по столовой ложкѣ, останавливаютъ развитіе болѣзни по истеченіи сутокъ, а по прошествіи 3-хъ недѣль, болыныя, нерѣдко обреченныя на смерть, совершенно выздоравливаютъ \*\*\*). Когда у людей, слабаго сложенія, истощенныхъ, не показывается явственной опухоли на нижнихъ конечностяхъ, но бываютъ только синія пятна, чрезвычайно сильныя боли днемъ и ночью, кожа сухая, примѣтный жаръ, общее раздражительное состояніе, и болѣзнь бываетъ сначала свойства ревматическаго, а потомъ, при упадкѣ силъ и общей слабости, она принимаетъ характеръ цынги, то въ этихъ двухъ видахъ болѣзни штабъ лѣкарь Горшковъ употребляетъ *холодную воду* въ 10, но не болѣе 12 град. по Реомюру, *весною рѣчную*, въ *лѣтнее время колодезную воду*, наливая ее въ глиняныя кувшины и затыкая ихъ плотно. Намачивая такою водою холсты и ветошку, и обвивая ею страдающую часть тѣла, оставляють въ такомъ положеніи до тѣхъ поръ, пока ветошка высохнетъ; операцію эту постоянно продолжаютъ.

\*) Военно-медицинскій журн. 1825 г. часть V № 1 стр. 176.

\*\*) Др. Здр. 1836 г. № 47. стр. 369.

\*\*\*) Др. Здр. 1841 г. № 7, стр. 53.

не только днемъ, но даже и ночью, потому что и сами больные, для успокоенія болей, желаютъ непрерывно примачивать страждущія часті тѣла. Отъ этого лѣченія жаръ и сухость кожи ослабѣваютъ, натуральная теплота въ страждущей части восстанавливается, члены дѣлаются мягче, восстанавливается испарина кожи, бывшія синія пятна, отъ изліянія крови въ клетчатую плеву проходятъ, кожа получаетъ натуральный свой цвѣтъ, боли уничтожаются и, при приличномъ общемъ лѣченіи цыгги, больные скоро поправляются и выздоравливаютъ. Этою методою онъ вылѣчилъ въ одну весну болѣе 50 человекъ безъ всякихъ худыхъ послѣдствій, и притомъ скорѣе, нежели при другихъ способахъ лѣченія.

Въ легкомъ скорбутѣ, а особливо, если этою болѣзнію одержимы однѣ только десны, можно излѣчить ее *горькимъ померанцемъ* или *лимономъ*, посасывая его нѣсколько разъ въ день; въ случаѣ недостатка въ этихъ средствахъ имъ не уступаетъ въ дѣйствиі въ этой болѣзни нашъ *щавель*. Неприятный запахъ изо рта, рыхлость и кровоточивость десенъ, шаткость зубовъ проходятъ отъ жеванія *табаку* и противуцынготнаго полосканья изъ *дубоваго, ирнаго отвара* съ *квасцами* и *водкою*, настоянною на *хрѣнь* или *ложечной травѣ* (№ 203); но когда во рту на деснахъ будутъ раны, то надлежитъ назначить полосканье, состоящее изъ процеженнаго настоя *ячмыхъ крупъ съ медомъ*, къ которому, смотря по обстоятельствамъ, прибавляютъ больше или меньше капель *спирту ложечной травы* (spiritus cochlear). Боли въ суставахъ и синія пятна уступаютъ тренію *муравейнымъ, березовымъ спиртомъ, виномъ*, настояннымъ на *хрѣнь, ложечной травѣ*, но большею частію пятна не требуютъ никакого наружнаго лѣкарства, потому что вогнаніе или согнаніе ихъ можетъ быть вредно для больного. Кровотеченіе изъ носа останавливается впрыскиваніемъ въ носъ *холодной воды, отвара дубовой, ивовой коры, съ уксуомъ, квасцами*; кровотеченіе изъ задняго прохода—*холодными клистирами*, состоящими изъ этихъ же средствъ; но кровохарканіе требуетъ приглашенія врача. Затвердѣлая припухлость, обыкновенно въ послѣдствіи переходящая въ цынготныя язвы, проходитъ отъ *припарокъ* изъ *стѣпной трухи, отрубей съ дрожжами, уксуомъ*, а еще лучше отъ *барды*, изъ которой можно дѣлать цынготнымъ теплыя *ванны*, особенно при ломотныхъ боляхъ въ суставахъ.

Цынготный обморокъ лѣчится, какъ и всякій другой обморокъ; больные скоро приходятъ въ чувство отъ *свѣжаго воздуха*, опрыскиванія *холодною водою* и поднесенія къ носу нюхательнаго (*нашатърнаго*) *спирта*.

Переменяющаяся лихорадка съ обморокомъ у цынготныхъ больныхъ, по прошествіи приступа, требуетъ смѣлаго и частаго употребленія *хинной соли* 2—4 грана на пріемъ чрезъ 1—2 часа, такъ что бы остановить, или хотя ослабить будущій приступъ. Цынга у больныхъ, зараженныхъ любострастною болѣзнію, требуетъ приглашенія врача; здѣсь

нужно прежде лѣчить цынготную, а потомъ уже и любострастную болѣзнь, и то не ртутью, а кровочистительными отварами (см. любострастная болѣзнь). Скорбутическій флюсъ, познаваемый изъ того, что страдающіе имъ имѣютъ ротъ израненный, слюнныя желѣза опухшія, съ болью и слюнотеченіемъ, десны и зубы покрыты бѣловатою пасокою, дурной запахъ изо рта, десны опухшія, кровоточивыя, съ болью, покрывающіяся иногда ранками, и даже, когда флюсъ этотъ очень силенъ, то во внутренности губъ, щекъ и на языкѣ дѣлается молочница, разъѣдающая части, не менѣе, какъ и меркуріальное слюнотеченіе, что продолжается, большею частію, 8—10 дней, а иногда и болѣе, до 3 недѣль — требуетъ употребленія въ *пищу легкихъ* суповъ (похлебокъ) изъ пшена сарачинскаго, овсяной кашицы, а въ *питье лимонада, легкаго оршада, воды съ клюквеннымъ сокомъ, брусничнаго моченія*, которыя должно подогрѣвать, если погода холодна; также сухари, размачиваемые въ этомъ питьѣ или обмакиваемые въ него, составляютъ приличную въ этомъ случаѣ болѣзни пищу; при этомъ полезно *тереть больному десны медомъ, лимонною коркою* и самымъ *лимономъ*, который употреблять и въ полосканье, дѣлаемое изъ настоя ячныхъ крупъ; когда же боль будетъ очень жестока, (она можетъ быть и палящею), въ такомъ случаѣ въ помянутое полосканье надлежитъ прибавить *лимоннаго сока*. При лѣченіи вышеупомянутыхъ рабочихъ поселянъ, сверхъ того, нужно соображаться съ особыми изложенными для нихъ правилами въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію. (См. это росписаніе).

## Кровотеченія.

**Опредѣленіе.** Кровотеченія суть уклоненія крови отъ естественнаго своего пути, обнаруживающіяся истеченіемъ ея изъ сосудовъ внутрь, или внѣ тѣла.

**Раздѣленіе.** Изъ этого видно, что кровотеченія бываютъ двоякаго рода: 1) *внутреннія*, когда кровь, выступая изъ своихъ сосудовъ, изливается въ какую либо полость тѣла, или разливается по сосѣдней клетчатой плевѣ, и 2) *наружныя*, когда кровь вытекаетъ изъ нихъ чрезъ разныя отверстія тѣла; послѣднія случаются наичаще, и потому подлежатъ описанію. Кровотеченія наружныя раздѣляются по тѣмъ частямъ тѣла, изъ которыхъ течетъ кровь. Но какъ всѣ части тѣла, какого бы онѣ свойства ни были, подвержены свободнымъ или невольнымъ истеченіямъ крови, какъ-то: носъ, горло, дѣтородныя части обоихъ половъ, геморoidalные сосуды, желудокъ, кишки, кровезовратныя (вены) и кровобіющіеся (артеріи) сосуды, луночки вырванныхъ зубовъ, раны, даже глаза, уши, зубы, десны, части рта, сосцы, пупокъ, пахи, подмышки, пальцы конечностей и самыя конечности, (эти случаи довольно рѣдки, и потеря крови въ этихъ кровотеченияхъ вообще не столь опасна) то и кровотечения, по различію этихъ частей,

получаютъ различныя соимянныя имъ названія, напр. носовое, горловое, (кровохарганіе) маточное, мочепузырное, геморoidalное (геморрой) и т. п.

**Причины.** 1) *Волненіе крови*, усиленное ея обращеніе, какъ-то бываетъ при лихорадкахъ, горячкахъ, воспаленіяхъ, при полнокровіи, разгоряченіи тѣла спиртными напитками, жаромъ въ банѣ, тѣлеснымъ движеніемъ, бѣгомъ, пляскою (атлеты или бойцы, скороходы, носильщики, брючники и бурлаки отъ напряженія мышцъ, особенно груди и живота, при сильномъ ихъ тѣлдвиженіи, часто подвергаются кровотеченіямъ); при встревоженіи человѣка отъ радости, гнѣва, испуга, огорченій. 2) *Препятствуемый проходъ крови чрезъ какое либо мѣсто*; такъ, у чахотныхъ дѣтей, при несвободномъ проходѣ крови чрезъ грудь, она часто течетъ изъ носа, а потомъ изъ легкихъ; такъ почечуй, мѣсячное кровотеченіе бросаются на легкія, желудокъ, мочевой пузырь и производятъ кровохарганіе, кровавую рвоту, испражненіе кровавой мочи; наконецъ 3) кровотеченіе зависитъ отъ слабости тѣла, порчи и разжиженія крови, которая просачивается чрезъ стѣнки своихъ сосудовъ, какъ бы чрезъ тряпку; такъ течетъ кровь въ цынгѣ изъ десенъ, и разливается пятнами подъ кожею.

Сущность состоитъ или въ расширеніи сосудовъ, или въ ихъ разрывѣ при возвышенной ихъ раздражительности.

Распознаваніе кровотеченій отъ другихъ болѣзней очевидно.

**Предсказаніе** въ кровотеченіяхъ зависитъ отъ быстроты и количества истекшей крови; быстрое и обильное кровотеченіе можетъ мгновенно убить человѣка, какъ то случается при разрывѣ сердца, большихъ сосудовъ. Умѣренное, тихое, но часто повторяющееся кровотеченіе влечетъ за собою блѣдность, слабость, водянку. Но кровотеченіе при полнокровіи, воспаленіи, въ горячкахъ и вообще при волненіи крови, бываетъ полезно и замѣняетъ кровопусканіе.

**Лѣченіе** діететическое въ кровотеченія требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Имѣя въ виду, что *кровотеченія* не только не всегда бываютъ опасны, но часто и спасительны, въ особенности, когда они бываютъ критическія, что часто случается въ лихорадкахъ,—надлежитъ очень беречься ихъ останавливать. Равнымъ образомъ и *ни въ какихъ обстоятельствахъ не должно ихъ останавливать, лишь бы они не были такъ сильны, чтобъ жизнь больного могла подвергнуться опасности.* 2) *Въ небольшихъ кровотеченіяхъ*, изъ какой бы части они ни происходили, не должно *тотчасъ приступать къ употребленію лѣкарствъ вяжущихъ и сжимающихъ*; отъ этого можетъ произойти воспаленіе мозга или другая какая либо опасная болѣзнь, которую кровотеченіе могло бы отвратить. 3) *Слабый пульсъ и обморокъ суть вѣрныя признаки*, что потеря крови уже чрезмѣрна, и потому *должно стараться остановить ее*, но за всѣмъ тѣмъ не иначе прибѣгать къ употребленію средствъ вяжущихъ и сжимающихъ, какъ только въ самыхъ необходимыхъ случаяхъ, или когда жизнь больного



будеть находиться въ опасности. 4) *Кровотеченія періодическія*, въ какой бы части тѣла они ни случились, не должно *останавливать*, потому что они, какъ усилія природы для облегченія самой себя, считаются благодѣтельными, и нерѣдко смертельныя болѣзни бывають слѣдствіемъ задержанія ихъ. Но иногда бываетъ нужно умѣрить силу ихъ, и въ такомъ случаѣ требуется большая предосторожность. 5) Для больного, *одержимаго* кровотеченіемъ, нужны и полезны совершенное спокойствіе душевное и тѣлесное, *прохладное содержаніе* въ комнатѣ, *приличное положеніе* въ постели, *тощая*, почти голодная *дѣта*, *молочная*, но не мясная пища, *холодная вода съ кислымъ сокомъ для питья*. 6) *Кровотеченія*, происходящія отъ слабости тѣла, порчи и *разжиженія крови*, просачивающейся чрезъ стѣнки сосудовъ, какъ бы чрезъ тряпку, *требуетъ соблюденія правилъ*, изложенныхъ въ *діететическомъ мнѣніи цынги*. 7) Въ кровотеченіяхъ: носовомъ, кровохарканіи, гемороѣ, маточномъ и мочепузырномъ должно *руководствоваться правилами*, въ каждомъ изъ нихъ *особо изложенными*.

Лѣченіе существенное требуетъ при всякомъ кровотеченіи приглашенія врача, а тѣмъ болѣе, если оно уже повторялось не однажды и причинило блѣдность и слабость въ тѣлѣ; за немѣніемъ же его по близости должно ограничиваться употребленіемъ тѣхъ простыхъ средствъ, какія показаны противъ каждаго кровотеченія въ особенности. Наичаще случающіяся кровотеченія, подлежащія описанію, суть: 1) *носовое*, 2) *горловое кровохарканіе*, 3) *гемороидальное — гемороѣй*.

## Кровотеченіе носовое.

**Признаки.** Кровотеченію изъ носа часто предшествуютъ: тяжесть и боль головы, шумъ въ ушахъ, потемнѣніе или искры въ глазахъ, жаръ и щебетаніе въ ноздряхъ, и потомъ прекращаются съ появленіемъ кровотеченія изъ носа, которое притомъ и само по себѣ останавливается. Это кровотеченіе вообще происходитъ при полнокровіи въ головѣ, случается чаще у дѣтей и юношей, имѣющихъ узкую сжатую грудь, а потому подверженныхъ несвободному обращенію крови въ легкихъ, приливу ея къ головѣ, гдѣ она скопляется, а потомъ излишекъ ея истекаетъ чрезъ носъ. Слѣдовательно здѣсь кровотеченіе изъ носа есть благодѣтельное усиліе природы, внутренняго нашего врача, меньшимъ зломъ предотвратитъ большее; также благотворно бываетъ кровотеченіе изъ носа и при сильномъ судорожномъ кашлѣ у дѣтей, кори, прорѣзыванія зубовъ, воспаленіи въ головѣ; далѣе, кровотеченіе изъ носа бываетъ слѣдствіемъ остановленнаго гемороѣя, мѣсячнаго очищенія, раздраженія въ животѣ глистами, разгоряченія тѣла, простуды и проч.

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) Вообще не должно *торопиться остановленіемъ кровотечения изъ носа*, если отъ него не замѣчается явнаго вреда, блѣдности,

головокруженія, звона въ ушахъ, обморока и если, напротивъ того, проходитъ тяжесть и боль головы: здѣсь неумѣстное остановленіе кровотеченія можетъ быть причиною слѣпоты, глухоты, воспаленія въ мозгѣ, удара, паралича. Но когда больной начинаетъ блѣднѣть, получаетъ головокруженіе, падаетъ въ обморокъ, имѣетъ слабый, малый пульсъ, холодныя руки, страдаетъ цингою и очевидно слабъ, то кровотеченіе изъ носа нужно остановить. 2) Стараться, чтобы *больной былъ совершенно спокоенъ* какъ тѣломъ, такъ и духомъ. 3) *Воздерживать его отъ крѣпкихъ напитковъ, острой разгорячающей и раздражающей пищи*, которая должна быть только изъ царства растительнаго, а питье изъ воды ключевой, одной или съ кислымъ сокомъ. 4) Когда кровь будетъ остановлена, то больному нужно спокойствіе и *выгоднѣйшее положеніе*, онъ не долженъ *прикасаться къ своему носу*, даже и для отнятія запекшейся на немъ крови; корпю или другое что, воткнутое въ его ноздри, онъ долженъ оставить въ покоѣ и дожидаться, пока она сама отвалится, *голову* свою онъ долженъ *держатъ* какъ можно *выше*. 5) *Подверженные частымъ кровотеченіямъ изъ носа*, въ предупрежденіе ихъ, *должны часто купать ноги въ теплой водѣ и держать ихъ въ теплотѣ и сухости*. Они не должны носить ничего узкаго около шеи и *содержать себя болѣе въ прямомъ положеніи, также беречься смотрѣть на что нибудь поворота голову*. Если они полнокровны, то должны продолжать растительную діету и отъ времени до времени принимать *прохлаждающія слабительныя* (№№ 97, 99, 99, 100). 6) Если же носовое кровотеченіе произошло отъ слабости и разжиженія крови, тогда, напротивъ, діета должна быть самая питательная: бульоны, супы и похлебки, студени, саговая каша и все, что показано въ діететическомъ лѣченіи цинги.

Лѣченіе существенное требуетъ приглашенія врача, а за неимѣніемъ его по близости должно приступить къ слѣдующему простому пособию.

Для остановленія кровотеченія изъ носа, велѣть больному сидѣть наклонивъ голову къ груди, чтобы кровь не потекла въ гортань или горло, и не причинила кашля, тошноты и рвоты; ноги его и руки должно положить въ тепловатую какъ парное молоко воду, сдѣлать ему перевязки на рукахъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ дѣлаютъ ихъ, когда пускаютъ кровь. Эти повязки стянуть такъ же, какъ и при кровопусканіи. Потомъ надлежитъ ослабить ихъ по мѣрѣ уменьшенія кровотеченія и совсѣмъ отнять, какъ скоро оно прекратится. Во время кровотеченія, если руки не въ ваннѣ, то должно поднять ихъ къ верху такъ, чтобы ладонями охватить затылокъ; при этомъ оказываютъ пользу *опрыскиваніе и обмываніе лица холодною водою, стягиваніе и впрыскиваніе въ носъ* холодной воды простой, или *смѣшанной съ уксузомъ, малостью спирта или водки, отвара дубовой и ивовой корки, жеваніе* куска дерева, *пробки, бумаги, холодныя примочки на всю голову, также къ дѣтороднымъ частямъ, горчичникъ на затылокъ, хртновникъ на*

переднее плечо у кисти руки. Простолюдины, при сильномъ кровотеченіи изъ носа, даютъ въ каждую руку по вѣлочу и по куску мѣла и вѣлятъ сильнѣе стиснуть кулаки; владутъ также бумажку или дробинку подъ языкъ, или наконецъ берутъ замѣнутый замогъ и даютъ крови капать сквозь душку его. Иногда *корпня*, вложенная въ носъ, останавливаетъ носовое кровотеченіе, нужно только, чтобы она была довольно велика, могла совершенно наполнять собою внутренность ноздри, и не иначе какъ съ силою войти въ нее. Въмѣсто корпни съ успѣхомъ можно употребить *кусочекъ грецкой губки*, припаровленный къ величинѣ кровоточивой ноздри. Въ крайности нужно вложить въ носъ *свертокъ корпни*, или *кусочекъ губки, смоченный крепкимъ виннымъ спиртомъ, либо водкою*, также *синимъ купоросомъ, распущеннымъ въ водкѣ*. Какъ скоро и это будетъ безуспѣшно, тогда, взявъ *яичный блокъ* и сбивъ его хорошенько, смочить имъ корпійный свертокъ, который, обсыпавъ порошкомъ, состоящимъ изъ равныхъ частей *сахара, квасцовъ* и синяго купороса, вложить въ ту ноздрю, изъ которой течетъ кровь. Въ кровотеченіи, какъ бы оно сильно и опасно ни было, главнымъ останавливающимъ его дѣйствіемъ, помощію этихъ средствъ, есть сжатіе, имѣющее сильное давленіе на отверстие устья кровеноснаго сосуда. Внутрь больному давать *воду съ уксусомъ* и съ *кремортартаромъ*, полагая чайную ложечку кремортартара на стабанъ воды, также *селитру* (№ 100).

## Кровохарканіе.

**О п р е д ѣ л е н і е.** Кровохарканіе есть изверженіе крови ртомъ, сопровождаемое кашлемъ, или безъ кашля, только при харканіи или плеваніи; въ первомъ случаѣ кровь вытекаетъ изъ легкихъ, а во второмъ изъ гортани, горла, рта, носа.

**П р и з н а к и.** Кровохарканіе имѣетъ разныя степени. Въ легкой степени, безъ всякихъ предшешихъ припадковъ въ груди, вдругъ при кашлѣ съ харотиною выходитъ кровь въ небольшомъ количествѣ, а потомъ скоро кровохарканіе прекращается, не оставляя послѣ себя никакихъ припадковъ ни въ груди, ни вообще въ тѣлѣ больного. Сильная степень отличается тѣмъ, что больной, еще до появленія кровохарканія, чувствуетъ соленый вкусъ во рту, щекотаніе въ горлѣ и груди, сухой кашель, перхоту, ознобъ, тяжесть въ груди, давленіе, потомъ появляется кашель съ кровью, красною, черною, пѣнистою, густою, въ разномъ количествѣ — отъ столовой ложки, до чайной чашки и болѣе. причемъ замѣчается у больного больное лице, скорый неправильный пульсъ, несвободное дыханіе; кровохарканіе продолжается  $\frac{1}{2}$ —1 часъ, потомъ прекращается и опять возвращается чрезъ нѣсколько часовъ; впрочемъ и по прекращеніи кровохарканія остается одышка, перхота, сухой кашель, тяжесть въ груди. Въ высшей степени кровохарканія, больной чувствуетъ тоску, стѣсненіе въ груди, имѣетъ трудное дыха-

ніе, холодныя руки, тѣло его обливается холоднымъ потомъ, съ кашлемъ извергается чистая кровь; не смотря на прекратившееся на время кровохарканіе, сильныя грудныя припадки не проходятъ; при этомъ вообще замѣчается чахотное устройство груди.

**Причины внутреннія** (предрасполагающія): особое, нѣжное тѣлосложеніе, имѣющее длинную шею, узкую грудь, частое кровотеченіе въ младенчествѣ, сокрытіе гемороя у мужчинъ и мѣсячнаго очищенія у женщинъ, также кори на легкія, запущенное привычное кровопусканіе, полнобровіе, цынга, воспаленіе легкіхъ и чахотка.

**Причины внѣшнія**, производящія кровохарканіе: бѣгъ, загонъ, (у свороходовъ); сидячее полусогбенное положеніе тѣла (у сапожниковъ, башмачниковъ и портныхъ, у швей, вышивальщицъ, кружевницъ, штопальницъ, чулочниковъ, чулочницъ); частый крикъ, громкое чтеніе, декламация, пѣніе (у пѣвцовъ, чтецовъ на распѣвъ, проповѣдниковъ, торговцевъ и торговобъ); излишнее употребленіе спиртныхъ напитковъ; страсти, особенно гнѣвъ; горестъ, страхъ, несчастная любовь, вѣшній зной (лѣтомъ въ банѣ), игра на духовыхъ инструментахъ, сотрясеніе груди отъ ударовъ, толчковъ; сквозныя раны груди; вдыханіе испорченнаго воздуха (у кожевниковъ, очищающихъ и глядящихъ кожи послѣ дубленія) и острыхъ газовъ; жидкій разрѣженный воздухъ, напр. огонь (у ремесленниковъ въ стеклянныхъ заводахъ, кузницахъ и т. п.), или по высотѣ мѣста у тѣхъ, которые восходятъ на вершины высокихъ горъ.

Сущность въ кровохарканіи кровью алою, иногда какъ бы пѣнящеюся, состоитъ въ излишней раздражительности страдающей части и излишне окисленной крови, а въ кровохарканіи кровію болѣе или мѣнѣе темноватою, напротивъ, въ недостаткѣ раздражительности страдающей части и въ недостаточномъ окисленіи крови.

**Распознаваніе** по вышесказаннымъ признакамъ очень легко и удобно. Кровохарканіе можетъ быть смѣшано съ кровотеченіемъ изъ зѣва и изъ заднихъ носовыхъ отверстій, но и въ этомъ случаѣ распознаваніе *не трудно*: стоитъ только обратить надлежащее вниманіе на зѣвъ и на носовыя полости.

**Предсказаніе.** Кровохарканіе вообще очень важная болѣзнь, но не сама по себѣ, а по своимъ послѣдствіямъ. Количество отхаркиваемой крови ничего особеннаго не значитъ, главное дѣло состоитъ въ причинѣ кровохарканія; больной безопасно можетъ выхаркивать кровь чашками, если только его грудь хорошо устроена и кровохарканіе зависитъ отъ гемороя, мѣсячнаго очищенія, запущенной привычки къ кровопусканію; но при чахотномъ расположеніи тѣла и небольшое кровохарканіе можетъ причинить смерть — воспаленіемъ легкіхъ, а потомъ чахоткою. Впрочемъ изліяніе крови въ легкія въ большемъ количествѣ можетъ вдругъ задушить больного. Свѣтлоокрасный цвѣтъ жидкой крови означаетъ свѣжее, недавнее ея отдѣленіе изъ легочныхъ сосудовъ; но темная, черная, густая, спекшаяся кровь показываетъ,

что она, излившись изъ сосудовъ, долго оставалась въ легкихъ. Кровохарканіе въ воспалительныхъ болѣзняхъ, какъ то: воспаленіи легкихъ, въ колотѣхъ и др., бываетъ хорошимъ признакомъ; но въ водянкѣ, цынгѣ и чахоткѣ, напротивъ, означаетъ опасность; не менѣе того бываетъ опасно кровохарканіе, когда оно случается послѣ продолжительной болѣзни и бываетъ упорно.

**Исходы.** Въ *здоровье* удобнѣе переходитъ кровохарканіе темноватою густою застоявшеюся въ легкихъ, чѣмъ свѣтлоокрасною жидкою, кровію. Въ *другія болѣзни*, какъ-то: въ первомъ случаѣ въ удушье, чахотку, а въ послѣднемъ въ изнурительную лихорадку, въ воспаленіе и нагноеніе. *Смертью* обанчивается при посредствѣ этихъ болѣзней.

**Лѣчение** діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) *Больнаго* должно *содержать* такъ, чтобы онъ былъ, сколько возможно, *спокоенъ* духомъ и тѣломъ, и до того *молчаливъ*, что говорилъ бы только о самомъ необходимомъ, и то шепотомъ, либо писалъ бы на бумагѣ, и то кратко. При этомъ стараться развеселять его и удалять отъ него все то, что можетъ приводить его въ страхъ, огорченіе, печаль и уныніе; какъ вокругъ его такъ и въ сосѣдствѣ нужно, чтобы было тихо. *Въ комнатѣ* его должно быть *полутемно* и *прохладно*, потому что все, что можетъ разгорячать тѣло и усиливать кругообращеніе крови, умножаетъ опасность, слѣдовательно, тѣмъ болѣе надлежитъ ему *воздержаться отъ всякаго крѣпкаго напитка*. 2) *Положеніе* его въ постели должно быть *полусидячее*, съ *наклоненіемъ головы впередъ*. 3) *Пить* ему всего лучше *холодную воду съ кислымъ сокомъ*, подслащенную медомъ, сахаромъ, сиропомъ вишневымъ или малиновымъ, либо *молоко, истой ячмыхъ крупъ, сыворотку*, которыя также должны быть *холодными*. 4) *Пища* его должна быть *приятная, легкая и прохлаждающая*, какъ-то: жидкая молочная каша, ячменная каша, хлѣбныя похлебки, уха, печенныя и варенныя яблоки, черносливъ, рѣпа, свекла и т. п. 5) Какъ скоро кровохарканіе прекратилось при соблюденіи этихъ діететическихъ правилъ, должно начинать давать больному кашу изъ наилучшаго сарачинскаго пшена или ячменя. Сначала онъ можетъ употреблять эту пищу два раза въ день, потомъ три, а наконецъ четыре, и между ними пить молоко. Этотъ образъ жизни онъ долженъ продолжать три или четыре недѣли, и какъ скоро онъ почувствуетъ въ себѣ нѣсколько силъ, долженъ пользоваться перемѣною воздуха, ходить въ поле. При этомъ ему надлежитъ стараться избѣгать излишняго холода и неумѣренной теплоты, воздерживаться очень долгое время отъ вина и отъ всякихъ квашеныхъ напитковъ, однимъ словомъ — наблюдать строжайшую діету, превышающую пользою своею всѣ лѣкарства, и имѣть тѣлодвиженіе, соразмѣрное его силамъ; равнымъ образомъ и *подверженные частымъ возвратамъ этой болѣзни должны избѣгать всякаго излишества, употреблять пищу легкую, молочную и растительную, особенно беречься сильныхъ напращеній тѣлесныхъ и душевныхъ, т. е. не увлекаться трудными*

*работами* и живыми *страстями* или порывами души. 6) Чтожь касается до вышеозначенныхъ рабочихъ поселянъ, подверженныхъ этой болѣзни, какъ-то: скороходовъ, сапожниковъ, башмачниковъ, портныхъ, швей, вышивальщицъ, кружевницъ, штопальщицъ, чулочниковъ и чулочницъ, кожевниковъ, равно какъ и пѣвцовъ, чтецовъ на распѣвъ, проповѣдниковъ, торговцевъ и торговокъ, то для нихъ, независимо отъ этого, изложены особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лѣченіе существенное, по важности болѣзни, требуетъ приглашенія врача, а за неимѣніемъ его по близости можетъ быть полезно слѣдующее ограниченное простое пособіе. Для свободного испражненія нпзомъ полезно ставить промывательное, глистирь (№ 95), прохлаждающія слабительныя изъ *огуречнаго разсола* (№№ 7 и 128), *грутопосоленнаго кваса* (№ 129) и др. (№№ 97, 98, 99 и 100), *льняное* и *касторовое масло* (№ 101). Иногда въ этомъ случаѣ скоро помогаетъ *поваренная соль*, которую, въ порошокъ чрезъ каждую  $\frac{1}{4}$  часа, всыпають въ ротъ больному по чайной ложкѣ, и заставляютъ его проглатывать съ водою. Если этого недостаточно и кровь течетъ сильно, то нужно сдѣлать *перевязки на рукахъ* точно также, какъ сказано объ нихъ въ лѣченіи кровотеченія носоваго; *ноги же по самыя колѣны держатъ въ теплой водѣ*. Если и этихъ средствъ недостаточно, и между тѣмъ у больного замѣчается жаръ, жажда, тоска, тяжесть въ груди, полный твердый пульсъ, словомъ лихорадочное или горячечное состояніе, при которомъ кровохарканіе въ теченіе 1—2 часовъ не унимается, то необходимо назначить *кровопусканіе* изъ вены руки до 3 обыкновенныхъ чайныхъ чашекъ и давать по  $\frac{1}{4}$  золотн. *селитры*, три или четыре раза въ день въ рюмкѣ обыкновеннаго питья, особенно если кровохарканіе появляется у брѣзгаго, молодаго, полнокровнаго человѣка, послѣ прекращенія другаго кровотеченія (изъ носа, гемороя, мѣсячнаго очищенія у женщинъ, запущенной привычки къ кровопусканію), послѣ разгорѣченія тѣла бѣгомъ, скорою ѣздою, употребленіемъ спиртныхъ напитковъ, удара въ грудь, паденія съ высоты, раздавленія груди бревномъ, телѣгою, кулемъ муки, овса, обрушившеюся землею и т. п. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, если недостаточно будетъ для остановленія кровохарканія одного кровопусканія, можно назначить повторить его и потомъ сверхъ того припустить *пнявицы* къ груди, числомъ до 21; за неимѣніемъ ихъ полезны и *рожки*. Но если больной слабаго и рыхлаго (дряблага) тѣлосложенія, тучень, или чахоточень, или у него замѣчается блѣдное лицо, слабый пульсъ, холодныя руки и ноги, частый кашель и постоянная перхота, если нѣтъ признаковъ лихорадочнаго или горячечнаго состоянія и кровохарканіе произошло не въ слѣдствіе ушиба груди, — то кровопусканіе назначать не слѣдуетъ, а должно *растирать* руки и ноги *суконою щеткою*, прикладывать къ нимъ *горчичники* (№№ 88, 89 и 90), *горячіе кирпичи, кувшинны* съ *горячею водою*, и покрывать *холодными примочками* грудь, которая, равно какъ

и голова, должны быть открыты и объаты самымъ холоднымъ воздухомъ, чтобы чрезъ то подать облегченіе и помощь ранѣ кровоточиваго сосуда; холодный воздухъ, прошедшій въ легкое, останавливаетъ кровотеченіе его точно также, какъ и холодная вода останавливаетъ теченіе крови изъ руки, опущенной въ оную, когда будетъ открытъ одинъ изъ ея кровяныхъ сосудовъ. Въ крайнемъ случаѣ можно давать *квасцовую вяжущую сыворотку* (№ 204), *отваръ коры ивы* (№ 43), *дуба* (№ 45) и *жины* (№ 47), *кисляя капли* (галлеровъ элексиръ) по 15-ти и 20-ти въ рюмкѣ воды 3 и 4 раза въ день. Для достаточныхъ людей въ этомъ случаѣ хорошее лѣкарство составляетъ *розовая приправа* (№ 245). Ее даютъ три или четыре раза въ день по 7 золотн. въ свѣжемъ молокѣ.

Примѣч. Но не должно вдругъ останавливать кровохарканіе, какъ всѣ другія кровотеченія, посредствомъ этихъ вяжущихъ средствъ, а только тогда, когда оно очень сильно, приводитъ больного въ слабость и подвергаетъ жизнь его опасности; въ противномъ случаѣ отъ остановки можетъ быть больше вреда, чѣмъ пользы.

Кровохарканіе, разъ появившееся, легко возвращается, притомъ оно часто оставляетъ послѣ себя воспаленіе, которое съ своей стороны опять причиняетъ другія болѣзни: нарывъ, бугорки въ легкихъ. По этому, если по прекращеніи кровохарканія продолжается боль въ груди, жаръ въ тѣлѣ, сухой кашель, то нужно продолжать сказанное содержаніе больного и противувоспалительное лѣченіе, — *пѣвицы* къ груди, *мушку*; внутрь *селитру*, *прохлаждающія слабительныя*; а когда исчезнутъ всѣ признаки страданія въ груди, то, для освобожденія легкихъ отъ остатковъ излившейся въ нихъ крови, больной долженъ пить *сладкую сыворотку*, чистую, свѣжую мягкую *ключевую воду* съ молокомъ козы или ослицы, гдѣ оно есть. По прошествіи трехъ недѣль послѣ кровохарканія, больного, не имѣющаго уже ни кашля, ни перхоты, ни тяжести въ груди, дышущаго притомъ свободно, можно считать безопаснымъ отъ чахотки, но не отъ возврата кровохарканія, а потому онъ еще долго долженъ избѣгать всего того, что разгорячаетъ тѣло, ускоряетъ дыханіе, производитъ одышку.

Шлеваніе кровью безопасно: здѣсь кровь истекаетъ изъ десенъ, зубовъ, носа, глотки безъ кашля, и зависитъ отъ порчи зуба, нарыва на деснахъ, щекахъ, гемороя, цынги, употребленія ртути; кровь наичаще отдѣляется по утрамъ. Здѣсь нужно удалить причину кровоплеванія, которое легко проходитъ отъ полосканья рта *настоямъ шалфея съ уксуомъ*, *отваромъ дубовой коры съ квасцами*, *хрѣновымъ виномъ*. При лѣченіи кровохарканія у рабочихъ вышеупомянутыхъ поселянъ, подверженныхъ оному, непременно нужно соображаться съ правилами, особо для нихъ изложенными въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію. (См. это росписаніе).

## Геморой (почечуй\*)).

**О П Р Е Д Ъ Л Е Н І Е.** Геморой обнаруживается тяжестью и болью въ поясницѣ и въ затылкѣ, запорами на низъ, напряженіемъ въ заднемъ проходѣ, образованіемъ въ немъ шишекъ, истеченіемъ крови предъ испражненіемъ на низъ, а иногда и безъ кровотечения.

**Р а з д ѣ л е н і е.** Изъ даннаго опредѣленія видно, что геморой бываетъ: 1) *открытый* (текучій), обнаруживающійся истеченіемъ крови низомъ, и 2) *закрытый* (внутренній), не обнаруживающійся кровотеченіемъ низомъ, а чувствомъ полноты, напряженія, распиранія и раздуванія геморoidalныхъ сосудовъ.

**П р и з н а к и** открытаго текучаго гемороа обозначаются разными, сначала внутренними, а потомъ наружными, явленіями. Внутреннія явленія суть разныя страданія живота, а наружныя—шишки около задняго прохода, теченіе изъ него крови, а иногда слизи (слизистый геморой). Почечуйное кровотеченіе есть какъ бы переломъ, рѣшеніе внутренняго почечуя, который однако, хотя чрезъ то и облегчаетъ больного, но совсѣмъ не проходитъ, и потому кровотеченіе опять появляется чрезъ нѣсколько времени, и притомъ нерѣдко въ правильные сроки (правильный, періодичный геморой), помѣсячно, по третямъ года, словомъ, періодически, или же и безъ всякаго порядка (неправильный, не періодичный геморой).

**П р и з н а к и** закрытаго (внутренняго) гемороа: частая боль въ поясницѣ, крестцѣ, животѣ, затылкѣ, бедрахъ въ видѣ лома, либо стрѣльбы, чувство полноты, тяжести въ животѣ, полноты и давленія въ заднемъ проходѣ; рѣдкое, неправильное испражненіе жесткимъ, сухимъ каломъ въ видѣ катышковъ или шариковъ; жиленье, натуга, жженіе, зудъ въ

---

\*) Д-ръ Макензи въ своемъ сочиненіи подъ заглавіемъ «Нѣтъ болѣе гемороа» совершенно отвергаетъ эту болѣзнь, говоря, что геморой есть ничто иное, какъ мѣстное страданіе прямой (заднепроходней) кишки отъ мелкихъ глисть (аскариды), производящихъ въ ней раздраженіе, либо въ видѣ шишекъ съ періодическимъ кровавистымъ отдѣленіемъ (открытый геморой) и безъ нихъ (закрытый геморой), либо въ видѣ язвенокъ—рытнеговъ (фистулъ) съ слизистымъ отдѣленіемъ (слизистый геморой) и излѣчивается ихъ промываніемъ холодною водою и ставленіемъ клистировъ изъ холодной воды вскорѣ послѣ испражненій, когда аскариды изъ верхней части прямой кишки опускаются внизъ къ заднему проходу, причемъ клистиръ больнымъ задерживается въ себѣ на нѣсколько минутъ. Отъ дѣйствія холодной воды въ клистирѣ аскариды, онемѣвая, отпадаютъ отъ стѣнъ прямой кишки и выходятъ всѣ живыя съ клистиромъ вонъ. Въ этомъ состоитъ все его лѣченіе гемороа. Для предотвращенія зарожденія аскарідъ вновь въ прямой кишкѣ онъ совѣтуетъ вести правильный и физически-дѣятельный образъ жизни съ удобоваримою и прочно-питательною пищею и питьемъ безъ всякаго излишества и пресыщающей роскоши. Изъ 1000 геморoidalныхъ, пользованныхъ имъ, больныхъ у 999 оказались замѣченные имъ будто бы лично посредствомъ микроскопа аскариды, а у одного слизетеченіе, но не геморoidalное, а перелойнаго свойства.



заднемъ проходѣ; сыпь около прохода, въ промежности, на дѣтородныхъ частяхъ; опухоль и шишки у прохода; частый позывъ къ испусченію мочи, которая притомъ причиняетъ жженіе въ мочевомъ каналѣ и головкѣ уда, истекаетъ съ трудомъ и совсѣмъ задерживается; при этомъ замѣчаются часто приливы крови къ легкимъ (одышка, колотье), къ желудку (тошнота и боль подъ ложечкою), къ печени (боль и напряженіе подъ правымъ подреберьемъ), къ головѣ (боль, особенно въ затылкѣ, тяжесть, круженіе головы, пятна предъ глазами). Всѣ эти признаки означаютъ начало развитія гемороя, который только въ этомъ періодѣ можно иногда излѣчить, или по крайней мѣрѣ ограничить въ дальнѣйшемъ развитіи.

Причины внутреннія (предрасполагающія). Предрасположеніе состоитъ въ наслѣдственномъ (отъ родителей), или врожденномъ (во время беременности происшедшемъ) неправильномъ устройствѣ частей, поражаемыхъ гемороемъ, именно въ излишней растяжимости и слабости кишечныхъ стѣнъ (оболочекъ), въ излишней вмѣстимости ихъ сосудовъ и въ увеличенной или уменьшенной раздражительности. (Это послѣднее условіе служитъ основаніемъ раздѣленію гемороя у многихъ авторовъ на *дѣятельный* и *страдательный*).

Причины внѣшнія (производящія) двухъ родовъ: 1) Однѣ, увеличивая раздражительность и приливъ крови страдающихъ частей живота, производятъ геморой дѣятельный (приливной), нерѣдко сопровождаемый лихорадочнымъ состояніемъ, каковы: сильное раздраженіе задняго прохода верховою жздою; злоупотребленіе спиртныхъ и всякаго рода горячительныхъ напитковъ; непомѣрное раздраженіе половыхъ органовъ, особенно производимое рукоблудіемъ (онанія); по этой причинѣ геморой обнаруживается на 18—17 году и даже ранѣе; — также невоздержанность въ пищѣ и питьѣ, преимущественно отъ острой, пряной, соленой, жирной, мясной пищи, которая, для сваренія, требуя усиленной дѣятельности желудка и кишекъ, раздражаетъ ихъ и производитъ большое притеченіе къ нимъ крови. Этого рода гемороемъ наиболее подвержены городскіе жители, ученые, богатые люди, но поселяне очень рѣдко. 2) Другіе, напротивъ, ослабляя, уменьшая раздражительность страдающихъ частей живота и чрезъ то накопляя въ нихъ притекающую къ нимъ кровь, производятъ страдательный (застойный) геморой, каковы напр.; сидячая жизнь, беременность (особенно въ послѣднихъ мѣсяцахъ, есть самая сильная причина), пресыщеніе пищею и питьемъ, разслабляющими кишечный каналъ, каковы всѣ вещества студенистыя, слизистыя, мучнистыя, масленичныя; завалы и затвердѣнія печени, препятствующія отливу крови отъ страдающихъ частей; перетягиваніе живота въ верхнихъ частяхъ его; продолжительное сидѣніе на печахъ и другихъ нагрѣтыхъ мѣстахъ. Этого рода гемороемъ подвержены бываютъ нерѣдко поселяне, особенно рабочіе, какъ-то: портные, сапожники и башмачники, фабричныя, работающіе сидя, тор-

гаши, сидящіе въ лавкахъ и прилавкахъ, пряжи, мотальщицы, швен, вышивальщицы, кружевницы, штопальщицы, ткачи и ткачихи.

Сущность почечуя во всякомъ случаѣ состоитъ въ излишнемъ накопленіи крови въ брюшныхъ сосудахъ и особенно въ кровезвратныхъ (венахъ) прямой (заднепроходной) кишки, въ воротной венѣ и вообще въ венахъ кишечныхъ. Это брюшное полнокроеіе есть слѣдствіе съ одной стороны большаго прилива крови къ брюшнымъ внутренностямъ (геморой дѣятельный, приливной), а съ другой — затрудненнаго выхода крови изъ брюшныхъ сосудовъ (геморой страдательный, застойный). Такимъ образомъ усиленный приливъ и препятствуемый отливъ крови производятъ брюшное полнокроеіе или почечуй; кровь, съ трудомъ вмѣщающаяся въ брюшныхъ сосудахъ, расширяетъ ихъ, бросается къ разнымъ органамъ и причиняетъ многія болѣзни, а именно: мѣстныя — припухлость прямой кишки, расширение ея (почечуйныхъ) венъ, кровотеченіе изъ задняго прохода (которое, уменьшая брюшное полнокроеіе, чрезъ то самое облегчаетъ и почечуйнаго страдальца), запоры на низъ, разстройство пищеваренія, отсутствіе аппетита, развитіе кислотъ въ желудкѣ, а чрезъ то боль и судороги въ немъ, рѣзь въ животѣ, поносъ, истеченіе слизи изъ задняго прохода (слизистый почечуй) и изъ мочеваго пузыря. (Общія болѣзни, могущія происходить отъ почечуя, слѣдующія: ипохондрія, судороги, дурнота, головокруженіе, обмороки, слабость зрѣнія, пострѣлъ, параличъ, усиленное біеніе сердца, удушье, кровохарканіе, кровотеченіе изъ матки, мочеваго пузыря (кровавая моча), носа, кровавая рвота, бѣли, разныя упорныя сыпи, особенно лишайныя, на крестцѣ, около задняго прохода, на дѣтородныхъ частяхъ, язвы, притомъ застоявшаяся въ животѣ кровь необходимо портится и дѣлается острою, причиняя сказанныя сыпи и нестерпимый зудъ въ заднемъ проходѣ, въ промежности и даже во всей кожѣ).

Распознаваніе гемороа по свойственнымъ ему признакамъ открытаго *очевидно*, а закрытаго, при соображеніи причинъ и свойствъ болѣзни, *не трудно*.

Предсказаніе относительно опасности жизни *хорошо*. Открытый, текущій геморой самъ по себѣ не опасенъ и даже не всегда можно считать его за болѣзнь, ибо иногда онъ бываетъ полезнѣе, нежели носовое кровотеченіе, и часто предохраняетъ и спасаетъ отъ другихъ болѣзней, такъ напр. въ водянкѣ, простудномъ ревматизмѣ съ ломотою, въ ипохондріи, коликахъ и воспалительныхъ горячкахъ, онъ часто появляется въ видѣ перелома (кризисъ) болѣзни, лишь бы кровотеченіе его не было изнурительно, не бросалось на благороднѣйшіе органы тѣла и не было причиною разныхъ другихъ хроническихъ опасныхъ болѣзней, въ которыхъ однако появленіе его часто уничтожаетъ грозящую опасность и доставляетъ большое облегченіе больнымъ. Относительно продолжительности гемороа предсказаніе зависитъ: 1) отъ его происхожденія, такъ что чѣмъ болѣе онъ происходитъ по силѣ причинъ производящихъ, безъ предрасположенія) тѣмъ предсказаніе лучше, и на-

оборотъ; 2) отъ времени продолженія болѣзни, такъ что чѣмъ она недавнѣе, или новѣе, тѣмъ менѣе можетъ быть продолжительна; вообще же почечуй есть самая продолжительная болѣзнь; разъ появившись, онъ остается уже на всю жизнь больного, излѣчивается же очень рѣдко. и то когда онъ не наслѣдственъ, не врожденъ, и когда его причину можно удалить, а образъ жизни перемѣнить.

Исходы. Въ *здоровье* можетъ переходить только геморой, прошедшій по силѣ причинъ производящихъ, и притомъ, если онъ не застарѣлъ. *Болѣзни*, въ которыя геморой переходитъ, суть: отолстѣнія, отвердѣнія и перерожденія съ послѣдующимъ изъязвленіемъ поражаемыхъ частей; нерѣдко переходитъ онъ въ изнурительныя кровотеченія, подкожную и полостную водянку. *Смертію* оканчивается при посредствѣ какой либо изъ сказанныхъ болѣзней.

Лѣчение діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) *Въ предохраненіе* отъ гемороа должно *совѣтовать* всячески, по мѣрѣ возможности, *избѣгать* вышеозначенныхъ причинъ, *производящихъ* его. 2) *Одержимый* гемороемъ долженъ особенно *пре-стать употреблять вредную для него пищу и горячительныя напитки, избѣгать сидячаго положенія съ наклоненнымъ къ груди тѣломъ, положенными на крестъ ногами, и быть умеренъ въ удовольствованіи плотской похоти. Пища питательная, легкая, состоящая въ хлѣбѣ, молокѣ, въ прохладительныхъ растеніяхъ, напр. вареной рѣпѣ, свеклѣ, моркови и т. п., и супахъ (бульоны, похлебки), а вода, сыворотка, ржаннй, морковный, свекольный отваръ* составляютъ самое приличное *питье* для страдающаго гемороемъ. 3) При этомъ ему должно облегчать кровообращеніе въ животѣ частымъ *движеніемъ тѣломъ, верхомъ, дѣлая это постоянно ежедневно въ извѣстные часы поутру и вечеромъ; а лежа на спинѣ, также въ ваннѣ, постоянно растирать и разминать свой животъ.* 4) Сверхъ того ему нужно заботиться о ежедневномъ по утрамъ свободномъ испраженіи низомъ, при содѣйствіи приличной діеты, а иногда и лѣкарствъ. 5) Имѣя въ виду, что геморoidalное кровотеченіе изъ всѣхъ кровотеченій есть наилучшее и безопаснѣйшее, *не должно спѣшить остановленіемъ его* иначе, какъ увѣрившись, что оно излишне, чрезмѣрно, очень уже продолжительно, изнуряетъ, истощаетъ больного, угрожаетъ причиненіемъ изнурительной лихорадки, чахоткы, худокровности и водянки. При этомъ должно обращать вниманіе на температуръ, возрастъ или лѣта и силы больного, образъ его жизни, потому что потеря крови, по видимому чрезмѣрная и вредная для одного, можетъ быть умеренна и даже полезна для другаго. Если же оно періодическое, приходящее въ опредѣленные сроки, то подверженные этого рода геморою должны имѣть тѣ же предосторожности, какъ и женщины, имѣющія мѣсячныя очищенія; потому что онъ становится для нихъ необходимостію. 6) Для вышеупомянутыхъ рабочихъ поселянъ изложены, независимо отъ этого, особыя (специфическія) правила въ распісаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лѣченіе существенное въ текущемъ открытомъ гемороеѣ не иначе предпринимается, какъ удостовѣрившись, что геморроидальное кровотеченіе излишне чрезмѣрно, изнуряетъ и истощаетъ силы больного, что познается изъ того, когда больной чувствуетъ боли въ спинѣ, а особенно въ нижней части спинной кости, рѣзь въ животѣ, головокруженіе, внутренній жаръ, оцѣпенѣніе и тягость въ ногахъ, неправильность въ пульсѣ и проч. Въ этомъ случаѣ надлежитъ умѣрить его и діететически, и лѣкарствами. Для этого больному можно давать пить *воду, въ которую опущено было раскаленное желѣзо, остывшей красной отвара корокъ: дубовой, ольховой и вятловой* и припаривать теплымъ шишки у прохода, какъ обыкновенно дѣлаетъ простой народъ. Достаточнымъ людямъ пріятнѣйшимъ лѣкарствомъ можетъ служить *розовая приправа* (консерва № 208). Ее даютъ три или четыре раза въ день по 7-ми золотн. въ свѣжемъ молокѣ. Для усиленія ея дѣйствія, послѣ каждаго приема консервы, даютъ еще по чайной ложкѣ *холоднаго настоя розовыхъ цвѣтковъ*, приготовленнаго какъ чай, либо по чайной ложечкѣ *розовой тинктуры*.

Геморроидальное кровотеченіе періодическое, приходящее правильно черезъ мѣсяць или черезъ три недѣли, какъ цѣлебное, останавливать не должно, особенно когда натура сдѣлала къ нему привычку. Лѣчить и останавливать его значитъ тоже, что останавливать и задерживать мѣсячныя очищенія у женщинъ, т. е. дѣлать вредъ, а не пользу. Напротивъ, если это кровяное истеченіе, отъ какихъ либо погрѣшностей въ діетѣ, напр. сильныхъ страстей (страха, ужаса, испуга, и т. п.), простуды скоропостижнымъ холодомъ, употребленія вяжущихъ средствъ и пр., вдругъ остановится, то въ предотвращеніе опасныхъ послѣдствій должно опять возбудить его и открыть. Для этого за пособіемъ слѣдуетъ обратиться къ врачу, а за неимѣніемъ его по близости надлежитъ *посадить* больного *надъ паромъ теплой воды*; въ случаѣ приставить *тлявицы* къ нижней части заднепроходной кишки, вокругъ прохода, или поставить раздражающее промывательное изъ теплаго настоя *цвѣтовъ ромашки съ* распущеннымъ въ немъ *мыломъ и поваренной солью*, а для внутренняго употребленія прибѣгнуть къ тѣмъ же средствамъ, какія обыкновенно употребляются въ закрытомъ или внутреннемъ гемороеѣ. Если все это не поможетъ, то въ слѣдующее срочное время открывающагося гемороя, какъ скоро онъ не откроется, врачи съ пользою назначаютъ кровопусканіе. Въ закрытомъ, внутреннемъ, гемороеѣ наилучшими простыми и безвредными лѣкарствами почитаются отвары *корней пырея* (№ 3), *одуванчика* (№ 1), и *цикоря* (№ 2), (весною свѣжіе соки, выжатые изъ *изъ травъ*), соки рѣпный и морковный, употребляемые какъ тѣ, такъ и другіе въ теченіе 2—3 мѣсяцевъ; *сокъ стлыхъ рябиновыхъ ягодъ* во многихъ мѣстахъ Россіи составляетъ народное лѣкарство, какъ прохлаждающее, слабящее средство, полезное для страдающихъ гемороемъ, имѣющихъ желчное расположеніе и склонныхъ къ запорамъ. Три рюмки сока съ прибавленіемъ мелкаго

сахара, запиваемыя стаканомъ холодной воды, болѣе приносятъ пользы, нежели всѣ слабительныя пилюли и порошки, ни мало между тѣмъ не ослабляя дѣйствіемъ своимъ кишечнаго канала и открывая иногда закрытый геморой. Кто не можетъ пить сока, пусть пьетъ рябинную воду; или, взявъ горсть ягодъ, обварить ихъ кипяткомъ въ чайникѣ, дать нѣсколько времени постоять и употреблять для той же цѣли чашки по двѣ на ночь. Рябинное желе, сваренное съ сахаромъ или съ хорошимъ медомъ, можно прибавлять въ питье, вмѣсто другихъ вареньевъ \*). *Съра съ кремортартаромъ и магнезією* (№ 209) употребляемая въ теченіе 1—2 недѣль; *льняное, касторовое масло* (№ 101), какъ слабительныя, но отнюдь не сабуръ, который усиливаетъ кровообращеніе въ животѣ и насильственно открываетъ почечуйное кровотеченіе. Для достаточныхъ людей и привычныхъ къ правильному употребленію спиртныхъ напитковъ, очень бываетъ полезенъ слѣдующій *сборъ для горькой настойки*, составленный на манеръ трофимовскаго. Взять: горсти лимонной, горсти померанцевой по 5-ти драхмъ, травы волчца буйраваго (card. bened.), травы вахты (trifol. fibr.), травы моршанки (rub. chamaem.), травы розмарина — по 2 драхмы; корня одуванчиковъ (v. tarax.), корня чистяка (v. chelidon.), корня чемерицы (helleb. nig.) по 2 драхмы; корня цытварнаго (v. zedoar.) 4 драхмы; корня ревеня 8 драхмъ; корня горячавки (v. gentian.) 14 драхмъ, корня мыльной травы (v. saponag.) 2 драхмы; александрійскаго листа 10 драхмъ; все, мелко изрубивъ, смѣшать и на весь этотъ сборъ налить простаго хлѣбнаго вина отъ  $\frac{1}{4}$  до  $\frac{1}{2}$  ведра, дать стоять въ легкой теплотѣ, а лѣтомъ всего лучше на солнцѣ, отъ 10-ти до 14-ти дней; потомъ, сливъ жидкость, хорошенько процѣдить и употреблять её по маленькой рюмочкѣ передъ обѣдомъ и ужиномъ, садясь за столъ. Эта настойка очень цѣлебна. Она въ закрытомъ гемороеѣ разбиваетъ застои, направляетъ ихъ къ проходной кишкѣ, понуждаетъ её къ изверженію излишней крови, облегчая чрезъ то поясничныя, затылочные и вообще головныя боли, успокоиваетъ какъ нельзя лучше все тѣло; а въ открытомъ гемороеѣ настойка эта, извергая постоянно скопившіяся геморoidalную кровь и слизи, и постепенно укрѣпляя ослабѣвшую нижнюю часть кишечнаго канала, уничтожаетъ мало по малу и самую болѣзнь, а кромѣ того направляетъ разстроенное пищевареніе, видимо происходящее отъ бездѣйствія пищеварительныхъ органовъ, особенно у ведущихъ сидячую жизнь, освобождаетъ отъ накопленія вѣтровъ, отъ худосочія, отъ изнуренія въ слѣдствіе продолжительныхъ болѣзней, у людей слабыхъ отъ рождения глистовъ и отъ самыхъ (зародившихся уже), глистовъ, даже те семочныхъ (солитера); но для людей не привыкшихъ къ употребленію спиртныхъ напитковъ и полнокровныхъ, горькая эта настойка можетъ быть вредною \*\*). При слабости задняго прохода полезно купанье в

\*) Др. Здр. 1845 г. № 12 стр. 92.

\*\*) Сообщ. Др. Здр. 1838 г. № 40. стр. 316 и 317.

рѣкъ. Сверхъ этого очень полезно, въ теченіе 2—3 мѣсяцевъ, пить ежедневно поутру и ввечеру холодный чай изъ травы и цвѣтовъ тысячелистника по чайной чашкѣ. Этотъ чай очень полезно употреблять холодный по цѣлымъ годамъ, говоритъ Гуффеландъ; но д-ръ Грумъ замѣчаетъ, что при употребленіи такого чая надобно наблюдать и за исправностію испражненія низомъ и пищеваренія. Не слѣдуетъ употреблять этого чая когда сдѣлается очевидное расстройство пищеваренія отъ обремененія желудка, особенно тяжелою пищею, отъ огорченій, или продолжаются такіе запоры на низъ, которые трудно преодолѣваются слабительными и при которыхъ есть очевидное раздраженіе въ брюшныхъ внутренностяхъ; по устраненіи этихъ припадковъ приличною діетой и лѣкарствами продолжать упомянутый чай \*). Если при почечуѣ находятся завалы брюшныхъ внутренностей, то особенно полезны разныя сѣрныя воды: кавказскія, сергіевскія и др., равнымъ образомъ и таковыя же грязи. При лѣченіи вышеупомянутыхъ рабочихъ людей непременно нужно соображаться съ особыми изложенными для нихъ правилами въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію. Въ простонародіи отъ поясничной почечуѣйной боли *«рубятъ витюжъ»*: больной долженъ сутки голодать, потомъ ложится животомъ поперегъ порога, на голую поясницу кладутъ голикъ и рубятъ по немъ тупымъ топоромъ, а больной приговариваетъ: «руби, руби, дѣдушка!»

## Крoвавое мочетеченіе.

**Признаки:** съ мочою испражняется кровь, которая притомъ или очень тѣсно смѣшана съ мочою, часто сообщаетъ ей-темный цвѣтъ, течетъ непрерывно и безъ боли, при стояніи моча отъ нея не отдѣляется, что означаетъ кровотеченіе изъ почекъ, — или же кровь въ мочѣ, выходящая въ маломъ количествѣ, съ жаромъ и болью въ нижнихъ частяхъ живота, раздѣлена не равномѣрно и при стояніи мочи легко и скоро осѣдаетъ на дно сосуда, показывая тѣмъ кровотеченіе изъ мочевого пузыря, либо наконецъ кровь отдѣляется изъ мочевого канала, почти не смѣшиваясь съ мочою, и течетъ по окончаніи мочеиспусканія.

**Причины.** Кровотеченіе изъ почекъ можетъ происходить отъ почечныхъ камней, нарывовъ въ почкахъ, ушибовъ въ почечную сторону, сотрясеній поясницы верховою ѣздою, отъ поднятія большихъ тяжестей, неумѣреннаго совокупленія, излишняго употребленія спиртныхъ напитковъ, неосторожнаго употребленія мочегонныхъ средствъ, шпанскихъ мушекъ, скипидара, мочегоннаго, янтарнаго масла, отъ цыготнаго разрѣшенія крови, старости, отъ остановившагося почечуя и пр. *Пузырное* кровотеченіе бываетъ припадкомъ неправильнаго почечуя, бросившагося на пузырь, мочевого камня, нарывовъ и язвъ въ пузырь. *Мочеканальное* кровотеченіе зависитъ отъ тѣхъ же причинъ, какъ и

\*) Др. Здр. 1838 г. № 43. стр. 333.

пузырное, а сверхъ того оно часто случается при любострастномъ перелоеѣ (гонорей). Нанчаще подвергаются этой болѣзни портные, швеи, вышивальщицы, кружевницы, штопальщицы, чулочники и чулочницы, также фабричные, работающіе сѣдя, торгаши, сѣдящіе въ лавкахъ и прилавкахъ, пряхи и мотальщицы.

**Предсказаніе.** Каждое изъ этихъ кровотеченій *опасно* тѣмъ, что угрожаетъ воспаленіемъ кровоточиваго мѣста, можетъ запрудить кровяными свертками мочевые протоки, задержать мочу, подать поводъ къ происхожденію мочевыхъ камней; особенно же бываетъ опасна эта болѣзнь, когда кровь въ мочѣ смѣшивается съ гнойною и воиючею матеріею, означающею рану въ мочевомъ пузырьѣ. Если же кровавое мочетеченіе происходитъ отъ полнокровія, или, приходя въ опредѣленные сроки (періодически) замѣняетъ чрезъ то мѣсячныя очищенія у женщинъ и геморондальное кровяное истеченіе у мужчинъ, или когда оно случается послѣ сильнаго тѣлодвиженія и другой какою нибудь временной причины, то во всѣхъ этихъ случаяхъ оно не *опасно*, лишь бы не было слишкомъ продолжительно, хотя впрочемъ извѣстно, что въ теченіе многихъ лѣтъ можно имѣть мочу красную, или почти черную, не чувствуя оттого никакого замѣтнаго въ тѣлѣ разстройства.

**Лѣченіе** діететическое почти одинаково какъ и въ гемороеѣ и другихъ кровотеченіяхъ, съ присовокупленіемъ, что: 1) *кто* имѣетъ расположеніе къ кровавой мочѣ или по временамъ бываетъ *подверженъ* ей, тотъ въ предотвращеніе ея *долженъ соблюдать большую діету*, воздерживаться отъ вина, всякаго рода пряностей, особенно отъ лука, чеснока, петрушки, пастернака, сельдерея и спаржи. Онъ не долженъ спать на спинѣ, не слишкомъ укутываться ночью, не пить ни чаю, ни кофе, ни другихъ горячихъ настоевъ и отваровъ въ этомъ родѣ; ему нужно питье холодное. 2) Для вышеозначенныхъ подверженныхъ этой болѣзни рабочихъ поселянъ изложены особыя (специфическія) правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію, съ которыми также нужно непременно соображаться и при существенномъ лѣченіи ихъ отъ этой болѣзни.

**Лѣченіе** существенное при кровотеченіи *изъ почекъ* съ болью, жаромъ, послѣ ушиба поясницы, сотрясенія живота, состоитъ въ приставленіи *пльвимъ* къ сторонѣ почекъ, т. е. къ поясницѣ подъ ребрами близъ спины, число которыхъ должно быть соразмѣрно главной степени болѣзни (6—12—24), и прикладываніи къ почкамъ и поясницѣ *салфетокъ* или *ветошекъ, намоченныхъ холоднымъ уксусомъ съ водою*, либо одною только водою, а къ лобковой или наддѣтордной кости (мѣсто между лядвеями, покрытое волосами) холодный *яичный бѣлокъ, сбитый квасцами*; внутрь употребляется *селитра* въ порошокъ и эмульсіи (№№ 86, 87), *конопляное, маковое и миндальное молоко*. При кровотеченіи *отъ испанскихъ мушекъ* тоже молоко, особенно маговое съ камфорою (№ 135), *питье изъ отвара льняныхъ стѣмянъ, овсяныхъ ячныхъ крупъ, порошки изъ селитры съ кремортартаромъ*

(№ 202), безъ наперсточной травы. *При цынготномъ* кровотеченіи холодное кислое питье, свѣжій воздухъ, противуцынготная діета. Если этихъ средствъ будетъ недостаточно къ излѣченію болѣзни, то должно обратиться за пособіемъ къ врачу.

**З а м ѣ ч.** Маточное кровотеченіе между поселянами бываетъ рѣдко, а чаще въ видѣ его бываетъ усиленное мѣсячное очпщеніе, о чемъ изложено въ своемъ мѣстѣ.

## КЛАССЪ ТРЕТІЙ.

### БОЛѢЗНИ ПИТАНІЯ.

**О п р е д ѣ л е н і е.** Подъ именемъ болѣзней питанія разумѣются тѣ болѣзни, которыя принадлежать собственно къ плототворительной системѣ.

**Р а з д ѣ л е н і е.** Явленія, которыми обнаруживаются эти болѣзни, выражаются собственно: либо увеличеннымъ, либо превратнымъ, либо уменьшеннымъ питаніемъ; поэтому они бываютъ 3-хъ родовъ. 1) Болѣзни излишняго питанія. 2) Болѣзни худокачественнаго питанія. 3) Болѣзни недостаточнаго питанія.

Наичаще случающіяся у поселянъ болѣзни, принадлежащія къ первому порядку, суть: *мясной наростъ, бородавка, мозоль*; во второму: *венерическая болѣзнь, золотуха, шолуди (парши), лишай*, къ третьему: *сухотка*.

### Мясной наростъ.

**О п р е д ѣ л е н і е.** Мясной наростъ есть красная мясистая опухоль, то твердая, то мягкая, различной величины, отъ горошины до куриного яйца, продолговатая или круглая, гладкая или морщиноватая, какъ иногда шелковица.

**Р а з д ѣ л е н і е.** Мясной наростъ бываетъ двухъ родовъ: 1) либо, имѣя на своей верхушкѣ очень тонкую кожицу, сидитъ, или лучше сказать виситъ, какъ плодъ на деревѣ, т. е. на тонкомъ черешкѣ въ видѣ *полипа*, который происходитъ чаще на внутренней, чѣмъ на наружной поверхности тѣла; 2) либо имѣетъ широкое основаніе (*родимья пятна*) и при напряженіи кожи, на которой онъ сидитъ, дѣлается неподвижнымъ.

**П р е д с к а з а н і е.** Пока мясной наростъ не болитъ, то онъ *не опасенъ*; при разгоряченіи тѣла онъ скоро увеличивается и причиняетъ кровотеченіе, которое трудно остановить, если нельзя прижать плотно наростъ; такое кровотеченіе можетъ совсѣмъ изнурить больного, или даже и задушить его (при кровотеченіи изъ носовыхъ полиповъ, когда



кровь изливается въ заднюю полость рта, въ гортань или глотку). Кроме того, мясные наросты начинаютъ часто болѣть, воспаляться, переходить въ нагноеніе и причиняютъ опасныя язвы, похожія на ракъ.

Лѣченіе мясныхъ наростовъ довольно простое: наросты, доступные на наружной поверхности тѣла, сидящіе на тонкомъ хвостикѣ, можно *персвязать* тонкою, навощенною *шелковою ниткою*, которую для того нужно стягивать довольно брѣпко; такая перевязка сжимаетъ кровяные сосуды, идущіе къ наросту, который, не получая питанія, увядаетъ и отваливается; оставшійся кончикъ хвостика можно совсѣмъ истребить, *прижигая его ляписомъ* (адскій камень), взятымъ изъ аптеки по рецепту. Мясные небольшіе наросты, даже плоскіе, имѣющіе широкое основаніе (родимыя пятна), также можно истреблять ляписомъ, которымъ совѣтуютъ прижигать ихъ понемногу, сначала всегда по окружности; прижиганіе повторяется не прежде, какъ по отпаденіи прежняго струпа и при каждомъ прижиганіи кожи всякій разъ приближаться ляписомъ къ срединѣ нароста; вмѣсто ляписа можно употреблять *сюрмяное* масло, которымъ, посредствомъ ваточки, увлажняется окружность нароста. Последнее средство требуетъ большой осторожности, и потому его употреблять можно только подъ надзоромъ врача, которому и вообще нужно предоставить лѣченіе большихъ, внутреннихъ, кровоточивыхъ мясныхъ наростовъ въ носу, горлѣ, маткѣ и ея рукавѣ и проч.

## Бородавка и мозоль.

Бородавка есть небольшой шероховатый круглый безболѣзненный сухой наростъ, или, лучше сказать, выростъ на кожѣ, основывающійся на плотныхъ въ глубинѣ ея волобнахъ, называемыхъ корешками и бывающій чаще на рукахъ, нежели на другихъ частяхъ тѣла.

Раздѣленіе. Бородавка, большею частію, бываетъ двоякаго рода: 1) *съ широкимъ основаніемъ*, состоящимъ изъ многихъ корешковъ, простирающихся въ глубину кожи и 2) *съ узкимъ и тонкимъ основаніемъ*, прикрѣпляющимся къ подлежащей части кожи однимъ особымъ черешкомъ.

Прим. Бородавки же круглыя и продолговатыя, выпускающія изъ себя иногда нѣкоторый родъ сукровицы и бывающія особенно на концѣ заднепроходной кишки, по краямъ задняго прохода, также на головкѣ и на крайней плотнѣ дѣтороднаго уда, суть признаки венерической болѣзни.

Мозоль сухой есть затвердѣвшее слоистое болѣзненное отолстѣніе кожи, находящееся чаще на ногахъ, по причинѣ, большею частію, узкости и жесткости сапоговъ и башмаковъ; по этому мозолямъ подвержены болѣе щеголи, заботящіеся о красивой наружности обуви; рѣдко на рукахъ, какъ напр. у сапожниковъ и башмачниковъ по причинѣ

натирания пальцевъ рабочимъ шиломъ, а еще рѣже на плечахъ, какъ напр. у водоносовъ.

Мозоль мокрый есть водянистый пузырь (волдырь), появляющійся на ладонной поверхности рукъ отъ натирания во время работъ: молотбы, жнитвы, косьбы и т. п., и на ногахъ (у путешественниковъ).

Лѣчение діететическое бородавокъ и мозолей, какъ причинное, состоящее въ удаленіи причинъ производящихъ ихъ, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) Такъ какъ бородавки происходятъ по причинѣ мѣстныхъ, постоянныхъ, но легкихъ всякаго рода физическихъ, динамическихъ и механическихъ раздраженій, то во избѣжаніе появленія отъ нихъ бородавокъ должно каждый разъ *въ самомъ началѣ уничтожать эти чувствуемая легкія частныя раздраженія* на рукахъ *помазываніемъ ихъ мягчительными средствами*, какъ то: масломъ сливочнымъ, коровьимъ, не соленымъ, деревяннымъ, льнянымъ, либо топленнымъ саломъ свѣчнымъ, говяжьимъ, бараньимъ, свинымъ, помадою и т. п., *особенно на ночь, надѣвая потомъ варежки, либо рукавицы и перчатки.* 2) Въ предотвращеніе мозолей должно *носить обувь на ногахъ мягкую, сапоги и башмаки просторныя и не жесткія.* 3) *Одержимые же мозолями должны, размягчивъ ихъ и распаривъ теплою водою посредствомъ губки или ветошки, чаще и съ осторожностью, мало по малу, очищать перочиннымъ ножичкомъ, либо краемъ какого нибудь стеклушка, до послѣдняго слоя въ кожѣ; особенно это бываетъ удобно дѣлать въ банѣ. По очищеніи покрыть и завязать ветошкою съ перетопленнымъ саломъ свинымъ, бараньимъ и другимъ, либо покрыть плотно пристающимъ липкимъ пластъремъ до слѣдующаго очпщенія, продолжая это, пока мозоль совершенно будетъ вынуть съ корнемъ.*

Лѣчение существенное бородавокъ, имѣющихъ узкое основаніе, состоящее въ одномъ черешкѣ, состоитъ въ тугомъ перевязаніи черешковъ ихъ крѣпкою навощеною ниткою, конскимъ волосомъ, шелковиною и т. п., на столько времени, сколько потребно будетъ для того чтобы туго перевязанныя въ основаніи своемъ бородавки сами отвалились, что непременно всегда слѣдуетъ за прекращеніемъ въ нихъ послѣ того питанія и плототворенія.

Бородавки, широко сидяція на кожѣ, основаніе которыхъ состоитъ изъ многихъ корешковъ, очень скоро, безопасно и безъ всякой боли разрушаются и пропадаютъ отъ ежедневнаго легкаго смачиванія ихъ верхушекъ, концомъ кусочка ялписа, окунутымъ слегка въ воду. Это средство я всегда употребляю въ этомъ случаѣ съ постояннымъ успѣхомъ; ежедневно поутру, взявъ небольшой кусочекъ ялписа (выписаннаго изъ аптеки по рецепту), который всегда бываетъ цилиндрической, гораздо тоньше гусинаго пера, и вложивъ его однимъ концомъ внутрь перерѣзаннаго такого пера, другимъ едва коснувшимся поверхности воды, налитой въ стаканъ или рюмку, дотрогиваться легкимъ прикосновеніемъ порознь до верхушки каждой бородавки, которыя оттого сна-

чага какъ бы болѣютъ, а потомъ чернѣютъ безъ всякаго болѣзненнаго въ нихъ чувствованія; затѣмъ дать высохнуть, не касаясь до нихъ до того ничѣмъ.

Ежедневное повтореніе этой очень легкой и удобной операціи разъ, много два въ день, поутру и ввечеру, со временемъ совершенно истребляетъ бородавки, какъ бы онѣ ни были плотны и какъ бы крѣпко и широко не сидѣли на кожѣ. Кусочекъ янписа, употребляемый для операціи, должно сберечь отъ воздуха внутри двухъ перьевъ, пополамъ перерѣзанныхъ съ полыхъ писменныхъ концовъ, и противоположно сведенныхъ между собою. Предосторожности, требующіяся при этомъ, состоятъ только въ искусствѣ и ловкости операціи, чтобы не раздражить кожи около бородавокъ и не произвести въ нихъ рожистой воспалительной красноты; если же она произойдетъ по неосторожности операціи, то должно приостановливать ее до тѣхъ поръ, пока краснота уничтожится. Между простымъ народомъ, противъ бородавокъ, есть множество таинственныхъ средствъ; вяжутъ на ниткѣ или шелковинкѣ столько узловъ, сколько бородавокъ, обмѣривая каждую незатянутымъ еще узломъ вокругъ; потомъ нитку эту зарываютъ тайно, въ иныхъ мѣстахъ въ навозъ, а въ другихъ въ боровой калъ, и бородавки должны пропасть, когда нитка сгниетъ. Тоже дѣлаютъ съ лучинкой, на которой нарѣзываютъ, съ приговорками, столько зарубокъ, сколько у кого бородавокъ. Натираютъ также бородавки свѣжимъ мясомъ, которое зарывается или отдается собакамъ. Берутъ также яблоко, разрѣзываютъ его ниткою по поламъ, натираютъ бородавки обѣими половинками, связываютъ ихъ такъ же ниткою и зарываютъ въ сырое мѣсто. Еще средство: во время убыли луны, поводятъ рукою по стѣнѣ, на которую падаетъ лунный свѣтъ, — потомъ поглаживаютъ этою рукою, сверху внизъ, по бородавкѣ; все это повторяютъ нѣсколько дней сряду. Средство подвязывать бородавки ниткой также извѣстно въ народѣ. Въ Угройнѣ дѣлаютъ на лучинѣ зарубки, по числу и величинѣ бородавокъ, и бросаютъ ее въ такое мѣсто, гдѣ она можетъ попасться въ руки жиды; если жидъ подыметъ лучинку, то бородавки должны перейти на него \*). На подобные переводы этой болѣзни на другаго есть и разные встрѣчныя присказки и поговорки; но эти средства недостойны челоувѣчества. Должно излѣчивать болѣзнь, а не переводить ее на другаго.

Лѣченіе мозоля сухаго. Мозоль сухой успѣшно излѣчивается точно такимъ же образомъ, какъ и бородавки съ широкимъ основаніемъ, съ тою разницею, что его напередъ должно размягчать теплою водою и счищать, какъ сказано въ діететическомъ лѣченіи, а потомъ уже проводить по немъ сыроватымъ концомъ *яписса*, и наконецъ покрывать, какъ упомянуто выше. Въ теченіе двухъ недѣль мнѣ удалось разъ совершенно излѣчить такимъ образомъ мозоль, бывшій на подошвѣ ноги,

\*) В. Даль. Журн. М. В. Д. книж. 8 стр. 170 1843 г.

величиною до 1½ дюйма въ поперечникѣ и не уступающей въ твердости лубку.

Мозоль мокрый лѣченія не требуетъ; онъ по проколотіи, съ удаленіемъ причины производящей его, всегда проходитъ самъ. Лучше однако помазывать это натертое мѣсто *масломъ* или *саломъ*. Простонародное лѣченіе пузырчатыхъ мозолей, случающихся отъ путешествія, состоитъ въ слѣдующемъ: берутъ *горшки*, пропитанные жиромъ, ставятъ ихъ однимъ бокомъ къ жару, и какъ скоро разгорячится одна сторона горшка, то дотрогиваются имъ до самыхъ пузырей, нѣсколько ихъ придавливая; такимъ образомъ вся окрестность мозоля отъ этого нажиганія нѣмѣетъ, и распространеніе пузыря ограничивается такъ скоро, что путешествующій чрезъ сутки можетъ продолжать путь, уже безъ труда.

### Венерическая болѣзнь \*) (любострастная, сифилитическая).

**О П Р Е Д ъ Л Е Н І Е.** Венерическая болѣзнь есть болѣзнь, по видимому легкая и сносная, но въ сущности самая ужасная и гибельная. Легка и сносна, потому, что начинается непримѣтно, безъ всякихъ болей, и продолжается долго, не обременя больного никакимъ особымъ страданіемъ, такъ что занемогшій ею не вдругъ признаетъ себя больнымъ, а признавъ себя такимъ, пренебрегаетъ болѣзнію и чрезъ то даетъ ей время усиливаться и вкореняться. Ужасна же и гибельна она потому, что заразительна и смертоносна, и если ядь этой болѣзни не будетъ изъ организма выведенъ въ свое время надлежащими средствами, то онъ мало по малу разрушаетъ тѣло и преждевременно сводитъ въ могилу. Она происходитъ отъ непосредственнаго сообщенія венерической матеріи отъ больного здоровому, обнаруживающагося въ различныхъ видахъ: первоначально мѣстно, потомъ, болѣе или менѣе, повсемѣстно и наконецъ скрытно въ тѣлѣ.

**Р а з д ѣ л е н і е.** Поэтому венерическая болѣзнь бываетъ: 1) *первоначальная*, или мѣстная; 2) *послѣдовательная*, или общая (сифилисъ), и 3) *скрытная* или перерожденная.

1) Первоначальная (мѣстная) любострастная болѣзнь появляется въ двухъ формахъ: какъ любострастный перелой (слизетеченіе, гонорея) и такія же язвы (шанкръ).

**П р и з н а к и** гонореи — слизетеченія — у мужчинъ изъ мочевого канала, а у женщинъ изъ маточнаго рукава или предматочника. Послѣ совокупленія съ зараженною особою, чрезъ 12—6—3 дня, и даже че-

\*) У насъ простой народъ называетъ ее французскою, французы — голландскою; голландцы — птаванскою, испанскою, испанцы — американскою, обозначая тѣмъ пути этой болѣзни.

резь 12 часовъ, въ мочевомъ каналѣ у мужчинъ, за головкою снизу, а у женщинъ у самаго отверстія предматочника кверху, чувствуется зудъ, жаръ, жженіе при и послѣ испусканія мочи, а потомъ появляется изъ канала слизь сначала бѣлая, послѣ желтая, темная, зеленая, даже съ полосками крови. Рѣзь усиливается, особенно при напряженіи ствола и послѣ испражненія мочи, а отдѣленіе слизи увеличивается до того, что вся передняя часть рубашки бываетъ ею залита; въ высшей степени перелоя отдѣленіе слизи даже совсѣмъ преобразуется, стволъ краснѣетъ, пухнетъ, крайняя плотъ или не заворачивается за головку (незалупа), или же заворотившись, не можетъ отворотиться (удавка), и головка ствола представляется какъ бы ущемленною краемъ плоти. Въ это же время раздраженіе перелоя можетъ сообщаться паховымъ желѣзамъ (бобонъ) или яичкамъ (опухоль яичекъ). Этотъ періодъ перелоя называется воспалительнымъ и продолжается отъ 2—3 недѣль; потомъ рѣзь дѣлается тише, слизь отдѣляется въ большемъ количествѣ, дѣлаясь изъ зеленой желтою, потомъ бѣлою, наконецъ свѣтлою и совсѣмъ преобразуется. Этотъ второй періодъ продолжителенъ: отъ 3-хъ мѣсяцевъ даже до цѣлаго года. Перелой рѣдко переходитъ въ общую лобострастную болѣзнь, и то чаще въ видѣ сыпи, выпаденія волосъ, пятенъ.

**Признаки** лобострастныхъ язвъ (шангровъ) появляющихся чрезъ 3—14 дней послѣ совокупленія съ зараженною особою. Въ разныхъ мѣстахъ ствола, чаще въ бороздѣ, между головкою и крайнею плотью, на головкѣ, на плоти, даже на стволѣ, появляется краснота, потомъ прыщикъ, превращающійся въ пузырекъ, который, лопнувъ, представляетъ круглую, не чистую, бѣлую, желтую ямочку съ глубокою жирною поверхностію, съ возвышенными, твердыми, отворотившимися краями; къ этимъ язвамъ, какъ и къ перелоя, можетъ присоединиться удавка (незалупа), но чаще паховики (бобоны), доказывающіе, что мѣстная болѣзнь сдѣлалась уже общею. Шангры (язвы) продолжаются отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ и болѣе. При невоздержности и неосторожности больного (когда онъ, имѣя эти язвы, поѣщаетъ женщинъ, пьетъ вино, водку, раздражаетъ, ушибаетъ стволъ и проч.), шангры легко мертвѣютъ и причиняютъ значительную потерю ствола. Иногда послѣ совокупленія съ незараженною, но неопрятною женщиною, у корня головки ствола появляются ссадины и трещины, которыя проходятъ скоро при опрятномъ содержаніи ствола и частомъ его обмываніи.

2) **Признаки** послѣдовательной или общей лобострастной болѣзни, бывающей слѣдствіемъ мѣстной, и особенно язвъ, рѣже перелоя. Она развивается тогда, когда лобострастный ядъ изъ поверхности язвы или перелоя всасывается и поступаетъ въ массу крови, съ которою, протекая по всему тѣлу, отлагается чаще всего на пзвѣстныхъ частяхъ и производитъ воспаленіе и *язвы на щекахъ, языкъ, и особенно на небной занавѣскѣ и языкъ и въ носу, припухлость вокругъ*

*отверстiя во рту свстахiсвой трубы, а чрезъ то шумъ въ ушахъ, воспаленiе глазъ, лишайную сыпь и краснобагровыя пятна на лбу и другихъ частяхъ тѣла, красныя мясистыя, похожiе на шелковицу-ягоду, наросты около задняго прохода (чизпи), въ срамной промежности, вокругъ головки ствола, у большихъ женскихъ губъ, опухоли и язвы паховыхъ (бобонъ) и мидальныхъ жезлъ. Любострастный ядъ, долго гнѣздившiйся въ тѣлѣ, бросается на кости, особенно не покрытыя толстымъ слоемъ мышцъ, какъ-то: на лобъ, носъ, грудь и суставы и причиняетъ жестокия боли, особенно по ночамъ въ постели, опухоли и наросты, а потомъ нарывы, язвы и костоѣду.*

3) Признаки скрытной, перерожденной общей сифилитической болѣзни, когда любострастный ядъ, оставаясь долго въ тѣлѣ, какъ бы въ дремотѣ, начинаетъ потомъ дѣйствовать съ особенною жестокостью подъ видомъ множества другихъ медленныхъ хроническихъ болѣзней, — выражаются въ формѣ худосочiя, сухотки, ревматизма, особенно суставовъ, ломоты (особенно въ берцахъ съ ихъ утолщенiемъ и наростами), вѣтреной ости или постоянного нарыва, скорбута, особенно десенъ, костоѣды зубовъ, костей небныхъ и носовыхъ, тугости членосоединенiй, водянки суставовъ, членосоставнаго нароста, лишаевъ и т. п.

Причина внутренняя или предрасположенiе къ этой болѣзни состоитъ въ излишней пасочности (лимфозности) тѣла, будетъ ли она врожденная, или случайно прибрѣтенная организмомъ, безъ которой многiе, при явномъ поводѣ къ зараженiю сифилитическимъ ядомъ, остаются здоровыми; поэтому поселяне и люди бѣдные менѣе расположены къ этой болѣзни.

Причины внѣшнiя (производящiя): неопрятное содержанiе половыхъ органовъ, особливо при неумѣренномъ совокупленiи, и особенный ядъ, заражающiй тѣло непосредственнымъ прикосновенiемъ, подобно чесоточному и водобоязненному яду. Поэтому этой болѣзни подвержены люди неопрятные и распутные, особенно хлѣбники или пекари хлѣба. Чаше и легче всего венерическiй ядъ сообщается чрезъ мѣста, покрытыя тонкою кожею, какъ-то: чрезъ дѣтородныя части, заднiй проходъ, губы, ротъ, глотку, грудныя соски, глаза, носовую полость; а еще удобнѣе ядъ сообщается чрезъ мѣста, покрытыя кожицею, чрезъ раны, язвы, ссадину. Кромѣ совокупленiя съ зараженною особою, невинно можно заразиться чрезъ поцѣлуй, посуду, одежду, особенно бѣлье, чрезъ столчабъ пли судно, въ банѣ мочалкою, въ ваннѣ, чрезъ куренiе сигаръ и трубъ, особенно изъ деревяннаго, костянаго мундштуга и пр. Зараженiе скорѣе и обильнѣе происходитъ венерическою матерiею язвъ, на дѣтородныхъ частяхъ (бабки повитухи подвергаются этой болѣзни при повиванiи роженицъ съ этими язвами), на губахъ, языкѣ и перелойною, — медленнѣе при язвахъ въ горлѣ, при мокрыхъ шишкахъ у задняго прохода, при бобонахъ; любострастныя язвы на прочихъ частяхъ тѣла и костоѣда почти не заразительны, особенно перерожденiя въ другiя болѣзни.

Сущность венерической болѣзни состоитъ въ образованіи особеннаго заразительнаго пасочнаго вещества въ тѣлѣ, поражающаго плотныя части его также особеннымъ образомъ. Это заражающее пасочное вещество сгущаетъ пасоку, производитъ застой ея и ослабляетъ дѣятельность ея сосудовъ (пасочной системы); потомъ, постепенно переносясь въ общее кровообращеніе, отлагается преимущественно въ частяхъ, болѣе близкихъ по средству, какъ-то: въ слизистыхъ и сывороточныхъ тканяхъ (оболочкахъ), въ надкостной ткани и въ клѣтчаткѣ. Но когда вещество это распространится по всему тѣлу, тогда поражаетъ и всѣ прочія части, не исключая и самыхъ костей (костной системы). Существенныя измѣненія при этомъ первоначально состоятъ въ усиленномъ плототвореніи съ признаками, свойственными пасочнымъ воспаленіямъ, а потомъ плототвореніе начинаетъ болѣе и болѣе ослабѣвать, упадать и самое пасочное воспаленіе переходитъ въ полунагноительное раствореніе; наконецъ натура человѣка, борющаяся съ болѣзнію, хотя не преодолеваетъ ее совершенно, однако, сколько можетъ, перерабатываетъ характеръ, такъ что всѣ существенныя болѣзненные измѣненія, какъ соковъ, такъ и самыхъ плотныхъ частей, мало по малу, принимаютъ другое качество, уподобляющееся свойству другихъ болѣзней, словомъ: перерождаются въ другія болѣзни.

Чтожь касается до сущности венерическаго яда, то объ немъ по врачебной наукѣ ничего неизвѣстно кромѣ того, что онъ, какъ видно изъ предъидущаго, не летучій (не дѣйствуетъ чрезъ воздухъ), поражаетъ только чрезъ прикосновеніе однократно и многократно одну и ту же особу, даже уже зараженную, что онъ любитъ пасочную всасывающую систему нашего тѣла, слизистыя оболочки около отверстій, кожу и кости, портитъ соки и кровь, производитъ язвы, сыпи, опухоли, наросты, роднится, такъ сказать, съ нашимъ тѣломъ и предательски его разстроиваетъ; вообще дѣйствуетъ медленно, но за то вѣрно; по временамъ, какъ бы въ забытьѣ, дремлетъ, молчитъ, скрывается и потомъ опять пробуждается, слабѣя все болѣе и болѣе, особенно если больной часто прибѣгаетъ къ врачебному пособію, но не доканчиваетъ лѣченія. Дремлющій въ тѣлѣ любострастный ядъ, подобно другимъ худосочнымъ болѣзнямъ, нанчаще пробуждается къ веснѣ.

Р а с п о з н а в а н і е венерической болѣзни первоначальной и послѣдовательной, по свойственнымъ ей въ томъ и другомъ случаѣ признакамъ, при полиомъ ея развитіи *легко*, при развитіи же неполномъ и въ перерожденіяхъ ея, напротивъ, очень *трудно*. При распознаваніи тѣхъ болѣзней, въ которыя она перерождается, нужно обращать вниманіе на слѣдующія обстоятельства: 1) Больной за 10—13 лѣтъ былъ зараженъ любострастною болѣзнію, отъ которой онъ или совсѣмъ не лѣчился, или же лѣчился недостаточно, невѣрно, у фельдшера, цирюльника, и во время лѣченія не соблюдалъ діеты. 2) Послѣ излѣченія этой болѣзни онъ началъ страдать: то болью въ горлѣ, то сыпью на тѣлѣ, ломотою и опухольями въ костяхъ, наростами у задняго прохода; послѣ длиннаго

ряда этихъ болѣзней началъ чувствовать сильныя головныя боли и потомъ у него появились судороги, падучая, слабое зрѣніе, глухота, шумъ въ ушахъ, кашель, у него развилась чахотка, водянка и проч. разстройство пищеваренія, завалы внутренностей: 3) Всѣ, какъ прежде, такъ и настоящіе болѣзненные признаки, отъ употребленія ртути и дорогой травы уменьшаются.

**Предсказаніе** относительно опасности для жизни важно только въ полномъ развитіи болѣзни и въ особенности застарѣлой, въ которомъ она бываетъ *опасна, смертельна* и самую натурою безъ врачебнаго пособія почти никогда не излѣчивается; напротивъ, въ венерической болѣзни не вполне развитой и перерожденной въ видѣ нагноившихъ болѣзней предсказаніе неважно, потому что болѣзнь можетъ продолжаться многіе годы безъ всякой опасности для жизни, если только не будетъ стеченія особенныхъ, неблагоприятныхъ условій. Относительно продолжительности болѣзни предсказаніе всегда *дурно*, ибо она безъ искусственнаго пособія продолжается безгранично. Бываютъ случаи, хотя и очень рѣдкіе, что у людей чисто кровянаго тѣлосложенія, особенно у трудолюбивыхъ поселянъ, употребляющихъ пищу болѣе растительную, болѣзнь эта проходитъ въ довольно короткое время безъ врачебнаго пособія.

**Исходы:** въ *здоровье*, въ *другія* выше перечисленныя *болѣзни* и въ *смерть*, при посредствѣ этихъ болѣзней.

**Лѣченіе** діететическое отъ венерической болѣзни требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) Въ предохраненіе отъ нея воздерживаться отъ неопытности и распутства, — содержать *въ чистотѣ и опрятности половыя органы*, особенно *до и вскорѣ по совокупленіи*; а въ сомнительныхъ случаяхъ совокупленія, т. е. таковаго, въ которомъ можно подозрѣвать зараженіе сифилитическимъ ядомъ, обтирать тотчасъ послѣ него дѣтородныя части ветошкою, смоченною водою по поламъ съ известковою, либо съ десятою частію нашатырнаго спирта, за неимѣніемъ которыхъ можно употребить въ этомъ случаѣ собственную урину, и потомъ обтереть также ветошкою, намазанною льнянымъ или деревяннымъ масломъ. Кромѣ того нужно беречься и всѣхъ другихъ поводовъ къ зараженію, о которыхъ упомянуто выше въ причинахъ производящихъ эту болѣзнь. Для хлѣбниковъ или пекарей хлѣба, а также и для повитухъ изложены особыя правила въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію. 2) *Больной*, одержимый гонореею, немедленно *долженъ строго соблюдать діету прохладительную* и не употреблять ничего горячаго, какъ-то: вина и другихъ крѣпкихъ напитковъ, пищи пряной, соленой, кислой, сладко приправленной, копченой, сушеной, съ подливками, мяса, жирной рыбы, какъ и всѣхъ острыхъ растений, напр. луку, чесноку, мускатнаго орѣха, горчицы, ворицы, мускатнаго цвѣта, имбирю и проч., ему должно питаться сладковатыми растеніями, молокомъ, легкими похлебками, жидкою кашею и т. п. 3) *Пить чистую воду* одну и по поламъ *съ молокомъ*,



*настояй личицъ крупъ*, льнянаго сѣмени, *отваръ проскурняка*, солодковаго корня, или процѣженную *сыворотку*. Такое питье полезно употреблять больному въ порядочномъ количествѣ. 4) *Дорожа спокойствіемъ*, всякое сильное тѣлодвиженіе, какаго бы рода оно ни было, особенно верховая ѣзда и любострастныя совокупленія, должны быть оставлены, сверхъ того больному нужно *беречься стужи*, и какъ скоро воспаленіе усилится, надлежитъ *лежать въ постели*.

Лѣченіе существенное венерической болѣзни должно состоять въ совершенномъ истребленіи ея яда и въ уничтоженіи болѣзненныхъ перемѣнъ; потому что ядъ, не совершенно истребленный, опять возрождается, дѣйствуетъ съ новою силою и болѣзнь вновь появляется въ прежнемъ или другомъ видѣ. Ядъ истребляется и уничтожается въ любострастной болѣзни всего надежнѣе *ртутью* (или меркуріемъ), которую однако нужно употреблять съ осторожностію, потому что она, истребляя любострастный ядъ, есть вмѣстѣ и сама сильный ядъ и зарождаетъ въ тѣлѣ нашамъ новую ртутную болѣзнь, не менѣе опасную, какъ и любострастная. Поэтому назначеніе больному ртути нужно предоставить врачу, который изберетъ какъ составъ ртути, такъ и способъ его употребленія: чрезъ ротъ, чрезъ кожу, въ видѣ втираній, ваннъ, или чрезъ задній проходъ въ глистирахъ. Для этого всего лучше и надежнѣе совѣтовать отправлять заразившихся этою болѣзнію въ ближайшій лазаретъ. Въ случаѣ же крайности можно допустить простонародное лѣченіе слѣдующимъ ограниченными способомъ.

Въ перелѣ (гонорей) прежде всего, т. е. въ первые 4—12 дней, и у человѣка, въ первый разъ подвергшагося этой болѣзни, чтобы унять раздраженіе и воспаленіе и предотвратить опухоль крайней плоти (незалупу, удавку) совѣтовать чаще погружать дѣтородный удъ въ банку, наполненную теплою водою или *теплымъ молокомъ*, и обмывать ими *ячки*, помѣстивъ ихъ въ мѣшечекъ съ бобовыми тесемками, *подвязывать* ими чрезъ пахи вокругъ таза (чреслъ), пить *молоко* изъ *коноплянаго*, *маковаго сѣмяни*, изъ *миндальныхъ* (оржадъ), *лѣсныхъ ореховъ* по полчашкѣ, какъ можно чаще, такъ, чтобы въ сутки выпить 2—3 бутылки, прибавляя 3—4 раза съ сутки *селитры* въ порошокъ по  $\frac{1}{5}$  золотника. При сильныхъ боляхъ и нестерпимой рѣзи, при болѣзненныхъ напряженіяхъ ствола и опухоли крайней плоти, съ незалупою или удавкою, полезно приставленіе *пьявицъ*: въ первомъ случаѣ къ стволу снизу головки, во второмъ къ корню ствола, а съ послѣднемъ вокругъ опухоли, и потомъ прикладываніе *мягчительныхъ припарокъ* изъ *мякиша благо хлѣба съ молокомъ* или изъ *маковыхъ головокъ*, *льнянаго сѣмени*. Для омовенія скопляющейся слизи и гноя нужно впрыскивать подъ крайнюю плоть теплое молоко, отваръ просвиры. А потомъ, если этихъ средствъ будетъ недостаточно, должно обратиться за пособіемъ къ врачу.

Въ свѣжихъ шанкрахъ, при свѣжемъ зараженіи, продолжавшемся не болѣе 2—6 дней, когда они еще бываютъ мѣстною болѣзнію, лучше всего *прижигать ляписомъ*, палочку котораго оправить для этого въ гуси-

ное перо и кончикомъ слегка дотрогиваться до язвы, такъ, чтобы вся ея гнойная поверхность покрылась струпомъ, послѣ чего язва покрывается сверткомъ корнн, намоченной въ свѣжсмъ *деревянною маслѣ*. По спаденн струпа, что послѣдуетъ въ тотъ же или на другой день, повторяется прижиганіе особенно гнойныхъ, желтыхъ или бѣлыхъ мѣстъ. Прижигать надобно до тѣхъ поръ, пока язва не заживетъ, или по крайней мѣрѣ не очистится и не представитъ чистой, красной поверхности, которая до заживленія перевязывается тѣмъ же масломъ. Если послѣ прижиганія появится сильная боль и опухоль, или не скоро отпадетъ струпь, то на язву надобно положить нѣсколько припарокъ изъ *мякиша бѣлаго хлѣба съ молокомъ*.

Примѣч. Вмѣсто мякиша простой народъ, особенно солдаты, употребляютъ *кусочекъ сняго купорося* съ такимъ же успѣхомъ.

Въ паховикахъ, или бобонахъ, если они бываютъ при переломѣ и зависятъ отъ перелойнаго раздраженія, употребленіе теплыхъ *мягчительныхъ припарокъ* бываетъ достаточно къ разрѣшенію, но въ бобонахъ при шанкрахъ, зависящихъ отъ всосанія яда и остановившагося въ паховыхъ желѣзахъ, употребленіе *ртути* необходимо, какъ и въ послѣдовательной, или общей венерической болѣзни.

Въ послѣдовательной общей и въ скрытной (перерожденной) венерической болѣзни простой, сельскій, съ вѣрою и надеждою простаго народа болѣе согласный способъ лѣченія, который на опытѣ оправдывается отличнымъ успѣхомъ, состоитъ въ слѣдующемъ: 1) Больнымъ дается пить горячій *декоктъ* изъ *дорогой травы* (сарсапарель) отъ 2—4 и болѣе фунтовъ въ сутки, сколько кто можетъ, съ тѣмъ, чтобы, кромѣ его въ питье ничего болѣе не было употребляемо. 2) При этомъ больныя пораженныя язвами мѣста окуриваются *паромъ киновари*: въ 1-й день одинъ разъ, во 2-й день 2 раза, утромъ и ночью; въ 3-й день 3 раза, утромъ, въ полдень и вечеромъ; въ 4-й день 4 раза, утромъ, предъ полуднемъ, послѣ полудня и вечеромъ; въ 5-й день 5 разъ; въ 6-й день 6 разъ; въ 7-й день 5 разъ; въ 8-й день 4 раза; въ 9-й день 3 раза; въ 10-й день 2 раза; въ 11-й день 1 разъ. На каждую окурку употреблять по  $\frac{1}{2}$  зол. киновари. Во весь курсъ, т. е. въ 36 окурковъ въ 11-ть дней, выходитъ на больного 19 зол. киновари. Аппаратъ для этой операціи самый простой. Берется деревянная кадучечка, вышиною въ  $1\frac{1}{2}$ , а шириною около  $\frac{1}{4}$  аршина. Дно ея покрывается желѣзнымъ листкомъ; на этомъ листкѣ ставится таганчикъ, въ который вставляется плитка съ горячими угольями, какими бы то ни было, а лучше березовыми, изъ которыхъ одинъ въ средннхъ долженъ быть большой съ углубленіемъ, ямочкою. Кадучечка опускается въ мѣшокъ, соразмѣрный съ ея величиною, длиною же гораздо большій. Уголья раздуваются въ плоскѣ мѣхами, пока вспыхнетъ огонь. Въ это время кладется кусокъ киновари, вѣсомъ въ  $\frac{1}{2}$  золотн., въ ямочку средняго большого раскаленного угля, и больной, взявъ за края мѣшка руками, опускаетъ въ него лицо свое съ язвами, прямо противъ струи горячаго пара киновари. горящей голубымъ огнемъ;

при этомъ края мѣшка плотно прижимаетъ руками по бокамъ головы. При язвахъ въ носѣ и зѣвъ онъ открываетъ ротъ, но не дышетъ. Если понадобится перевести духъ, то онъ вынимаетъ лицо изъ мѣшка, который тотчасъ закрываетъ руками, чтобы не выходилъ паръ, и, вздохнувши, опять опускаетъ лицо въ мѣшокъ и кадушечку къ струѣ пара. Такъ продолжается онъ, пока горитъ киноваръ, что продолжается короткое время и обозначается присутствіемъ голубаго огня. Зубы защищаются при этомъ отъ вліянія пара, нижніе — нижнею губою и частию языкомъ, который прижимается къ нижней челюсти, а верхніе — верхнею губою. Окуриваніе язвъ и опухолей на прочихъ мѣстахъ тѣла сопряжено съ меньшимъ затрудненіемъ и поясненія не требуетъ. Такъ во Франціи докторомъ Лалонеттомъ (съ 1776 года употреблявшимъ ртутное куреніе съ необыкновенною пользою въ самыхъ упорныхъ сифилистическихъ страданіяхъ) придуманъ ящикъ, сдѣланный на подобіе кресель, съ двумя отверстіями, изъ которыхъ верхнее объемлетъ кругомъ шею, оставляя совсѣмъ свободною голову, а подъ нижнюю становится не большая жаровня съ раскаленнымъ желѣзомъ, на которое сыплется обращааемый въ пары ртутный порошокъ. Такой же приборъ употреблялъ для подобной цѣли въ Англии извѣстный д-ръ Пирсонъ съ отличною пользою; онъ хорошъ и удобенъ, но для сельскихъ жителей все-таки довольно затѣйливъ. Отечественный д-ръ Петръ Вишневскій предлагаетъ имъ для этого своеручное издѣліе; это большіе и широкіе *вентери*, разставляемые въ извѣстныхъ частяхъ рѣкъ и озеръ для рыбной ловли. Этотъ рыбачій снарядъ, составляясь изъ связанныхъ между собою нѣсколькихъ ивовыхъ прутьевъ, похожъ на большой коробъ, у котораго основаніе широкое и открытое, а верхъ закрытый узкій. Если въ некоторую часть къ верху отнять, и, сдѣлавъ въ немъ отверстіе для просовыванія головы, укрѣпить его около шеи, а въ остающемся затѣмъ пространствѣ, помѣстивъ голаго больнаго, укрыть его со всѣхъ сторонъ епанчами или войлоками, дабы пары не могли проникнуть сквозъ промежутки прутьевъ къ наружи, то посыпаемымъ меркуріальнымъ порошокомъ на поставленную по одалъ ногъ больнаго разженную сковороду, можно произвести съ этимъ простымъ снарядомъ то же, что съ красивымъ, но тяжелымъ для поселянина приборомъ французскаго доктора. Еслибъ понадобилось окуривать больнаго, лежащаго безъ движенія въ постели, то въ избѣжаніе безпокойной для него операціи не худо употребить простую, обыкновенную кровать изъ досокъ, на мѣсто которыхъ, переплетши ее бичевкою, сдѣлать постылку соломенную, а гдѣ можно изъ тростника. Около всѣхъ четырехъ ножекъ окутать кровать войлокомъ, а сверху чрезъ поперечныя двѣ стѣнки отъ головы до ногъ, соединенныя вдоль двумя жердочками или длинными палочками, перекинуть одѣяло изъ плотнаго сермяжнаго сукна (хорошо сваленнаго) до самаго пола. Положивши на приготовленную такимъ образомъ кровать больнаго, до нага раздѣтаго, остающійся край одѣяла при изголовьѣ опустить на шею, гдѣ этотъ край долженъ хорошо придержививаться; потомъ, подведя подъ кровать широкую небольшую кадочку, наполенную до половины

пескомъ (либо чугуничкѣ), съ разгоряченною сковородою, посыпать на нее курево. Тогда дымъ, по упругости своей, не замедлитъ проложить себѣ путь чрезъ постилку къ лежащему на ней больному, не касаясь прямо носа, рта и зубовъ. По окончаніи окурки бѣлье, тѣмъ же дымомъ напитанное, надѣвается на больного и послѣ открывается на нѣкоторое время окошко или дверь для возобновленія воздуха, причѣмъ страдающаго помѣщаютъ въ безопасномъ отъ сквознаго вѣтра мѣстѣ. Такимъ образомъ и съ такими предосторожностями производимое меркуріальное куреніе имѣетъ свою пользу и преимущество тамъ, гдѣ поверхность тѣла, усѣянная струпиями, сыпями и ранами, дѣлаетъ неумѣстнымъ окуриваніе киноварью вышеописаннымъ аппаратомъ \*). Оно продолжается только до тѣхъ поръ, пока язвы присохнутъ и струпь отпадетъ, а для этого часто бываетъ достаточно  $\frac{1}{4}$ -ти курса окуриванія парами. 3) Каждый разъ послѣ окуриванія парами киновари, воздухъ, окружающій больного, должно очищать куреніемъ уксуса, разведеннаго двумя частями воды и поливаемого на раскаленный кирпичъ съ прибавленіемъ пучка простой мяты. 4) Въ свободные отъ окуриванія промежутки времени, покрывать язвы и опухли *мякотью* вываренныхъ *корней сарсапарели*, отдѣленно отъ стержней. 5) Полный курсъ для употребленія декокта 12-ть дней сряду, безъ всякаго другаго питья, съ тою разницею, что съ 6-го и до 12-го послѣдняго дня декоктъ отгарируется день ото дня все слабѣе и слабѣе, такъ что въ послѣдніе три дня употребляется горячій настой на прежнихъ вываркахъ корня. Въ первую же половину курса, т. е. отъ 1-го по 6-й день, онъ готовится такъ: на 1 фунтъ изрубленной сарсапарели наливается 4 штофа воды, смѣсь помѣщается въ кувшинъ съ узкимъ горломъ, замазывается потомъ хлѣбнымъ тѣстомъ; кувшинъ ставится въ печь не очень горячую, при выниманіи изъ нея испечшихся хлѣбовъ. Испечшееся хлѣбное тѣсто на горлѣ кувшина бываетъ признакомъ, что декоктъ готовъ къ употребленію. Для этого испекающаюся хлѣбную крышку не должно совсѣмъ срывать съ кувшина, а съ одного края на дюймъ приподнять только для отверстія, чрезъ которое бы можно было каждый разъ, смотря по надобности, налить въ стаканъ или кружку, пить и опять закрывать и ставить въ печь, чтобы такимъ образомъ декоктъ всегда былъ въ употребленіи горячимъ.

Прим. При внутреннемъ употребленіи этого декокта столь сильное окуриваніе парами киновари снаружи, кромѣ пользы, иногда не оставляетъ никакихъ по себѣ вредныхъ послѣдствій въ тѣлѣ; но если когда либо будутъ замѣчены припадки, происходящіе отъ излишняго поступленія въ тѣло паровъ киновари, какъ то: сухотка, ломота въ костяхъ и трясеніе членовъ, особенно въ рукахъ и ногахъ, то, не говоря о сѣрныхъ минеральныхъ водахъ и ваннахъ, въ этомъ случаѣ очень полезны ванны спиртовыя сухія, которыя выводятъ изъ тѣла и уничтожаютъ въ немъ металлическое начало киновари. Въ концѣ ванны зажигаютъ спиртъ

\*) Др. Здр. 1837 г. № 21. стр. 154 и 155.

въ конфоркѣ, покрытая ванна нагрѣвается, потомъ больной садится въ нее въ другомъ концѣ на 8—10—15 минутъ, пока выступитъ на тѣлѣ испарина. Такимъ образомъ слѣдуетъ продолжать эти ванны каждодневно до совершеннаго облегченія, которое обыкновенно послѣдуетъ въ теченіе 14-ти дней. Въ домахъ, по частной практикѣ, гдѣ крайность заставляла меня прибѣгать къ такому способу лѣченія, декоктъ этотъ приготовлялся въ самоварѣ, на столѣ, у постели больного, причемъ нужно дать ему вскипѣть отъ 6—12 разъ. 6) Диета состоитъ въ томъ, чтобы въ первые 3 дня ничего не ѣсть. Во вторую четверть курса, т. е. въ 4—5—6 дни, дается прѣсная лепешка. Въ третью четверть курса, т. е. въ 7—8—9 дни водяной супъ изъ крупъ овсяныхъ, манныхъ, ячменныхъ, перловыхъ, риса, либо каша и т. п., съ бѣлымъ хлѣбомъ. Въ послѣднюю четверть курса, т. е. въ 10—11—12 дни, супъ изъ цыплятъ, курицы, телятины, индѣйки и т. п., съ бѣлымъ хлѣбомъ. Сверхъ того, шесть недѣль со времени пользованія, больные должны быть осторожны и кромѣ свѣжихъ щей лѣбныхъ, либо изъ зелени съ говядиною, каши размазни, супа, похлебки изъ куръ, цыплятъ, индѣекъ, телятины, по необходимости и баранины, отдѣленной отъ жира, а въ питье чистой не холодной воды, хорошаго бваса и, въ случаѣ, хорошаго пива—ничего болѣе не употреблять; особенно беречь себя отъ употребленія сала, свинины, поросятъ \*), соленыхъ и копченыхъ яствъ; изъ рыбъ: севрюги, осетрины, сомины, налимовъ, щуки и икры ихъ. Молочную пищу и яйца въ смятку можно дозволить. 7) Больные, одержимые скрытою, перерожденною сифилитическою болѣзнію, пользуются тѣмъ же способомъ, только большею частію безъ окуриванія паромъ киновари. 8) Температура воздуха у больныхъ въ комнатѣ должна быть при этомъ отъ 20—30 гр. по Реом. во всѣ 12-ть дней. Успѣхъ отъ такого способа лѣченія бываетъ чрезвычайный. Съ первыхъ уже сутокъ больные всегда начинаютъ чувствовать себя спокойнѣе, лучше прежняго и легко обходятся безъ пищи всѣ трое сутокъ. Потъ бываетъ сильный, какъ въ банѣ. Язвы при каждомъ окуриваніи видимо подсыхаютъ. Опухоли въ напряженности ослабѣваютъ и становятся безболѣзненными. Носовыя и грудныя мокроты открываются самыя доброкачественныя. Отдѣленія и испражненія всѣ вообще бываютъ лучшія и правильныя. Сонъ крѣпкій, спокойный. Взглядъ дѣлается живѣе, — веселѣе. Здоровый цвѣтъ лица восстанавливается. Страданія отъ ломоты въ костяхъ, по причинѣ чрезвычайныхъ сверлищихъ болей, затихаютъ, словомъ больные ободряются какъ бы сверхъ ихъ чаянія. Кости, пораженныя костоѣдою, отваливаются и выпадаютъ. Изъ числа многочисленныхъ болѣзненныхъ (патологическихъ) въ этомъ родѣ слу-

\*) Сельскія лѣкарки запрещаютъ на всю жизнь употреблять въ пищу: щуку, свеклу, свинину и поросятину. Послѣдняя, особенно малосольная, дѣйствительно вредна и производитъ смертоносныя припадки. Но достаточно воздержаться отъ нихъ въ теченіе 7-ми лѣтъ послѣ болѣзни (о чемъ сообщено мною въ Др. Здр. 1838 г. № 8 стр. 59).

чаевъ, оправдавшихъ на опытѣ отличную пользу этого способа лѣченія, надѣюсь, слѣдующіе два будутъ достаточны къ убѣжденію въ истиннѣ сказаннаго. *Первый случай.* 1839 года, сентября 2 дня, отставной офицеръ Ф. Б., въ проѣздъ его чрезъ г. Царевококшайскъ, въ которомъ я тогда жилъ, былъ у меня и, жалуясь на болѣзнь во рту, отъ которой нельзя было ему ни пить, ни ѣсть ничего горячаго, и неловко глотать пищу, просилъ моего пособія. По осмотру моему полостей рта его и зѣва, замѣчены только багровость неба и на этой багровости маленькіе, на подобіе зеренъ пшена; пупырышки. Зная его, какъ женатаго человѣка, хорошей жизни и добраго семьянина, я не рѣшился обезпокоить его секретнымъ вопросомъ о происхожденіи его болѣзни, и потому, сочтя ее за обыкновенную и маловажную сыпь отъ мѣстнаго раздраженія, прописалъ ему мягчительное полосканье, съ которымъ онъ и уѣхалъ домой. Въ концѣ сентября прислалъ онъ за мною. По пріѣздѣ моемъ къ нему, очевиднѣе былъ въ небѣ рта его сифилисъ. Когда я объявилъ ему объ этомъ, то онъ припомнилъ одинъ случай бытности его въ гостяхъ, гдѣ какой-то молодой человѣкъ, съ сомнительнымъ здоровьемъ, курилъ трубку, изъ которой и онъ въ слѣдъ за тѣмъ курилъ табакъ, и съ того времени, мало по малу, хотя не очень замѣтно, началъ чувствовать у себя во рту не хорошо. По жительству его въ деревнѣ и неимѣнію другихъ средствъ, я былъ въ крайности прибѣгнуть къ вышепрописанному простому домашнему способу лѣченія его болѣзни. Во всѣ 12-ть дней самоваръ съ горячимъ декоктомъ стоялъ у него на столѣ. Окуриваніе не дѣлано, онъ на него не согласился. Пользы не было, и болѣзнь видимо усиливалась съ разстройствомъ костей. Рѣшено окуривать пораженное небо паромъ киповари, отчего, съ перваго раза, больной замѣтилъ пользу. Въ 3-й день пораженное мѣсто неба подсохло и почернѣло. Въ 4-й день эта почернѣлость выпала по причинѣ гостоѣды въ небной кости, оставивъ по себѣ круглое отверстіе въ  $\frac{1}{6}$  ч. дюйма. Больной испугался, но я его успокоилъ, что этимъ болѣзнь оканчивается. Въ 5-й день окуриваніе закончено. Болѣе ничего не выпадало. Остальныя части костей крѣпки, покровы здоровы, ни напряженности, ни багровости, ни матеріи и ничего болѣе болѣзненнаго не оставалось. Лѣченіе кончено. Въ органѣ рѣчи осталась небольшая перемѣна въ произношеніи; для этого въ послѣдствіи сдѣлана серебряная вставочка въ отверстіе неба, и больной мой, съ того времени до настоящаго, совершенно здоровъ по прежнему, какъ былъ до болѣзни. *Другой случай.* 1840 года, іюня 13 дня, въ бытность мою въ Казани, по случаю откомандированія меня на время въ больницу приказа общественнаго призрѣнія для завѣдыванія особымъ ея отдѣленіемъ, по причинѣ поступленія туда въ большомъ количествѣ больныхъ военныхъ кантонистовъ, во время посѣщенія мною надзирателя того заведенія Г. В., услышалъ я глухой стоиъ умирающаго человѣка. Оказалось, что это кучеръ его Я., который два года какъ сдѣлался боленъ, время отъ времени хрипѣлъ все болѣе и болѣе, и хотя для него употребляли всѣ средства, но безъ всякой пользы. Миѣ показали его. Онъ лежалъ недвижимъ на

спинѣ, въ сухотѣхъ до такой степени, что, казалось, въ немъ остался одинъ остовъ, какъ въ мѣшкѣ общихъ покрововъ, обтянувшихъ на немъ. Лицо темное, осунувшееся; глаза, что называется, ушли въ затылокъ. Слабые, едва смыкающіеся вѣки. Губы черныя, зубы въ корняхъ обнаженные и слабые. Десны поражены скорбутными язвами, кровоточивы. во рту сухость и спекшаяся кровь. Языкъ шероховатый, жесткій и сухой, какъ щетка. Щеки внутри припухшія съ язвками и также кровоточивы, какъ и десны. Жажда сильная, но онъ глоталъ питье съ трудомъ, пищи никакой принимать не могъ, кромѣ тепловатаго бульона и варенаго молока. Пульсъ медленный (40 въ минуту), слабый, ползучій. нервообразный. Я попросилъ оставить меня съ нимъ наединѣ. Вопросъ былъ одинъ: не былъ ли онъ когда либо во французской болѣзни? Онъ признался, что былъ, и лѣчился синимъ купоросомъ. Видя, что онъ страдаетъ перерожденіемъ сифилиса, который онъ сначала прижогъ, но уже поздно (болѣзнь была уже не мѣстная, а общая), я предложилъ употребить для него послѣднее средство, декоктъ дорогой травы, по вышеописанному способу, безъ окуриванія парами киновари. Для этого больной былъ помѣщенъ въ банѣ, въ которой поддерживалась температура воздуха отъ 30—25—18° по Реом.; на 6-й день открылся у него проливной потъ, во рту, деснахъ, на языкѣ и губахъ смякло. Ломота съ сверлящими болями въ берцахъ миновалась. Пилъ онъ декоктъ свободиѣе и болѣе прежняго; ѣлъ щи изъ зелени съ бѣлымъ хлѣбомъ и супъ; въ здоровѣ видимо освѣжился. По истеченіи 12-ти дней онъ сидѣлъ и приподнимался на ноги, имѣлъ аппетитъ, но десны были разстроены; ему позволено жевать и сосать свѣжую малину, но не ѣсть ея, а выплевывать назадъ. Она ему очень нравилась. Онъ вышелъ изъ бани, шесть недѣль былъ остороженъ въ діетѣ, а въ сентябрѣ мѣсяцѣ того года былъ здоровъ по прежнему, какъ былъ до болѣзни, полонъ, свѣжъ, румянь. крѣпокъ, словомъ въ цвѣтущемъ состояніи здоровья \*).

## Золотуха.

**Определение.** Золотуха обнаруживается опухолью клубовидныхъ желѣзъ, особенно шейныхъ, толстотою и какъ бы опухлостію верхней губы и переносицы, бѣлизною волосъ и цѣлаго тѣла, полнотою живота.

**Раздѣленіе.** Золотуха появляется въ двухъ видахъ: 1) какъ *золотушное расположеніе* (золотушная почва), и 2) какъ дѣйствительная *золотуха*.

**Признаки расположенія къ золотухѣ:** нѣжный румяный цвѣтъ лица, — но румянецъ бываетъ ограниченный и какъ бы пятнами; лицо иногда одутлое, кожа бѣлая, гладкая, нѣжная, волосы свѣтлые, глаза большіе, голубые; расширенный, блестящій зрачекъ (блескъ зрачка означаетъ начавшіеся завалы въ животѣ), голова велика, особенно въ за-

\*) Сообщено мною въ Др. Здр. 1847 г. № 20. стр. 153 и 156.

тылкѣ, но лобъ узкій; виски, какъ бы вжатые, шея короткая и толстая, крылья носа и верхняя губа толсты, мягки, пухлы, и оттого длинная ложбина послѣдней глубока — признакъ отличительный и зависящій отъ припухлости маленькихъ желѣзъ этихъ частей; самый носъ мясистый, толстый, часто опухаетъ и краснѣетъ; все тѣло также одутлое, мышцы блѣдны, слабы, не упруги, животъ великъ, хотя еще не твердъ и легко вспучивается. Эта золотушная почва (золотушное расположеніе) у дѣтей обнаруживается раннимъ расположеніемъ къ простудѣ, насморку и кашлю съ обильнымъ изверженіемъ мокроты и слизи, опухолями крыльевъ носа и верхней губы, частымъ кровотеченіемъ изъ носа, разстройствомъ пищеваренія, то запоромъ, то поносомъ зеленоватыми испражнениями, какъ бы въ кускахъ, рѣдко натурального вида и цвѣта, часто съ глистами и слизью, рѣзью въ животѣ, даже съ судорогами, вѣтрами и пученіемъ живота; зарожденіемъ въ желудкѣ кислоты; то отвращеніемъ отъ пищи, то страшнымъ позывомъ на ѣду, особенно на мучную пищу; чесночнымъ запахомъ изо рта, частымъ, но скоро проходящимъ отекомъ на лицѣ, мошонкѣ, рукахъ и ногахъ. У дѣвочекъ появляется по временамъ выпотѣніе острой матеріи въ видѣ бѣлей; уши мокнуть, изъ нихъ истекаетъ кровяная влага, при рѣлости на шеѣ, въ пахахъ, подъ мышками; сыпь на кожѣ, парши на головѣ, молочница во рту. Органы чувствъ и умственныя способности у дѣтей развиваются рано, быстро и совершенно, какъ у сангвиниковъ, рано же у нихъ пробуждается и дѣтородная похоть и понуждаетъ ихъ къ рукоблудію; отъ преизобилія у нихъ пасочки, всѣ части тѣла, требующія для своего питанія лучшей крови, какъ-то: кровяные сосуды, сердце, мышцы, кости бываютъ слабы, дряблы, блѣдны; рыхлы до того, что кости искривляются и пухнуть (англійская болѣзнь, которая поэтому есть родная сестра золотухи), а брюшныя органы, пасочные сосуды и желѣзы тучнѣютъ, полнѣютъ, и тогда какъ руки и ноги тонки, какъ спички, а лицо старообразно и сморщивается (собачья старость, т. е. ранняя), животъ необыкновенно полнѣетъ и залпвается слизистыми мокротами; оттого зубы прорѣзываются, а кости крѣпнуть поздно и неправильно; дѣти поздно начинаютъ ходить и говорить, дѣлаются горбатыми, хромыми.

Примѣч. Золотушнымъ расположеніемъ страждутъ болѣе дѣти горожанъ, чѣмъ поселянъ.

Признаки собственно золотухи: опухоли и окрѣплости желѣзъ постоянные признаки золотухи. Они появляются прежде всего на шеѣ, подъ подбородкомъ, на затылкѣ въ видѣ узловъ, подвижныхъ шариковъ съ горошину или лѣсной орѣхъ, иногда какъ бы нанизанныхъ на нитку, такъ онѣ располагаются въ линію; потомъ такія же опухоли появляются и въ другихъ частяхъ тѣла: въ животѣ, пахахъ, подъ мышками и наконецъ вездѣ.

Раздѣленіе. Явленія, которыми обнаруживается золотуха, бываютъ различны, смотря по тому, будетъ ли она съ воспаленіемъ (воспалительная) или, напротивъ, безъ воспаленія (холодная).



А. Видоизмѣненія воспалительной золотухи слѣдующія: 1) *ячмень*, который есть пасочное воспаление вѣкъ, переходящее въ нарывъ, имѣющій видъ ячменнаго зерна, содержащій густой, очень слизистый гной (бываетъ единственно у взрослыхъ людей, иногда, по видимому, совсѣмъ не золотушныхъ). 2) *Дѣтскій цвѣтъ* — крупная, бугорчатая, красная, обнаруживающаяся преимущественно на спинѣ, груди и конечностяхъ, сыпь и переходящая въ тонкое постоянное острупеніе, — свойственная одно — или двугодичнымъ дѣтямъ, имѣющимъ воспалительно-золотушное расположеніе. 3) *Свинуха*, которая есть ни что иное, какъ воспалительная опухоль клубовидныхъ желѣзъ шейныхъ, особливо подчелюстныхъ, оттого шея такихъ больныхъ, уравниваясь толстотою своею съ нижнею челюстію, обнаруживаетъ сходство съ шею свиньи (бываетъ у полныхъ, съ живымъ цвѣтомъ лица). 4) *Сучье-вымя*, которое есть опухоль подмышечныхъ желѣзъ, распространяющаяся въ околележащую глѣтчату и чрезвычайно трудно переходящая въ нагноеніе. 5) *Парши* (шолуди), которые ни что иное какъ бѣлыя пасочныя воспаленія, образующіяся на волосистой части головы и чаще на темени, скоро переходящія въ поверхностное нагноительное раствореніе и быстро покрывающіяся болѣе или менѣе толстыми мокнувшими рыхлыми бѣлыми и желтыми струпами, въ которыхъ въ короткое время у самыхъ даже опрятныхъ людей распложаются вши (у полныхъ безъ живаго цвѣта лица). 6) *Молочный струпуз* (гора), который есть поверхностное пасочное воспаленіе кожи, являющееся преимущественно на лицѣ у дѣтей до 7 и 10 лѣтняго возраста и скоропостижно переходящее въ пасочное отдѣленіе, превращающееся или въ бѣловато-желтоватый, или, что чаще, въ буроватый струпуз (бываетъ у дѣтей худощавыхъ). 7) *Заусеница*. Это есть непрерывное растрескиваніе и отслаиваніе кожицы, окружающей корни ногтей, сопутствуемая болѣе или менѣе явственнымъ воспалительнымъ ея состояніемъ. 8) Слизетеченіе изъ ушей, называемое по просту *ушной недугъ*. 3) *Зашейница* или *подзатыльница* — поверхностное пасочное воспаленіе кожи, являющееся на верхней и задней части шеи (подъ затылкомъ), также по бокамъ ея, нерѣдко до самыхъ ушей, у дѣтей до 7 и 10-ти лѣтняго возраста, скоропостижно переходящее въ пасочное отдѣленіе, тягучестию, липкостію, густотою и цвѣтомъ похожее на медъ, и превращающееся въ буроватые сливные струпузъ.

Б. Видоизмѣненія холодной золотухи слѣдующія: *Вздутый, полный, твердый животъ*, какъ признакъ заваловъ въ брыжечныхъ желѣзахъ кишекъ, при сопутствующей, болѣею частью, пухлости всего тѣла. 2) *Лимфатическія опухоли*. 3) *Зобъ на шею*. 4) Наросты, опухоль и искривленія костей, или *англійская болѣзнь*. Въ высшей степени своего развитія, золотуха сказывается сухоткою (собачью старостию у дѣтей), бугорчатою чахоткою, водянкою въ головѣ или животѣ, ракомъ на губахъ и лицѣ, костоѣдою. Въ этихъ видахъ золотуха дѣлается смертельною, но въ прежде вычисленныхъ формахъ она проходитъ съ

молодыми лѣтами, или же продолжается во всю жизнь, дѣлаясь привычною болѣзнію.

Причины внутреннія, предрасполагающія къ золотухѣ, состоятъ въ недостаткѣ дѣятельности пасочной системы и въ пасочномъ качествѣ какъ крови, такъ и вообще всей матеріи тѣла, въ которой впрочемъ въ золотухѣ воспалительной присоединяется еще и видимое преизобиліе красильнаго вещества крови. Такое предрасположеніе можетъ быть и случайнымъ, по вліянію постоянно дѣйствующихъ причинъ внѣшнихъ и наслѣдственнымъ, переходящимъ отъ родителей, одержимыхъ природною золотухою, но, большею частію, бываетъ врожденнымъ по причинѣ ослабленія ихъ возрастомъ, распутствомъ, любострастною болѣзнію, и притомъ нерѣдко такъ, что многія дѣти рождаются съ явственными признаками, какъ-то: съ красными и отвердѣвшими вѣями, съ толстыми переносицею и верхнею губою, съ отвердѣвшею брыжейкою, съ отолстѣвшею подкожною клѣтчаткою и съ опухолями клубовидныхъ желѣзъ.

Прим. По внутреннимъ причинамъ золотухѣ подвержены болѣе горожане, чѣмъ поселяне.

Причины внѣшнія (производящія) составляютъ все условія, ослабляющія дѣятельность пасочной системы и способствующія вмѣстѣ съ тѣмъ скопленію сгущаемой пасоки въ тѣлѣ, какъ-то: большая кормилица (мать или другія), искусственное кормленіе ребенка; нечистый, спертый, сырой воздухъ дѣтскаго жилища; худая, не свѣжая, трудноваримая, мучная, вязкая пища, особенно въ первые годы младенца (сырой хлѣбъ, пироги, блины, картофель и проч.); употребленіе дѣтми водки; неопрятное содержаніе дѣтей, когда съ нихъ не снимаютъ замараннаго, мокраго бѣлья, не обмываютъ тѣла, рѣдко купаютъ въ ваннѣ (крестьянскія дѣти преимущественно по вліянію этихъ трехъ причинъ, т. е. дурнаго воздуха, пищи и питья и неопрятнаго содержанія, подвергаются золотухѣ); сидячій образъ жизни и недостатокъ движенія на открытомъ воздухѣ; (оттого все фабричныя, работающіе сидя, торговаша, сидящіе въ лавкахъ и прилавкахъ, пряхи, мотальщицы и все женщины и мастеровыя, ведущіе сидячую жизнь, подвержены этой болѣзни); раннее занятіе умственныхъ способностей науками; скопленіе слизи; кислоты въ желудкѣ, глисты, частые запоры на низъ; употребленіе сонныхъ капель, чая изъ маковыхъ цвѣтовъ и головокъ для усыпленія безпокойныхъ дѣтей.

Прим. По причинамъ внѣшнимъ золотухѣ подвержены болѣе поселяне, чѣмъ горожане.

Сущность золотухи, какъ и ея предрасположенія, или золотушной почвы, состоитъ въ ослабленной дѣятельности пасочной системы и въ преизобиліи сгущенной пасоки, какъ во всехъ частяхъ тѣла, такъ особенно въ плототворительной матеріи; при чемъ дѣйствіе органовъ пищеваренія и питанія, какъ-то: желудка и кишекъ, бываетъ усилено, а дѣйствіе дыханія, кругообращенія и кровотворенія ослаблено; по-

сему золотушный больной бываетъ, такъ сказать, заваленъ питательнымъ сокомъ, пасокою, слизью и терпитъ недостатокъ въ хорошо выработанной, оживляющей крови, которая, напротивъ, бываетъ блѣдна, вязка и слизиста. Этотъ сокъ, слизь и пасока, скопляясь, застаиваются, портятся, густѣютъ и засоряютъ свои сосуды и желѣзы, а потомъ и другіе органы, причиняя различныя сказанныя болѣзни въ наружныхъ и во внутреннихъ частяхъ тѣла; изъ нихъ послѣднія всегда опаснѣе первыхъ, т. е. наружныхъ.

Распознаваніе золотухи по свойственнымъ вышеописаннымъ ея признакамъ очень *легко*.

Предсказаніе, относительно опасности для жизни, въ золотухѣ зависитъ: 1) отъ важности преимущественно страждущихъ органовъ, напр. при затвердѣніи брыжейки, легкихъ, предсказаніе *невыгодно*; 2) отъ степени развитія и распространенія болѣзни; 3) отъ качества сопутствующихъ болѣзненныхъ условій. Относительно продолжительности болѣзни оно зависитъ: 1) отъ степени предрасположенія; 2) отъ степени удаляемости причинъ производящихъ; 3) отъ степени развитія болѣзни, иногда и отъ качества ея: холодная золотуха гораздо продолжительнѣе, нежели воспалительная, и лѣченіе первой труднѣе, нежели лѣченіе послѣдней.

Замѣчено, что золотуха ежегодно съ оживленіемъ природы весной, подобно цынгѣ, любострастной болѣзни, пострѣлу, подагрѣ и другимъ болѣзнямъ, зависящимъ отъ крови и соковъ, — усиливается, равно какъ и при полнолуніи.

Исходы. Въ *здоровье*, при существующемъ предрасположеніи, переходитъ не иначе, какъ только при дѣятельномъ и точномъ искусственномъ пособіи. Въ отсутствіе же предрасположенія, болѣзнь легко проходитъ сама собою, съ удаленіемъ причинъ производящихъ. Кромѣ того вообще золотуха воспалительная излѣчивается гораздо легче и съ теченіемъ лѣтъ сама собою уничтожается скорѣе, нежели холодная. *Болѣзни*, въ которыя переходитъ золотуха, видны изъ предъидущаго описанія высшаго ея развитія. *Смертью* золотуха оканчивается при посредствѣ тѣхъ болѣзней, въ которыя она переходитъ.

Лѣченіе золотухи очень затруднительно и должно быть весьма продолжительно — мѣсяцы и годы, потому что здѣсь нужно, съ одной стороны, удаливъ изъ тѣла скопившуюся слизь и пасоку, предотвратить ихъ новое скопленіе, а съ другой усилить кровотовереніе для превращенія питательнаго сока, слизи и пасоки въ настоящую кровь. Для этого служить: приличная діета и такъ называемыя противузолотушныя лѣкарства.

Лѣченіе діететическое. Предохраненіе золотушно-расположеннаго ребенка отъ золотухи основывается на удаленіи причинъ, усиливающихъ сангвиническій и пасочный темпераментъ и на приведеніи его въ положеніе, способствующее развитію холерическаго темперамента, т. е. все то, что вредитъ холерику, полезно флегмати-

ку и золотушному. 1) *Пища*. При золотушномъ тѣлосложеніи матери, для ребенка совѣтовать достаточнымъ выбрать *здоровую кормиллицу* изъ деревенскихъ женщинъ съ смугловатымъ цвѣтомъ кожи, черными, или по крайней мѣрѣ, темнорусыми волосами, но не бѣлогурую и свѣлорусую, а еще хуже рыжую; съ продолговатымъ лицомъ и острымъ носомъ, которая во все время кормленія грудью младенца должна употреблять питательную, крѣпительную, легко варимую пищу, воздерживаться отъ спиртныхъ напитковъ, но пить горькое пиво, имѣть достаточное тѣлодвиженіе на свободномъ воздухѣ, воздерживаться отъ душевныхъ возмущеній; младенца нужно кормить грудью полгода, а потомъ приучать его къ искусственному питанію особенно животною, мясною пищею, цыплячьимъ супомъ съ корочкою бѣлаго хлѣба, или съ сухаремъ и съ кровочистительными корнями растений—морковью, петрушкою, спаржею, кервелемъ и проч. На 8—9-мъ мѣсяцѣ можно давать ребенку твердую пищу, кусочекъ жаренаго цыпленка, индѣйки, барашка, телянка, голубя, рябчика, телячью студень. Пища должна легко и скоро перевариваться въ желудкѣ, не производить запора, поноса, колики, вѣтровъ, кислоты; не нужно давать дитяти мягкаго, особенно бѣлаго сдобнаго хлѣба, но черствый: также не кормить его стручковыми овощами, капустою, картофелемъ и проч., которые заражая кислоту и вѣтры въ желудкѣ, очень вредны для младенца; не кормить его разомъ слишкомъ много, но часто и по немного (это тѣмъ нужнѣе, что золотушные дѣти очень обжорливы); имъ полезны: студень, саго, яйца въ смятку и съ курицею, особенно при кислотѣ и поносѣ. Для питья маленькимъ дѣтямъ полезна яичная вода (одинъ желтокъ, растертый въ фунтѣ воды съ сахаромъ), легкое пиво, а при поносѣ отваръ бѣлыхъ сухарей съ желткомъ; по временамъ можно давать ложечку стараго хорошаго вина съ водою, сахаромъ и яичнымъ желткомъ. 2) *Воздухъ, движеніе*. Золотушно-расположенный долженъ находиться, сколько можно чаще и долѣе, на открытомъ воздухѣ, жить въ свѣтлой, просторной и сухой комнатѣ, обращенной на юговостокъ. Деревенская жизнь въ мѣстахъ нагорныхъ, у сосноваго лѣса, есть для этого наилучшая; имѣть постоянно ежедневное движеніе столько, сколько позволяютъ силы, даже въ вѣтряное время, и предаваться разнымъ играмъ и занятіямъ. Груднаго младенца почаще нужно выносить на воздухъ и усыплять его на солнцѣ, или заставлятъ его ползать по теплomu и сухому песку, снявъ съ него даже рубашечку. *Солнечныя ванны*, посредствомъ морскаго песка, или и простаго, напитааннаго растворомъ поваренной соли, высушеннаго и нагрѣтаго солнцемъ, для золотушныхъ очень полезны; зимою эти ванны можно замѣнить отчасти содержаніемъ голаго дитяти у пылающаго камина и обсыпаніемъ его *теплымъ пескомъ*, нагрѣтымъ въ печкѣ, причемъ нужно растирать тѣло дитяти фланелью, суконками, ароматнымъ спиртомъ. 3) Обычай у простолюдиновъ не пускать или не брать съ собою золотушныхъ дѣтей въ баню, когда въ ней слишкомъ много бываетъ пара, либо жара,

конечно имѣть свою пользу; но по неимѣнію у себя другаго средства къ соблюденію тѣлесной чистоты, о которой они такъ мало заботятся, не черезъ чуръ парная баня составляетъ для нихъ необходимую потребность во всякое время, исключая лѣтней поры, когда купаніе въ рѣкѣ можетъ дѣлать тоже или еще и болѣе, укрѣпляя собою расслабѣвшій отъ болѣзни тѣлесный составъ. *Опрятность.* Чистоплотность и опрятность необходимы для золотушнаго дитяти. Ежедневно нужно обмывать его тѣло чистою водою, уменьшая постепенно теплоту ея, и притомъ тереть фланелью или губкою вдоль спинки, по брюшку, груди и суставамъ; это треніе у слабыхъ дѣтей замѣняетъ движеніе, разжижаетъ соки и разрѣшаетъ застои желѣзъ. Еще сильнѣе дѣйствуетъ сухое треніе фланелью, окуриваніе смолистыми парами; 2—3 раза въ недѣлю купать младенца въ тепловатой ваннѣ съ солью и потомъ натирать его спиртомъ; не оставлять его лежать въ замаранномъ бѣльѣ, но перемѣнять послѣднее послѣ всякаго испражненія; эту чистоплотность должна соблюдать и дѣтская прислуга (у богатыхъ, у владѣльцевъ деревень и ихъ управителей), особенно кормилица, относительно самой себя и дѣтской комнаты, посуды, кровати и проч. Дѣтская постель должна быть умѣренно жесткая и состоять изъ тюфяка, набитаго шерстью, и перинной подушки; эта постель мало удерживаетъ въ себѣ сырости и не вынуждаетъ пота у дитяти. Не начинать рано учить его ходить, потому что члены его, не смотря на ихъ объемъ, не имѣютъ еще нужной твердости и медленно окостѣневаютъ; это нужно соблюдать тѣмъ болѣе, чѣмъ явнѣе дитя показываетъ отъ ходьбы отвращеніе и упрямится становиться на ноги; иначе у него искривятся спина и ноги. 4) *Совѣтъ родителямъ* настоящихъ и будущихъ дѣтей. Прилично и похвально священнику внушать, чтобы, для благополучія дѣтей своихъ, отцы и матери, страдающіе золотухою, непремѣнно старались освободиться отъ нея, а еще достойнѣе для него будетъ, если онъ, видя вполне развитое золотушное состояніе въ молодыхъ людяхъ, вступающихъ въ бракъ, объяснивъ имъ съ участіемъ зло, угрожающее ихъ будущимъ дѣтямъ, дать имъ настоятельный совѣтъ предварительно освободить себя отъ этой болѣзни. 5) Для фабричныхъ, работающихъ сидя, торгашей и торговцевъ, сидящихъ въ лавкахъ и прилавкахъ, пряхъ, мотальщицъ и всѣхъ женщинъ и мастеровыхъ, ведущихъ сидячую жизнь, изложены особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лѣченіе существенное. Вообще при лѣченіи золотухи нужно наблюдать слѣдующія правила: 1) Прежде всего больному и врачующему нужно запастись особымъ терпѣніемъ и продолжать лѣченіе мѣсяцы и даже годы. 2) Спокойно наблюдать за ходомъ болѣзни и дѣйствіемъ лѣкарствъ: не отчаяваться при мнимомъ бездѣйствіи послѣднихъ и не страшиться появленія новыхъ болѣзненныхъ перемѣнъ. 3) Обращать вниманіе на возрастъ — періодъ тѣлеснаго развитія; лѣкарства, употребленные прежде безъ пользы, съ приближеніемъ времени возмужалости вдругъ начинаютъ дѣйствовать съ видимымъ успѣхомъ.

4) Разъ назначенныя лѣкарства употреблять долго, и потомъ перемѣнять ихъ другими. 5) По прекращеніи употребленія одного лѣкарства, прежде чѣмъ приступлено будетъ къ другому, нужно оставлять больного на 1—2 недѣли безъ всякихъ лѣкарствъ, но ни въ какомъ случаѣ не прекращать діеты. 6) Особенно весною нужно начинать и усиливать лѣченіе. 7) Но когда силы и продолжительность времени въ теченіе золотухи позволяютъ лѣчиться по совѣту врача, хотя бы онъ былъ далеко отъ жительства страждущихъ ею больныхъ, то во избѣжаніе ошибки и недоразумѣнія благоразуміе требуетъ совѣтовать имъ лучше — обращаться къ нему, потому что онъ можетъ въ такомъ случаѣ распорядиться лѣченіемъ такъ, чтобы оно шло своимъ порядкомъ, какъ заведенные часы.

Противузолотушныя, простыя, большею частію употребляемыя средства, составляютъ кровочистительныя, плотоперемѣняющія лѣкарства, какъ то: калиновые и черемуховые молодые побѣги (отпрыски), соки калиновыхъ зрѣлыхъ ягодъ и самыя ягоды, употребляемыя поселянами въ зимнее время, какъ довольно вкусное и полезное для нихъ кушанье; трехцвѣтная фіалка (иванъ да марья, анютины глазки) череда, бѣлокопытникъ (мачиха), употребляемые какъ чай; корень песочной осоки, лопушника и хмѣля въ отварахъ, приготовляемыхъ по сельскому способу увариванія дорогой травы въ кувшинахъ, замазанныхъ хлѣбнымъ тѣстомъ и ставимыхъ въ вольную печь, вскорѣ по вынутіи изъ нея испекшихся хлѣбовъ, даже и дорогая трава (сарсапарель). Очень дѣйствительны весною свѣже-выжатые соки растений: одуванчика, пырея, цыборея, подбѣла (мать-мачихи), которые ежедневно даются по утрамъ дѣтямъ, по рюмкѣ и по стакану въ жидкомъ бульонѣ или супѣ; ванны муравейныя, съ душистыми ароматическими травами, напр. мятою, ромашкою, шалфеемъ, божьимъ деревцомъ, богородскою травою, чабромъ, полыною, душицею и т. п., также съ вязовою, дубовою, вербовою корою. Въ новѣйшее время начали употреблять въ золотухѣ съ успѣхомъ жиръ трески рыбы (ворвань), его даютъ дѣтямъ ежедневно 2—3 раза въ день по чайной или десертной ложкѣ, а взрослымъ по столовой. Разныя сѣрныя минеральныя воды, какъ то: кавказскія, сергіевскія и другія, существующія въ нашемъ отечествѣ, какъ то: солигаличскія (Костромской губ.) адрианонопольскія (Тверск. губ. Осташковскаго уѣзда) равнымъ образомъ сакскія сѣрныя грязи (въ Евпаторіи); астраханскія; во всѣхъ этихъ мѣстахъ цѣлебныхъ источниковъ природы есть заведенія и врачи, къ совѣтамъ которыхъ и должны прибѣгать всѣ ищущіе врачевой помощи отъ золотушныхъ недуговъ. Молодые *калиновые отпрыски* въ началѣ лѣта и подъ исходъ осени собираются, нѣсколько провяливаются на солнцѣ и хранятся связанные въ пучки, въ тѣнистомъ прохладномъ мѣстѣ впредь до требованія. Въ случаѣ, не терпящемъ ни малѣйшаго отлагательства, изрѣзавъ отпрыски на мелко, наполняютъ ими, тотчасъ по отнятіи отъ дерева сучковъ, почти цѣлую четверть горшка средней величины, а остальныя три четверти доливаютъ водою,

приставляютъ горшокъ къ челу протапливающейся печи, и дожидаются. пока въ немъ убавится на вершокъ жидкости; тогда прибавляютъ чистаго меда, либо патоки, три или четыре хлебальныхъ ложки и даютъ прокипятить одинъ разъ; послѣ этого, отнявъ горшокъ отъ печи и нѣсколько прохладивъ, сливаютъ сыропную жидкость въ кружку, либо въ чашку, изъ которой, по совершенномъ охлажденіи, даютъ больному по хлебальной ложкѣ, раза два въ день, или, смотря по степени возраста, и чаще, по рюмкѣ, и даже по полустакану. Въ приготовленіи этого отвара калиновыхъ побѣговъ, не всѣ изъ простолюдиновъ поступаютъ одинаковымъ образомъ: большая часть изъ нихъ замазываютъ хлѣбнымъ тѣстомъ горшокъ, въ которомъ припасается отваръ (декоктъ). и оставляютъ въ немъ калиновые побѣги прѣть чрезъ цѣлую ночь въ нагрѣтой печи. Зажиточные и пригородные крестьяне берутъ на этотъ предметъ *калиновыя сырыя ягоды*, на полфунта которыхъ кладутъ чистаго леденца 4 золотника, *листоваго золота* 2 листа и прибавляютъ хорошаго краснаго, извѣстнаго у нихъ подъ именемъ *церковнаго, вина* полбутылки. Помѣстивъ все это въ муравленомъ горшкѣ, обвязываютъ его чистымъ полотномъ, замазываютъ хлѣбнымъ тѣстомъ и ставятъ въ печь, при легкой степени тепла, на четыре часа, по истеченіи которыхъ слитую жидкость даютъ дѣтямъ отъ 3-хъ до 10-ти лѣтъ, по чайной ложкѣ, нѣсколько разъ въ день, такъ чтобы въ продолженіе сутокъ выходила цѣлая чайная чашка для взрослыхъ дѣтей. Средство это можно почесть обще-народнымъ; оно съ давняго времени не составляетъ уже секрета весьма малаго числа простыхъ лѣкарокъ, которыя начали употреблять его въ описываемой болѣзни гораздо прежде, нежели во Франціи опубликованы были опыты д-ра Кретвена о пользѣ золотыхъ обисей въ этой же болѣзни и нѣкоторыхъ другихъ. По этому, по содержащемуся въ этомъ отварѣ листовому золоту, онъ заслуживаетъ особеннаго вниманія и стоитъ того, чтобы быть поставленнымъ на ряду съ прочими полезными средствами въ народной медицинѣ. *Черредою* пользуется не только простой народъ, но къ ней прибѣгаютъ очень многіе изъ высшаго сословія, соединяя ее нерѣдко для большаго дѣйствія съ травами: *иванъ и марья, блокопытникомъ* (мачихою) и *корнями лопушнымъ* или *сарсарелнымъ*. Обыкновенно на стаганъ кипяченой воды берутъ этого сбора, или одной череды, двѣ добрыхъ щепоти, настаиваютъ: бѣдные въ махоточкѣ или горшечкѣ на легкомъ огнѣ, а богатые въ чайникѣ на самоварѣ; по прошествіи  $\frac{1}{4}$  часа сливаютъ жидкость и даютъ пить ее съ медомъ, или съ сахаромъ, утромъ и вечеромъ по чайной чашкѣ или по стаканчику. Тамъ, гдѣ при безлѣсіи трудно доставать калину и ея побѣги, череда заступаетъ ея мѣсто; при недостаткѣ же этой травы, прибѣгаютъ къ лопушному корню, крѣпкой отваръ котораго принимаютъ внутрь, раза четыре въ день по полустаканчику, а снаружи, при сыпяхъ на головѣ и по тѣлу, имъ же, по нѣсколькы разъ въ сутки, умываютъ (мочатъ) эти части. Средняго класса люди и пригородные поселяне, предпочитая всѣмъ дру-

гимъ средствамъ корень сарсапарели, готовятъ изъ него съ водою взваръ, по принятому ими способу для сифилитической болѣзни, или дѣлаютъ изъ него съ простымъ виномъ настойку и употребляютъ какъ то, такъ и другое, въ тѣхъ же пріемахъ и съ тѣми же осторожностями на счетъ діеты, какъ и въ самой сифилитической болѣзни. Между простонародными средствами противъ золотухи *бодяга* занимаетъ не послѣднее мѣсто; для этого ее приводятъ въ мелкій порошокъ и даютъ отъ половины до цѣлаго золотника въ сутки съ водою, пивомъ, квасомъ и посыпая на хлѣбъ. Бодяга у простаго народа служитъ въ замѣнъ *грецкой губки*, даваемой, по пережженіи ея, врачами для разбитія золотушныхъ опухолей. *Дубовыя желуди* могутъ заступитъ мѣсто дорогой хины тамъ, гдѣ дѣло идетъ объ укрѣпленіи больнаго, а потираніе всего тѣла свѣжими *березовыми вѣтвями* въ легкомъ банномъ духу соотвѣтствуетъ своимъ дѣйствіемъ ароматическимъ ваннамъ богатыхъ людей. *Горючая стра*, извѣстная и простому народу своею пользою въ чесоткѣ, дается имъ въ золотушныхъ сыпяхъ въ молотѣ или съ хлѣбомъ (посыпая на него), по цѣлому золотнику въ сутки. Знакомые со способомъ лѣченія золотухи мѣщанина Аверина для разбитія желѣзистыхъ золотушныхъ опухолей, прибѣгаютъ ко втиранію въ нихъ меркуріальной мази его \*).

Снаружи золотушныя опухоли можно покрывать *бѣличимъ, заячьимъ мѣхомъ, хлопчатой бумагою, мыльнымъ пластыремъ*. Впрочемъ опухоли проходятъ сами, при внутреннемъ лѣченіи золотухи; и если будетъ замѣчено, что кожа надъ ними начинаетъ измѣняться въ цвѣтъ и угрожать переходомъ опухолей въ нарывы и язвы; то надобно оставить всѣ наружныя средства, а покрывать только опухоли заячьимъ мѣхомъ, потому что золотушныя язвы всегда хуже для больнаго, чѣмъ опухоли.

Лѣченіе *ячменя* всегда должно быть нагнаивающее и всегда лучше производится напередъ средствами раздражающими, а потомъ смягчительными. Ячмень иногда переходитъ въ нагноеніе очень скоро — въ однѣ сутки, и тогда гной его бываетъ густой, желтый; чаще однако въ немъ нагноеніе происходитъ медленнѣе — чрезъ недѣлю. Онъ есть то самое въ вѣкѣ, что вередъ въ другомъ мѣстѣ тѣла, и потому ячмень, подобно вереду, заживаетъ послѣ выхода стержня — густаго, плотнаго, сыровиднаго гноя. Для произведенія въ немъ раздражающаго нагноенія должно напередъ положить на него маленькую, соотвѣтственно величинѣ его, *медовую лепешечку* (№ 24), а потомъ, какъ скоро произойдетъ надлежащее воспаленіе въ страждущемъ мѣстѣ, перемѣнить эту лепешечку на другую, болѣе смягчительную, состоящую изъ *личныхъ желтковъ, сока меда и пшеничной муки* (№ 210).

Прим. Простолюдины мажутъ ячмень на глазу натошакъ слюной или утренней росой, дѣлаютъ также много затѣйливыхъ штукъ, напр.

\*) Др. Здр. 1837 г. № 34, стр. 238 и 239.



должно уколоть ячмень зерномъ ячменя и бросить зерно это курице, обвести ячмень три раза обручальнымъ кольцомъ, приговаривая: «во имя Отца и Сына и Св. Духа;» или подавить ячмень кольцомъ, поцѣловать глазъ и плюнуть; повѣсить передъ глазомъ иголку на ниткѣ и ходить съ нею цѣлый день, что дѣлають обыкновенно бабы, прицѣпляя нитку къ платку на головѣ; первый. или послѣднорожденный изъ сестеръ или братьевъ долженъ показать ячменю, глазъ на глазъ, букишь и сказать: «ячмень, ячмень, вотъ тебѣ букишь, что хочешь то и купишь; купи себѣ топорокъ, пересѣкися поперегъ,» а потомъ провести по ячменю пальцемъ и проч.

Лѣчение дѣтскаго цвѣта требуетъ наружнаго употребленія средствъ мягчительныхъ въ соединеніи съ легкими ароматическими. Для этого полезно ежедневно употреблять *теплія ванны* въ 27 и 28° по Реом. съ полуфунтомъ *троецвѣтной фиалки* (иванъ да марья, анютины глазки) и съ четвертью фунта *мяты*, либо *душицы*, либо простой *ромашки*; также ванны изъ *пшеничныхъ отрубей* съ верхушками *донника* (первыхъ  $\frac{1}{2}$ , а послѣднихъ  $\frac{1}{4}$  фунта на ванну). Отруби и донникъ предварительно настобать кипяткомъ и потомъ процедить съвозъ частую ветошку, иначе отруби легко будутъ пробѣгать и, приставая къ сыпи, производятъ зудъ. *Квасная согрѣтая гуща*, *молодая барда* составляютъ также полезную ванну. Если дѣтскій цвѣтъ сопровождается спялымъ зудомъ, то достаточные люди могутъ прибавлять въ ванну *сырную печенку*, а еще лучше *сырное молоко*, для полугоднаго ребенка первой до 2-хъ, а втораго до 1-го золотниговъ, бѣдные же могутъ у своихъ дѣтей помачивать эту болѣзнь съ зудомъ *дегтярною водою* (№ 70), особенно передъ тѣмъ, какъ сажать ихъ въ ванну,

Лѣчение свинухи бываетъ двоякое: 1) разрѣшающее и 2) нагнаивающее. Для разрѣшенія свинухи прикладываютъ къ отвердѣвшимъ желѣзамъ *пластырь лотика* и *подсыжныхъ цвѣтцовъ*, взятый изъ аптеки по рецепту, соединенный съ равнымъ количествомъ млотнаго пластыря, и носятъ это постоянно долгое время. Такому разрѣшающему лѣченію очень много способствуетъ употребленіе средствъ отвлекающихъ на плечевыя части, на которыхъ полезно для этого по временамъ производить втираніе *аутенритовой нарывной мази* (№ 79), состоящей изъ рвотнаго камня, взятаго изъ аптеки по рецепту, и свиного сала, до появленія на нихъ высыпанія въ видѣ прыщей, величиною съ горошину. Въ случаѣ сильнаго раздраженія при этомъ нужно помазывать прыщи льнянымъ и деревяннымъ масломъ. Лѣчение свинухи нагнаивающее бываетъ нужно только тогда, когда сама природа показываетъ наклонность къ нагноенію; въ противномъ же случаѣ никогда производить его не должно: 1) потому что оно оставляетъ непріятныя рубцы, 2) потому что производитъ иногда очень упорное изъязвленіе, не уступающее никакимъ средствамъ, и такимъ образомъ переходящее въ привычное состояніе, которое уже послѣ излѣчить нельзя. Лучшимъ изъ простыхъ нагнаивающихъ средствъ, для прикладыванія къ больнымъ желѣзамъ съ цѣлью на-

гноенія, можно считать *лепешку*, состоящую изъ *личныхъ свѣжихъ желтковъ, меда и пшеничной муки* (№ 210). При этомъ средствѣ опухоль не только не распространяется, какъ большею частію бываетъ при употребленіи другихъ нагнаивающихъ мазей, но еще уменьшается и повышается всегда конусообразною верхушкою \*). Прикладываніе этой мази должно быть продолжаемо до тѣхъ поръ, пока нагноенная часть совсѣмъ не заживетъ.

**З а м ѣ ч.** Въ народѣ употребляется для излѣченія этой болѣзни особаго рода магнетизмъ. Чтобы пріобрѣсть магнетическую силу исцѣлять однимъ прикосновеніемъ перстовъ, или поглаживаніемъ, воспаленныя подчелюстныя желѣзы, или такъ называемыя «свинки,» должно, по мнѣнію народному, задушить живаго крота двумя пальцами, или, какъ учатъ другіе, зарѣзать крота, вымазать руки кровію и сутки не мыться; при этомъ будто бы непременно нужно соблюсти то, чтобы кротъ былъ русскій черный, иначе, говорятъ, пользы не будетъ.

Лѣченіе сучьяго вымя въ сильномъ воспалительномъ его состояніи требуетъ одинаковаго нагнаивающаго лѣченія какъ и свинухи, т. е. прикладыванія *мягчительной лепешки* (№ 210); но если сучье вымя будетъ имѣть мало характера воспалительнаго, что нерѣдко бываетъ, въ такомъ случаѣ требуются совсѣмъ другія средства, чѣмъ тѣ, которыя употребляются во всѣхъ прочихъ болѣзняхъ для произведенія нагноенія, а именно острые и смолистыя. Взявъ *скипидару желтаго* или *ельвой смолы* по 7-ми золотниковъ, *горчицы* и *лиственъ лютлика* или *подснѣжныхъ цвѣткѣ* столько, сколько понадобится, соединить всѣ эти средства для составленія лепешки, и намазавъ ее на холстинку, прикладывать къ страждущей части. Если этихъ средствъ будетъ недостаточно, то должно совѣвать внутреннее употребленіе вышеозначенныхъ противозолотушныхъ средствъ, ослабляющихъ преимущественно плотворительность.

Лѣченіе паршей (шолудей). Шолуди свойственны дѣтямъ и происходятъ отъ неопрятности или теплаго содержанія головы, золотушнаго расположенія; они чаще встрѣчаются въ Малороссіи и Бѣлороссіи. Съ тѣхъ поръ, какъ начали стричь волосы и водить дѣтей съ открытыми головами, шолуди замѣчаются рѣже. Простолюдины, для избѣжанія отдачи въ рекруты, прививаютъ себѣ искусственно парши, надѣвая шапки паршивыхъ людей. По этому прежде всего надобно остричь волосы, но не очень низко, чтобы не простудить головы, потомъ чаще обмывать голову молодымъ, слегка посоленнымъ квасомъ, либо отваромъ лопушника, репейника, сосновыхъ шишекъ, девясилаго корня (который лучше отваривать въ такомъ же квасу), настоемъ череды, трехцвѣтной фіалки (иванъ да марья, аютины глазки), съ прибавкою табаку. Эти же средства умерщвляютъ и вшей. Толстыя струпыя размачивать *теплымъ мыломъ, мыльною водою*, также *льнянымъ масломъ, свѣжимъ топле-*

\*) Дядьковскій. Практ. Мед. Книга 7-я стр. 433.

*нымы свинымъ жиромъ*; толстыя струнья также смягчаются отъ прикрытія ихъ толстымъ *листомъ свѣжей* или квашенной *капусты*, *ломтлями* изъ цѣльной *свеклы*; по спаденіи струньевъ шолуди лѣчатся втираніемъ въ язвенную, красную лысину *льняного, деревяннаго масла, свиного жира*; внутрь: 1—2 раза въ недѣлю давать *слабительное* изъ *огуречнаго разсола* (№ 7), *толокна* (№ 72), *коры крушины* (№ 74), *ревеня* (№ 176), *магнези* и т. п., пить отваръ изъ *молодыхъ сосновыхъ шишекъ, лопушника, осоки, дорогой травы* (сарсапареля) и ходить чаще въ баню. Въ застарѣлыхъ упорныхъ шолудяхъ нужно удалить испортившіеся корни волосъ, если они сами не выпали. Для этого узкія *тесемки липкаго пластыря* (который можно приготовить изъ простой смолы, растопленной, и смѣшанной съ мукою и потомъ намазанной на холстинку), вкладуются на шолудинное мѣсто головы и потомъ чрезъ 1—2 дня ежедневно слегка отдираются съ волосами; эту смолянкую лепешку съ мукою можно оставить на головѣ до тѣхъ поръ, пока она сама не отпадетъ, причемъ нерѣдко можно видѣть, что и шолуди зажили. Но если этихъ средствъ будетъ недостаточно, то полезно намазывать парши на головѣ одинъ, а много два раза въ день, мазью въ видѣ помады, состоящею изъ одного золотника *хлориновой извести* и 7-ми золотниковъ *топленнаго свиного либо бараньяго сала*, стертыхъ вмѣстѣ какъ можно тщательнѣе. Шолуди отъ этого скоро очищаются и совсѣмъ проходятъ. Я этимъ средствомъ нерѣдко вылѣчивалъ парши окончательно \*).

**Лѣченіе молочной коры.** Эта болѣзнь легко уступаетъ общему противузолотушному внутреннему лѣченію, а снаружи достаточно помазывать, какъ обыкновенно дѣлаютъ, топленнымъ *коровымъ* слегка посоленнымъ *масломъ*, а лучше несоленнымъ (сливочнымъ), смѣшаннымъ съ *ромашкою* (№ 229).

**Лѣченіе заусеницъ** требуетъ собственно постояннѣйшаго общаго внутренняго противузолотушнаго лѣченія, а снаружи прикладываютъ *мягчительную мазь*, состоящую изъ *свѣчнаго сала* и *крупчатой муки* (№ 149), также *стускъ* (№ 29) и т. п., для удержанія которыхъ на страдающихъ мѣстахъ концы пальцевъ должны быть обвертываемы или чистою тафтичкою, или, что еще лучше, рыбьими пузырями. Между тѣмъ страдающіе этою болѣзнію никогда не должны мыть рукъ обыкновенною водою, но или крѣпкимъ настоемъ изъ *трехцѣтной фиалки*; или по крайней мѣрѣ настоемъ изъ *отрубей*; и *эмульсія* зъ *миндальныхъ отрубей* для людей достаточныхъ составляетъ превосходное мягчительное умыванье.

**Лѣченіе слізетеченія изъ уха** должно состоять въ общемъ внутреннемъ употребленіи противузолотушныхъ средствъ, а снаружи нужно только промывать больное ухо или лучше чаще вытирать хорошенъко указательнымъ пальцемъ обвернутымъ чистою ветошкою, смоченною *мыльнымъ, ромашковымъ настоемъ, отваромъ корки дубовой, ивовой,*

\*) Сообщено мною въ Др. Здр. 1841 г. № 41. стр. 304.

*словой*; во всякомъ же другомъ случаѣ лѣченія осторожность требуетъ обратиться къ совѣту врача.

ЛѢЧЕНІЕ зашейниці или подзатыльницы, кромѣ внутренняго употребленія общихъ противузолотушныхъ внутреннихъ средствъ, требуетъ употребленія наружныхъ, очень цѣлбно дѣйствующихъ простонародныхъ средствъ, которыя мною непытаны, какъ-то: прикладыванія на страждущую часть *сметаны на дубовомъ листу*, *мази изъ ромашки съ сливочнымъ масломъ* (№ 229), а лучше частаго *присыпанія огнивомъ и кремнемъ* близко къ больному мѣсту, такъ чтобы искры сыпались и падали прямо на дряблые струнья болѣзни. Отъ этого послѣдняго средства болѣзнь часто и безъ внутренняго лѣченія проходитъ совершенно, безъ вредныхъ отъ того послѣдствій. Сверхъ того простолоудины *трутъ горшокъ обз горшокъ* и, смочивъ сыпь, какъ и лишай, *мажутъ ее этою грязью*. Тоже дѣлаютъ и при другихъ золотушныхъ сыпяхъ дѣтей.

ЛѢЧЕНІЕ золотухи холодной, какъ вообще, такъ и въ частности: 1) вздутаго, полнаго твердаго живота, какъ признака заваловъ въ брыжеечныхъ желѣзахъ; 2) пасочныхъ (лимфатическихъ) опухолей; 3) зоба на шеѣ \*); 4) англійской болѣзни, — какъ болѣзней очень трудныхъ къ излѣченію при всемъ искусствѣ самихъ врачей, требуетъ непосредственной помощи съ ихъ стороны.

## Лишай.

**О П Р Е Д ъ Л Е Н І Е.** Лишай есть собраніе множества маленькихъ свербучихъ пупырышковъ, имѣющихъ очень малое, или даже почти никакого возвышенія, въ видѣ болѣе или менѣе пространныхъ кружечковъ, занимающихъ лицо, руки, бедра и другія части тѣла.

**П р и з н а к и.** Маленькіе, кучами сидящіе пузырьки, окруженные краснымъ пятномъ, находящіеся на разныхъ частяхъ тѣла, причиняющіе то зудъ, то жжение и боль, то сухіе, чешуйчатые, т. е. покрытые тонкимъ струпомъ, какъ бы отрубями, то мокрые т. е. отдѣляющіе острую водянистую жидкость, покрытые толстыми струпьями, превращающіеся въ лишайныя обширныя язвы; изъ этихъ язвъ отдѣляется много ѣдкой, водянистой жидкости, растрavляющей сосѣднія, здоровыя части; обружность лишайной язвы бываетъ тверда. Лишай, подобно чесоткѣ, вообще есть продолжительная, но едва-ли заразительная, сыпь. Теченіе его неопредѣленно; онъ проходитъ въ нѣсколько дней, недѣль, и продолжается даже всю жизнь; возвращается на то же мѣсто, или на новое, или же, не превращаясь, переходитъ съ одного мѣста на другое, усиливается зимою и къ веснѣ и дѣлается легче лѣтомъ.

**Р а з д ѣ л е н і е (или видоизмѣненія).** Лишай бываетъ: 1) *Летучій*

\*) Въ простонародіи отъ зоба дѣлаютъ почти тоже, что отъ бородавки: прикладываютъ на ночь тайкомъ отъ другихъ кусокъ свиного сала, потомъ закапываютъ его, и зобъ будто бы долженъ исчезать по мѣрѣ того, какъ сало изгниваетъ.

(недотрога, нетронь меня). 2) *Прособранные*, или чешуйчатые. 3) *Отрубевидные* или мучнистые и 4) *Разъдающие*.

Причины внутрення. (предрасполагающія) суть: 1) порча соковъ и разстройство состава кожи, бывающіе врожденными (отъ неправильнаго содержанія матери во время ея беременности), и наследственными, переходящими въ потомство отъ родителей къ цѣлымъ семействамъ; 2) разстройство печени, неправильное отдѣленіе желчи; 3) золотуха; 4) геморроидальные приливы къ кожѣ; 5) неправильное мѣсячное очищеніе; 6) худосочіе, любострастное, цынготное и суставоломотное въ пальцахъ рукъ и ногъ (дактилагренное, называемое подагренымъ); и 7) старость, съ ея морщиноватою кожею, и задержаніе мочи.

Примѣч. По этимъ причинамъ подвержены бываютъ лишаямъ чаще горожане, чѣмъ поселяне.

Причины внѣшнія, производящія лишай, суть: 1) сырая холодная неопрятная комната, квартира, изба; 2) сырыя болотистыя страны, разстроивающія испарину кожи; 3) жесткая, неопрятная одежда; 4) сухой острый воздухъ (весною) и 5) сидячая жизнь.

Примѣч. По этимъ причинамъ подвержены бываютъ лишаямъ чаще поселяне, чѣмъ горожане, особенно хлѣбники или пекари хлѣба, скотники и скотницы, пастухи, стряпки. — кухарки и повара. крахмальщики, приготовляющіе крахмаль, кормилицы, фабричныя, работающіе сядя, торгаша и торговки, сядящія въ лавкахъ и прилавкахъ, пряхи, мотальщицы, и вообще всѣ женщины и мастеровые, ведущіе сядячую жизнь.

Сущность лишая состоитъ въ худокачественномъ питаніи и отложеніи болѣзненной, болѣе или менѣе острой матеріи на кожу.

Распознаваніе по вышеописаннымъ признакамъ *легко и удобно*.

Предсказаніе. Лишай есть вообще тягостная и упорная болѣзнь, но *бываетъ опасенъ* только тогда, когда сильно разстроиваетъ кожу, производитъ обширныя язвы, нагноеніе, пзнуреніе, или, скрываясь снаружи, бросается на внутреннія части. Первые два видоизмѣненія, какъ-то: лишай летучій и лишай отрубевидный легче, излѣчиваются, чѣмъ послѣднія два, которыя не уступаютъ иногда никакимъ лѣкарствамъ, особенно, если причиною ихъ были вышеозначенныя болѣзни.

Лѣченіе діететическое, состоящее въ удаленіи причинъ болѣзни, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Люди, подверженныя лишаямъ, или имѣющіе только къ нимъ расположеніе, *должны избѣгать всего того, что можетъ разгорячать кровь и портить соки*, они совсѣмъ не должны употреблять ничего соленого, копченого, провѣснаго или прянаго; воздерживаться отъ брѣвникихъ напитковъ и даже не пить воды съ виномъ. *Пища ихъ должна быть легкая, свѣжая, удобоваримая, усладительная и прохладительная*, наприм. сладкіе огородные овощи, мясо домашнихъ животныхъ, молоко, рисъ, пшено и крупа. 2) Имъ должно *чаще ходить въ баню, наблюдать чистоту тѣла и опрятность въ одеждѣ, также купаться или въ рѣкѣ, или въ ваннѣ*. 3) Они должны *дышать воздухомъ сухимъ и умеренно теплымъ, имѣть достаточное*

*тѣлодвиженіе и уклоняться отъ всѣхъ слишкомъ пристальныхъ и усидчивыхъ занятій.* 4) Привыкшіе къ употребленію обыкновеннаго чая лучше сдѣлають, если переѣхать его на русскій шалфей. 5) Для вышеупомянутыхъ рабочихъ поселянъ изложены сверхъ того особыя правила въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лѣченіе существенное, состоящее въ открытіи причинъ болѣзни, что очень трудно, въ поправленіи соковъ и возстановленіи доброкачественнаго питанія, что очень нужно и важно въ этой болѣзни, доступно и удачно бываетъ только у врачей, и то не всегда; по этому одержимымъ лишаеми всегда нужно обращаться къ нимъ. Они по своему усмотрѣнію обыкновенно дѣйствуютъ такъ: если больной до появленія лишаа страдалъ печенью, то лѣченіе направляютъ противъ завала печени. Если причина лишаа зависитъ отъ гемороя, что узнается по значительному зуду, краснотѣ, жару и боли въ лишаѣ, то даютъ *сыру съ кремортартаромъ* и другими противогеморoidalными средствами; это же оказывается полезнымъ и при неправильномъ мѣсячномъ очищеніи, какъ причинѣ лишаа, а снаружи простолюдины, съ большимъ успѣхомъ, употребляютъ въ этомъ случаѣ противъ лишаевъ слѣдующее средство: быстро *погасивъ зажженную смолистую лучину* изъ сосноваго дерева, происходящій потомъ *дымъ наводятъ на болѣзненное мѣсто*. Это средство, нѣсколько разъ повторенное, излѣчивало въ продолженіе 8 дней очень упорные лишаи на мошонкѣ и въ верхнихъ частяхъ ляшекъ \*). Вѣрнымъ и надежнымъ средствомъ противъ лишаевъ упорныхъ, продолжительныхъ, зудящихъ всякаго рода считается *дегтярно-ртутная народная мазь* (№ 222). Ее однако не всегда можно употреблять одну. Въ лишаахъ, происходящихъ отъ внутреннихъ причинъ, нужно сверхъ того внутреннее, соотвѣтственное имъ лѣченіе. Кромѣ того мазь эту, отъ которой чрезъ нѣсколько дней, обыкновенно, начинается излѣченіе, не должно продолжать, какъ скоро больной начинаетъ чувствовать у себя слюнотеченіе при употребленіи ея \*\*). Чтожь касается до продолжительныхъ сыпей, то онѣ очень хорошо излѣчиваются, какъ и чесотка, намазываніемъ *чистымъ дегтемъ съ зеленымъ мыломъ* (№ 226, 227) утромъ и вечеромъ, также *дегтярною мазью* (№ 225) и обмываніемъ *дегтярною водою* (№ 70) и дегтярнымъ мыломъ (№ 224). Сильнѣйшее же средство противъ лишаевъ, ихъ зуда, даже противъ лишаиныхъ ножныхъ застарѣлыхъ язвъ есть *дегтярно-известковое мыло* (№ 228); далѣе обращаютъ вниманіе, не подвержены ли больной золотухѣ, любострастной, подагренной болѣзни, и направляютъ лѣченіе противъ этихъ болѣзней. Если причины удалены, или ихъ нельзя отыскать, а лишаа продолжается, то лѣченіе производится противулишаиными средствами, какъ напр.: *сладкогорькій пасленъ* въ отварѣ, ежедневно по 2—4 драхмы, или вытяжкѣ (экстрактѣ) съ *магнезіею* въ пилюляхъ по 2—6 гранъ, *стѣнный цвѣтъ*, отваръ *вязовой*

\*) Др. Здр. 1834 г. № 28 стр. 221.

\*\*) Др. Здр. 1838 г. № 47, стр. 372.

*корки, баккаута, сассапареля, графитъ или карандашъ* отъ скрупула до драхмы въ день; продолжительное употребленіе крѣпкаго отвара *трехцветной фіалки* (анютины глазки); при воспаленіи въ лишаѣ, внутрь *сыворотка, свѣжіе соки* изъ *одуванчика, цикорія, пырея, подбѣла, дымячки*; *соляная кислота* по 10—25 капель въ водѣ три раза въ день (по совѣту врача); *стѣрныя минеральныя воды*, кавказскія, сергеевскія, тифлисскія, солегалическія и др., *грязи сакскія* (въ Крыму) *астраханскія, эзельскія* (на Балтійскомъ морѣ). Снаружи полезны: отваръ толченыхъ *мясныхъ ореховъ*, свѣжее *масло грецкихъ ореховъ*, растворъ *буры* (золотникъ на фунтъ воды), также *хлоридовой извести, известковая вода*, при сильномъ зудѣ и жженіи соляно-угусная примочка или *персолъ* (№ 220), *маковое масло*, свѣжія густыя *сливки, кокосовое мыло, спермацетъ съ миндальнымъ масломъ*. Въ воспалительныхъ сильно болящихъ лишаихъ дѣйствительны: припускъ *пѣны* вокругъ лишая, *холодная примочка, сокъ* изъ свѣжихъ *листьевъ березы, подорожника*, или и самыя листья, прикладываемые къ лишаю и пережѣваемые по мѣрѣ того, какъ они высыхаютъ; *покрытіе мылаевъ кожей*, или *внутренностями* сейчасъ *убитаго кролика, зайца, баранка*. Въ упорныхъ лишаихъ иногда помогаетъ *чистый деготь*, котораго чашка смѣшивается въ мазь съ двумя *желтками яйца* и чашкою *свѣжихъ сливокъ* или просто съ двумя чашками *льнянаго масла*; эту мазь втирать два раза въ день въ лишаинныя мѣста. При наружномъ лѣченіи упорныхъ лишаевъ нужно прежде открыть на тѣлѣ *источникъ* (фонтанель) и по временамъ давать больному *слабительное*. Сухіе лишаи, покрытые какъ бы отрубями или мелкою шелухою и чрезмѣрно зудящіе, простой народъ присѣкаетъ или лѣчитъ *искрами*. Для этого надъ больнымъ мѣстомъ, съ помощью обыкновеннаго огнива, высѣкаютъ изъ кремня искры, которыя лучеобразно падаютъ на лишаинную поверхность, производятъ на ней мгновенныя, легкія, острыя покалыванія и потомъ красноватость. Такое прижиганіе повторяется до тѣхъ поръ, пока исчезнетъ лишаи, что бываетъ иногда скоро, а зудъ, вѣрный спутникъ лишаинныхъ сыпей, всегда прекращается\*). При лѣченіи вышеозначенныхъ рабочихъ поселянъ необходимо соображаться съ особыми правилами, изложенными для нихъ въ особомъ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію. Кромѣ того простолюдины мажутъ лишаи табачнымъ сокомъ, *потомъ съ охна, слюнами* натопагъ, посыпаютъ *мучнистымъ порошкомъ* съ *корки хлѣба*, испеченнаго и вынутаго изъ печки, *окалываютъ* кругомъ *булавкой, накалываютъ на крестъ* и пр. Есть и «заговоры» отъ лишая, какъ отъ всѣхъ другихъ бѣдъ: обвести слюнами сучокъ въ стѣнѣ избы, потомъ обвести лишаи, приговаривая: «ни шире, ни дальше, тутъ тебѣ и быть, тутъ тебѣ и пропасть!» Съ прыщомъ дѣлаютъ почти то же: должно помазать слюнами сучокъ, потомъ прыщъ, затѣмъ пятву

\*) Др. Здр. 1841 г. № 16, стр. 125.

и наступать на неё; это повторяется трижды, а въ третій разъ нужно наступить и шаркнуть или растереть. Если обметаётъ губы, то присѣкаютъ, какъ и выше сказано, кремнемъ и огниномъ, чтобы искры сыпались на больное мѣсто; трутъ также горшокъ, смочивъ его, и мажутъ сыпь этою черною грязью \*).

Примѣч. Сухотка со всѣми ея видоизмѣненіями, какъ-то: собачьею старостію и др., по важности и трудности ея лѣченія должна во всякомъ случаѣ составлять предметъ собственно врачебный. Простолюдины въ собачьей старости (младенческая скорбь) сажаютъ ребенка на лопату и трижды всовываютъ его наскоро въ чело затопленной печи. Если ребенокъ вообще отчаянно боленъ, то мать подастъ его въ окно первой подошедшей нищенкѣ, вмѣсто милостыни; если нищенка приметъ его ради Христа и посидитъ подъ избою у воротъ, то мать вѣритъ, что ребенокъ оправится \*\*).

## КЛАССЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

### БОЛѢЗНЕННЫЯ ОТЛОЖЕНІЯ.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Болѣзненные отложения суть образованія въ живомъ человѣческомъ тѣлѣ неправильной органической и неорганической матеріи, скопляющейся въ какой либо полости или части при вліяніи качественно измѣненной дѣятельности отдѣлительной системы.

РАЗДѢЛЕНІЕ. Эти болѣзни бываютъ много-различны по качеству самихъ отложений и получаютъ названія по имени собственно отлагаемой матеріи.

Наипаче случающіяся между поселянами болѣзни, принадлежащія къ этому классу, слѣдующія: *чесотка*; *вшивость*; *плоскостность (плоскосты)*; *червистость (глисты)*; *каменная болѣзнь*; *желтуха (желтяница)*; *водянка*; *воздушная (барабанная) опухоль*; *пученіе живота (см. вътрешная колика)*.

### Чесотка (короста).

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Чесотка, или короста, есть кожная, нелихорадочная, медленная продолжительная сыпь, появляющаяся въ видѣ маленькихъ, съ красноватою окружностію водяныхъ прыщиковъ или пупырышковъ, содержащихъ то прозрачную, водянистую, то мутную, гнойную жидкость, сначала около запястья или межъ пальцами, потомъ разсыпаящаяся по рукамъ, ногамъ, бедрамъ и по всему тѣлу, кромѣ лица, сопровождаемая

\*) В. Даль журн. М. В. Д. книж. 8-я, стр. 169. 1845 г.

\*\*\*) В. Даль журн. М. В. Д. книж. 8-я, стр. 170 и 182. 1843 г.



сильнымъ нестерпимымъ зудомъ отъ зарожденія въ пузырькахъ и надъ струпьями особаго рода насѣкомыхъ въ родѣ вшей, называемыхъ чесоточниками.

Раздѣленіе. Эти пузырьки, или пупырышки, прорываясь, превращаются въ струпья, либо сухіе, либо мокрые, гнойные; поэтому короста раздѣляется на: 1) *сухую* и 2) *мокрую*.

Признаки сухой, или собачьей коросты: поверхность кожи (кромѣ лица) покрывается широкими коркоподобными плитками, или бѣлыми и сухимъ и мѣлоподобными струпьями, съ чрезвычайно въ нихъ сверботою, отчего больные часто чешутся, сдираютъ маленькіе, до того бывшіе сухими, пупырышки, превращаютъ ихъ въ ранки, испускающіе нѣсколько гноя и, засыхая, превращающіеся въ скорлупки или нѣкоторый родъ корочекъ.

Признаки мокрой коросты: свербежъ не великъ, прыщики подобны маленькимъ накожнымъ ранкамъ, изъ которыхъ выходитъ сукровица или гной, и которыя, засыхая, покрываются коркою, набоище отваливающеюся маленькими кусочками.

Причины чесотки двоякаго рода. 1) Первоначально она происходитъ отъ *неопрятности*, нечистоплотности и отъ особенной *заразы*, а потому чесотка есть болѣзнь въ высшей степени заразительная, но только *черезъ непосредственное сообщеніе* здороваго съ больнымъ, или съ его *зараженными вещами*. Она замѣчается почти безвыходно между неопрытными евреями, литвинами, бѣлоруссами, но рѣдко встрѣчается между опрытными русскими, еженедѣльно парящимися въ банѣ, изъ которыхъ только фабричные, работающіе сидя, торгоши, сидящіе въ лавкахъ и прилавкахъ, пряжи, мотальщицы и всѣ женщины и мастеровые, ведущіе сидячую жизнь и, болѣе или менѣе, неопрытные, особенно неопрытные хлѣбники или пекари хлѣба и заражающіеся ходящіе за больными, кормилицы, носящія дѣтей чесоточныхъ, и тряпичники бывають подвержены этой болѣзни.

Сущность чесотки состоитъ въ отложеніи на кожу сывороточной пасочной влаги съ зарожденіемъ въ ней насѣкомаго, называемаго чесоточника.

Распознаваніе чесотки *удобно и легко* тѣмъ, что: 1) лицо, которое есть обыкновенное мѣстопробываніе большей части другихъ накожныхъ высыпей, всегда бываетъ свободно отъ чесотки, (единственно по причинѣ всегдашняго опрытнаго и чистоплотнаго содержанія его частымъ умываніемъ); 2) она имѣетъ зудъ (сверботу) въ пупырышкахъ и свойство заражать другихъ.

Предсказаніе. Чесотка сама по себѣ есть болѣзнь *неопасная* и при приличномъ лѣченіи бываетъ *непродолжительна*. Но отъ небреженія, если оставить её долгое время безъ лѣченія, она можетъ принести вредъ (порчу) для всѣхъ соковъ въ тѣлѣ и дурныя оттого послѣдствія; равнымъ образомъ и при поспѣшномъ, но неправильномъ лѣченіи, только сгоняющемъ её съ поверхности кожи, а не освобождающемъ отъ

нея совершенно организмъ, она можетъ быть причиною другихъ болѣзней какъ-то: воспаленій, горячекъ, лихорадокъ, чахотки, боли въ желудкѣ, водянки, падучей болѣзни и др.

Исходы въ *здоровьи* и въ *другія* вышеупомянутыя болѣзни. Смертю она можетъ оканчиваться только при посредствѣ тѣхъ болѣзней, которыхъ она бываетъ причиною, скрывшись внутрь тѣла.

Лѣченіе діететическое, состоящее въ удаленіи преимущественно причинъ болѣзни, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Каждый священникъ, для предохраненія своихъ *прихожанъ* отъ этой болѣзни, если будетъ *убѣждать* ихъ въ пользу *отрѣтнаго содержанія* себя и расположить чрезъ то всѣхъ къ чистоплотности, этимъ однимъ можетъ совершенно изгнать чесотку изъ всего своего прихода. Доказательствомъ тому могутъ служить примѣры, приведенные Буханомъ \*). 2) При лѣченіи всякой чесотки *одержимые* ею не должны употреблять ничего *кислаго, жирнаго*, не пить кваса, сыровца, кислыхъ щей, браги, не ѣсть свинины, свиного копченаго сала, ветчины, жирной солонины, соленой рыбы, раковъ, *соблюдать чистоту тѣла и отрѣтность въ бѣльѣ и жилищѣ*. 3) *Послѣ* излѣченія застарѣлой чесотки полезно *купаться* въ рѣкѣ, чистомъ прудѣ, *принимать холодныя ванны*, часто ходить въ баню. 4) Для вышеозначенныхъ рабочихъ поселянъ, какъ-то: фабричныхъ, мастеровыхъ, торгашей и торговцевъ, пряжъ, мѣталъщицъ, ведущихъ сидячую жизнь, равно хлѣбниковъ и ходящихъ за больными, кормилицъ и тряпичниковъ, изложены особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лѣченіе существенное состоитъ въ уничтоженіи чесоточной заразы *сѣрою*, какъ единственнымъ средствомъ въ этомъ случаѣ. Нужно однако помнить, что чрезъ натираніе сѣрою чесоточныхъ частей тѣла, можно уничтожить чесоточную заразу только въ кожѣ, но зараза, проникшая глубоко въ кожу и соги, чрезъ то не уничтожается, и потому послѣ такого наружнаго лѣченія чесотка или вновь возрождается, или же, что еще хуже, бросается на внутренніе органы и бываетъ причиною другихъ болѣзней, особенно причиняетъ чахотку, боль въ желудкѣ, водяную и падучую болѣзнь. По этому при лѣченіи чесотки нужно имѣть въ виду слѣдующія правила: 1) Если чесотка появилась у здороваго человѣка и недавно, не болѣе 2—3 недѣль, то можно уничтожить её употребленіемъ сѣры снаружи, въ видѣ: а) *сѣрной мази простой* (№ 211) и б) особенно *сложной* (№ 212), которою рѣдко нужно бываетъ натирать все тѣло, а если потребуютъ того обстоятельства, то не должно намазывать все тѣло разомъ, а сперва одну часть, потомъ другую и такъ далѣе; иначе опасно закрыть мазью вдругъ всѣ поры кожи; в) *сѣрнаго мыла*, г) *сѣрной воды* (№ 213); предъ всѣмъ втираніемъ мази или мыла въ чесоточныя мѣста, *послѣднія* нужно об-

\*) Его лѣчебникъ, томъ III. стр. 232.

мывать водою съ простымъ мыломъ и втирать мазь лучше всего въ банѣ, послѣ ванны, у теплой печки. Мазь втирать тихо и долго, стараясь раздавливать пузырьки и отдѣлять струнья; иногда отъ одного, двухъ втираній чесотка пропадаетъ. Но какъ многіе имѣють отвращеніе отъ сѣрнаго запаха, то вмѣсто сѣры можно взять порошокъ *чемеричнаго корня*, съ которымъ приготовить мазь, также какъ показано съ сѣрою, и эта чемеричная мазь равно въ состояніи излѣчить чесотку. *Бмстѣющая* печная *сажа* также превосходно дѣйствуетъ въ слѣдующемъ видѣ: взявъ 2 части жира и одну часть сажи, смѣшать и приготовить мазь, которою натирается вся поверхность тѣла вечеромъ, а на другой день утромъ обмывается теплымъ растворомъ *чернаго мыла*. Увѣряють, что при такомъ лѣченіи чесотка исчезаетъ обыкновенно въ 5 дней \*). Для нѣжныхъ дѣтей употребляютъ *мазь девясилъную*, точно такимъ же образомъ приготовленную, какъ и чемеричная. Эту недавнюю чесотку мнѣ часто доводилось излѣчивать въ короткое время однимъ наружнымъ употребленіемъ *чистаго дегтя съ зеленымъ мыломъ* (№№ 226, 227) (изъ ворвани и поташа по равной части). Этимъ составомъ, тщательно смѣшаннымъ, должно мазать больнаго вездѣ, гдѣ у него есть чесотная сыпь, утромъ и ввечеру, не перемѣняя бѣлья до 3-хъ сутокъ, по истеченіи которыхъ больной отмывается на чисто въ банѣ простымъ мыломъ и, если по осмотрѣ на тѣлѣ его еще окажется сыпь чесотки, то онъ, надѣвая старое бѣлье, продолжаетъ мазаться еще 3-е сутокъ; въ противномъ случаѣ надѣваетъ чистое бѣлье и считается совершенно выздоровѣвшимъ. Курсъ этого лѣченія 3-е сутокъ, и рѣдко его бываетъ нужно повторить, а еще рѣже онъ продолжается до 14-ти дней. Съ большею пользою употребляютъ *дегтярноизвестковое мыло* для обмыванія чесоточныхъ прыщей и язвъ каждадневно утромъ и вечеромъ (№ 228). 2) Если чесотка у взрослого человѣка продолжалась уже нѣсколько недѣль и даже мѣсяцевъ, то лѣченіе нужно начинать употребленіемъ внутрь *сѣрныхъ цвѣтковъ* или очищенной сѣры ежедневно по утрамъ въ теченіе 1—2 недѣли отъ  $\frac{1}{8}$  до  $\frac{1}{3}$  части золотника на ломтѣ хлѣба съ масломъ такъ, чтобы въ испражненіи низомъ была замѣтна сѣра. При этомъ 2—3 раза въ недѣлю *ходитъ въ баню* или принимать *ванны съ мыломъ, золою, отрубями, стѣнною трухою*. 3) Въ застарѣлой чесоткѣ, не уступающей этому лѣченію въ теченіе 4—6 недѣль, нуженъ совѣтъ врача, безъ котораго не рѣшаться ни на какое другое средство, развѣ только для усиленія дѣйствія сѣрной мази прибавить  $\frac{1}{2}$  золотника порошка *блага купороса* и велѣть пить при этомъ отваръ изъ *лопушника* (№ 5), *осоки*, такимъ же образомъ приготовленнаго и *хмьлинаго корня* (№ 147). Для свободнаго испражненія на низъ полезно давать *кремортартаръ* съ водою (№ 9). 4) Въ упорныхъ случаяхъ болѣзни нужно смотрѣть, не былъ ли чесоточный прежде подверженъ болѣзнямъ: любострастной, золотушной,

\*) Др. Здр. 1844 г. № 15, стр. 115.

цынготной, и прибѣгнуть къ приличному лѣченію. Если, напротивъ, застарѣлая чесотка безъ всякаго лѣченія скроется и у больного появится отѣкъ ногъ, разные припадки въ груди, животѣ, то необходимо нужно давать ему сѣру внутрь, сажать въ *сѣрные ванны*, открыть *источники* и даже искусственно *привить чесотку* на томъ мѣстѣ, гдѣ она прежде была. Но въ обоихъ этихъ случаяхъ приглашеніе врача необходимо; его дѣло распорядиться лѣченіемъ. Употребленіе *сѣрныхъ минеральныхъ водъ*: какъ-то: на Кавказѣ, въ Сергіевскомъ и Солигаличѣ (Бостромской губерніи) и *сакскихъ грязей* въ Евпаторіи оказываютъ удивительную пользу въ этихъ случаяхъ болѣзни, и для употребленія ихъ обращаются къ совѣту тамошнихъ мѣстныхъ врачей.

## Вшивость.

**О П Р Е Д Ѣ Л Е Н І Е.** Вшивость обнаруживается быстрымъ и въ большомъ количествѣ появленіемъ вшей на поверхности тѣла.

**Р А З Д Ѣ Л Е Н І Е.** Вшивость бываетъ двухъ родовъ: 1) *Волосистоголовая*, въ которой вши, обыкновенно, бываютъ темнаго цвѣта съ явственными буровато-черными пятнами и овальными полосками. 2) *Вшивость всего тѣла*, въ которой вши обыкновенно бываютъ бѣлыя, длинныя, бородавчато-бугорчатыя. Первые появляются при видимомъ и скрытомъ золотушномъ расположеніи, особенно при паршахъ; а послѣднія обыкновенно появляются при нервныхъ изнуреніяхъ и при пасочности всего тѣла, особенно же въ дальнѣйшихъ періодахъ нервныхъ горячекъ, преимущественно тюремныхъ, и въ продолжительной нервной горячкѣ \*).

**П р и ч и н ы.** Предрасположеніе состоитъ въ золотушно-пасочномъ состояніи тѣла.

**П р и ч и н а** производящая — неопрятное содержаніе тѣла, по кото-

---

\*) Сюда же принадлежатъ плоскостность или плоскосты, плоскія темноцвѣтныя, плотносидящія, большею частію около дѣтородныхъ частей, особенно надъ лобковыми костями, рѣже подъ мышками, въ бровяхъ и бородѣ, а еще рѣже на всей поверхности тѣла, за постояннымъ, повидному, исключеніемъ волосистой части головы, многоножныя, называемыя поэтому сороконожками, вши, производящія зудъ, побуждающій къ чесанію, которыя такъ всѣмъ извѣстны, что не требуютъ большаго описанія слѣдуетъ только сказать, что причиною появленія ихъ бываетъ передача отъ больныхъ здоровымъ, особенно при содѣйствіи неопытнаго содержанія половыхъ органовъ и вообще всего тѣла. Для жизни они опасны, но безъ искусственнаго пособія могутъ быть продолжительны на многіе годы. Лѣченіе предохранительное состоитъ въ соблюденіи чистоты и въ несообщеніи съ одержимыми ими больными; а существенное тоже, какое предложено противъ вшей; въ особенности же здѣсь полезно втираніе ртутной мази въ пораженныя мѣста. Взявъ 1 золотн. бѣлой яввой ртуты, растереть ее въ 5-ти капляхъ бѣлаго скипидара и, растирая вмѣстѣ съ 7-ми золотниками бараньяго топленаго сала, либо коровьяго масла, употреблять для этого втиранія. Втираніе продолжается  $\frac{1}{2}$  часа, потомъ, по прошествіи 1—2 часовъ, больной долженъ хорошо пропотѣть и обмыться въ банѣ.

ной мельники, при соединеніи муки съ жиромъ ихъ кожи, особенно бывають подвержены вшивости.

Сущность вшивости состоитъ въ скопленіи неправильнаго качества слизи и въ образовавшихся изъ нея вшахъ.

Распознаваніе по признакамъ и мѣстопробыванію болѣзни легко. Сверхъ того возрастъ больныхъ также служитъ пособіемъ къ распознаванію. Вши волосисто-головныя преимущественно свойственны возрасту отроческому и частію юношескому; вши тѣльныя возрастаемъ возмужалому и старческому.

Предсказаніе, относительно опасности для жизни, болѣе зависитъ отъ сопутствующихъ болѣзней; вши же сами по себѣ нисколько не опасны. Относительно продолжительности, вшивость волосисто-головная, безъ искусственнаго пособія, можетъ продолжаться недѣли, мѣсяцы и даже годы; между тѣмъ вшивость тѣльная, продолжившись нѣсколько дней, иногда сама собою, безъ пособія, исчезаетъ.

Исходъ единственный въ здорье.

Лѣченіе діететическое состоитъ въ удаленіи, главное, причины производящей, требуетъ соблюденія чистоплотности и опрятности, частымъ обмываніемъ головы и всего тѣла въ банѣ и дома въ ваннѣ, тазѣ и корытѣ теплою мыльною водою со щелокомъ, купаніемъ въ рѣкѣ; частою перемѣною бѣлья и т. п. Для мельниковъ сверхъ того изложены особныя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лѣченіе существенное внутреннее, направленное противъ предрасположенія и сущности болѣзни, рѣдко бываетъ нужно. Оно одинаково съ соимяннымъ лѣченіемъ золотухи, чесотки и лишая и состоитъ изъ внутренняго употребленія средствъ: противузолотушныхъ, противучесоточныхъ и противулишайныхъ. Снаружи для истребленія собственно вшей полезны: *деревянное масло, лавандовое масло, настой табака, отваръ девясилаго корня, волчьего лыка*, примочка, называемая *пересоль* (№ 220). Очень дѣйствительны *ртутныя средства* въ видѣ мазей. Взявъ живой *ртути* 1 золотн., распустить въ нѣсколькихъ капляхъ *терпентиннаго масла* и стереть вмѣстѣ съ 7-ю золотниками *коровьяго масла*, либо топленнаго *свинаго, бараньяго сала* (неполитанъ), и намазывать вшивыя мѣста головы понемногу одинъ разъ въ сутки. Эти средства однако должны быть употребляемы съ крайнею осторожностью и то только во вшивости головной; во вшивости же тѣльной никогда не должны быть употребляемы. Въ этой послѣдней съ отмѣнною пользою можно дѣйствовать средствами ароматическими душистыми, въ видѣ обтираній всего тѣла настоемъ водянымъ *шалфея, ромашки, богородской травы, чабра, божьяго деревца, душицы, зверобоя, мяты, полыни* и т. п.; а достаточные могутъ въ этомъ случаѣ употреблять эти средства въ видѣ настоевъ спиртныхъ для обтиранія и въ видѣ ваннъ. Такъ напр., взявъ 14 золотн. шалфея, фунтъ верхушекъ душицы,  $\frac{1}{2}$  фунта верхушекъ полыни, либо божьяго деревца, соединивъ вмѣстѣ, получится наборъ для ванны, въ которую

можно прибавлять съ пользою, смотря по болѣзненному состоянію цѣлаго тѣла, хлѣбнаго вина  $\frac{1}{2}$ —1 фунта.

## Глисты.

**Определение.** Глисты ни что иное червяги, зараждающіеся почти въ каждой внутренности, какъ-то: въ печени, легкихъ, почкахъ, мочевомъ пузырьѣ, даже въ мозгу и глазахъ, наибаче однако они происходятъ и достигаютъ значительной величины въ кишкахъ, откуда съ одной стороны заходятъ въ желудокъ, а съ другой въ предматочникъ.

**Раздѣленіе.** Кишечные глисты бываютъ преимущественно трехъ родовъ: 1) *маленькіе кругленькіе червяки* (аскариды), длиною 2—3 линіи, водящіеся исключительно въ прямой кишкѣ; 2) *средніе*, или *круглые*, длиною въ  $\frac{1}{4}$  аршина и болѣе, а толщиною въ гусиное перо; они водятся въ тонкихъ кишкахъ, и 3) *плоскій, ленточный глистъ* (солитеръ) съ широкими или длинными кольцами, шириною въ  $\frac{1}{2}$  линіи въ узкую ленту, а длиною въ нѣсколько десятковъ аршинъ; онъ свивается въ клубокъ, или свертывается въ видѣ ленточнаго пучка и обитаетъ въ толстыхъ кишкахъ.

**Признаки.** Золотушное, блѣднорое тѣлосложеніе, блѣглый быстро смѣняющійся цвѣтъ лица, синіе кружки подѣ глазами, расширенныя зрачки, зудъ въ носу, частое чиханіе, кровотеченіе изъ носа, по утрамъ натошагъ быстрое накопленіе во рту слюны, которая вдругъ изливается струею, непріятный запахъ изо рта, вязкій слизистый вкусъ, неправильный позывъ на ѣду, — то голодь, то отвращеніе отъ пищи, полный мягкій животъ, боль около пупка и подѣ ложечкою, вздрагиваніе и скрежетаніе зубами во снѣ, головокруженіе, дурнота и даже обморокъ, стараніе больнаго спать на животѣ, рѣзкія грезы во снѣ, снохожденіе (лунатизмъ), псхуданіе тѣла, ожесточеніе всѣхъ этихъ припадковъ отъ продолжительнаго употребленія постной пищи (въ великій постъ). Впрочемъ всѣ эти признаки не вѣрны, и только одно выхожденіе глистовъ есть вѣрный признакъ ихъ присутствія въ кишкахъ.

**Особенныя признаки.** Маленькіе глисты причиняютъ несносный зудъ въ заднемъ проходѣ, наибаче гъ вечеру, рѣзь, щемленіе и натугу при испражненіи низомъ, трудное испражненіе мочи (особенно у дѣвочекъ, у которыхъ они заползаютъ въ предматочникъ), теченіе слизи изъ задняго прохода, мочеваго канала, предматочника, грусть и печаль. Круглые глисты производятъ, кромѣ общихъ припадковъ, частую боль и чувство ползанія около пупка: при плоскихъ глистахъ замѣчаются: чувство восхожденія до шеи и потомъ опаденія чего-то, какого-то движенія, сосанія въ разныхъ частяхъ живота, ползанія мурашекъ, головокруженіе, оцѣпененіе пальцевъ на рукахъ и ногахъ, спорое успокоеніе брюшныхъ припадковъ послѣ выпитія рюмки *горькой воды*, особенно *полынной*.

Глисты, раздражая кишки, имѣютъ вліяніе на все тѣло: пожирая

питательный сокъ, они производят исхуданіе, а раздражая нервы, бываютъ поводомъ къ разнымъ нервнымъ болѣзнямъ, особенно у дѣтей, у которыхъ разныя судороги, какъ то: родимецъ, падухая болѣзнь. пляска св. Вита, смыканіе челюстей, часто зависятъ отъ глистовъ, съ испражненіемъ которыхъ проходятъ и судороги, даже не причиняя никакихъ явныхъ припадковъ ни въ животѣ, ни въ головѣ; глисты могутъ причинить нервную, душевную болѣзнь.

**Причины внутреннія.** Предрасположеніе ко всёмъ вообще глистамъ желудочно-кишечнаго канала состоитъ въ ослизненіи его какъ врожденномъ, такъ и случайномъ, происходящемъ отъ употребленія пищи и питья слизистыхъ. Къ глистамъ желудочно-кишечнымъ круглымъ преимущественно предрасположены дѣти отроческаго и юношескаго возрастовъ, а къ плоскимъ тесемочнымъ и мелкимъ — люди возмужалые.

**Причины внѣшнія, (производящія),** суть: 1) прѣсная и слизистая пища и питье, какъ то: молочная, мучная, мясная, сладкіе плоды и овощи, медъ, сахаръ; 2) низменное мѣстоположеніе страны сильно способствуетъ къ зарожденію глистовъ, которые въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бываютъ общею болѣзнію въ народѣ. Глисты при употребленіи сочной, пріятной для нихъ пищи, спокойны, и рѣдко причиняютъ слабые припадки; но когда больной воздерживается отъ пищи или ѣсть постную, кислую, соленую, острую, горькую пищу (въ постъ), то глисты, голодая, дѣлаются безпокойными и причиняютъ мучительные, даже опасные припадки.

**Сущность** состоитъ въ скопленіи неправильнаго качества слизи и въ образовавшихся изъ нея въ тѣлѣ, и особенно въ кишкахъ, преимущественно у дѣтей, глистовъ разнаго рода.

**Распознаваніе** по вышеизложеннымъ признакамъ *легко* и удобно, такъ что признаки эти съ вѣроятіемъ указываютъ на существованіе глистовъ, а изверженіе ихъ, чего никакъ не должно упускать изъ вида, подтверждаетъ, удостовѣряетъ и дѣлаетъ истину несомнѣною.

**Предсказаніе.** Относительно опасности для жизни: 1) при глистахъ круглыхъ *лучше*, а при плоскихъ и тесемочныхъ *хуже*; 2) при покойномъ состояніи глистовъ предсказаніе лучше, а при возмущенномъ, происходящемъ или отъ недостатка и вредности для глистовъ пищевыхъ веществъ, или отъ причинъ сокрытыхъ, предсказаніе хуже, потому что глисты сильно раздражаютъ нервы и производятъ судорожныя болѣзни, натуги, поносъ, воспаленіе и завитіе, переплетеніе кишекъ (опасная болѣзнь), нарывы, умопомѣшательство, бѣшенство и др. Круглые глисты иногда проѣдаютъ стѣнки кишекъ, а плоскіе заползаютъ въ общій желчный протокъ. Относительно продолжительности: глисты круглые, большею частію, сами по себѣ истребляются съ переходомъ въ возмужалый возрастъ; плоскіе же и тесемочные глисты продолжаютъ жить въ тѣлѣ, безъ искусственнаго пособія, до конца жизни больнаго, за исключеніемъ нѣкоторыхъ только случаевъ, въ которыхъ, подъ влия-

ніемъ другихъ болѣзней, или вредной для глистовъ пищи, они мертвыми, а иногда и живыми, извергаются изъ тѣла.

Исходы въ *здоровье*. *Болѣзни*, въ которыя глисты переходятъ, или правильнѣе, которыя слѣдуютъ за глистами и образуются, при нихъ слѣдующія: перемежающіяся лихорадки, горячки, воспаленіе кишекъ, нервныя болѣзни, особенно судорожныя, изъязвленіе и прободеніе кишекъ, сыпи, бѣли, запоръ, поносъ, разстройство пищеваренія и всеобщее изнуреніе. *Смертію* оканчивается при посредствѣ какой либо изъ упомянутыхъ болѣзней.

Лѣченіе діететическое, состоящее въ удаленіи причинъ болѣзни, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) Въ предупрежденіе зарожденія глистовъ отцамъ и матерямъ, желающимъ предохранить дѣтей своихъ отъ глистовъ, совѣтовать позволять имъ *достаточное тѣлодвиженіе и держать ихъ въ чистомъ воздухѣ*. Пища ихъ должна быть здоровая и прочная до извѣстной степени; ихъ надлежитъ сколько возможно *предохранять отъ сырыхъ огородныхъ овощей*, кореньевъ, зеленыхъ и попорченныхъ плодовъ, гречневыхъ крупъ, гороха, бобовъ и т. п. До всѣхъ этихъ веществъ дѣти поселянъ большіе охотники и ѣдятъ ихъ слишкомъ много съ вредомъ для себя, такъ какъ они развиваютъ слизи въ желудочно-кишечномъ каналѣ и служатъ основаніемъ къ зарожденію глистовъ. 2) *Одержимымъ* глистами *назначатъ противоглистную діету*, состоящую въ употребленіи всего того, что неприятно, вредно для глистовъ и во избѣжаніи того, что питаетъ, ерѣпитъ глисть. Поэтому больные глистами должны *нѣсть и пить соленое, горькое, кислое, острое* и избѣгать сладкаго, прѣснаго, молочнаго, мяснаго, а именно ѣсть щи съ квашеною капустою, бураками, кашу съ коноплянымъ и орѣховыхъ масломъ, солонину, соленую рыбу, соленые огурцы, селедку, хрѣнъ, рѣдьку, горчицу, лукъ, чеснокъ, пить квасъ, сыровецъ, пиво, кислыя щи, сокъ клюквенный, брусничный, лимонный, холодную воду по утрамъ натощакъ, горькую воду, особенно полынную; не ѣсть мяса, свѣжей дичи, яицъ, молока, меда, сахара, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда предпринимается существенное лѣченіе глистовъ въ исходѣ луны и въ постное время окармливаніемъ (см. ниже). 3) Эту же діету нужно продолжать и по выходѣ глистовъ, для истребленія и разрѣшенія въ кишкахъ слизи, какъ глистнаго гнѣзда; причѣмъ должно поддерживать діету мясною пищею, хорошимъ виномъ, горькою водкою, движеніемъ; не въ далекѣ живущіе отъ Кизляра могутъ употреблять для этого *адрианопольскія, екатерининскія желѣзные минеральныя воды*, въ Кавказской области *кавказскія* а въ Липецкомъ уѣздѣ *липецкія желѣзные минеральныя воды*. Приэтомъ воды можетъ замѣнить тоже желѣзный купоросъ (чернильный), употребляемый по 1—3 грана на пріемъ, 2—3 раза въ день въ рюмкѣ воды (величина грана равняется величинѣ зерна коноплянаго сѣмени). 4) Сверхъ того дѣтямъ, въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, давать при ущербѣ луны *цвѣтварное сѣмя* въ кашкѣ, а потомъ *слабительное* изъ *огуреч-*



наго разсола (№ 7) отвара *сухой коры крушины* одной (№ 74) и съ *горькою солью* (№ 75). Врачи даютъ въ этомъ случаѣ *слабительное* изъ порошка корня *ялты*, по 5—10 гранъ на приемъ, или слабительную кашку.

Лѣченіе существенное, состоящее въ умерщвленіи, испражненіи и совершенномъ истребленіи глистовъ, въ желудочно-кишечномъ каналѣ, большею частію не такъ легко, какъ объ этомъ многіе думаютъ, и потому требуетъ убѣжденія, чтобы больные обращались къ врачамъ, за неимѣніемъ же ихъ по близости, нерѣдко оказываютъ превосходную пользу слѣдующіе простые способы, посредствомъ: 1) *окармливанія* и 2) *отравливанія* глистовъ. Во всякомъ случаѣ лѣченіе должно начинать въ исходѣ (ущербѣ) луны, т. е. въ третью и послѣднюю ея четверть: въ это время глисты бывають слабѣе и не такъ плотно присасываются къ кишкамъ, и особенно въ постное время, когда они отъ постной пищи также изнемогають и слабѣють, возбуждая притомъ сильныя припадки.

Лѣченіе круглыхъ глистовъ, которымъ наичаще подвергаются дѣти поселянъ, 1) *окармливаніемъ*: самое простѣйшее и пріятнѣйшее лѣкарство, въ этомъ случаѣ, есть соединеніе *меда съ клюквой*, которая для этой цѣли изминается и растирается съ  $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{4}$  чистаго и, если можно, свѣжаго меда; этой смѣси можно давать 10 лѣтнему отъ  $\frac{1}{2}$  до 1 фунта натошакъ. Это средство легко производитъ поносъ и жаръ, развивающійся нерѣдко до горячечнаго состоянія, обанчивающагося впрочемъ весьма легко и скоро, даже въ 1—2 сутки, безъ всякаго пособія. Замѣчательно, что отъ употребленія какъ помянутаго, такъ и другихъ сладкихъ веществъ, вмѣстѣ съ растительными кислотами, круглые глисты часто до того обжираются ими, что кожа ихъ почти всю длину раздирается, и весь кишечный каналъ выпадаетъ \*). Третій корень моргови, даваемый по утрамъ натошакъ, въ видѣ кашки съ сахаромъ, также истребляетъ глисты. Впрочемъ употребленіе средствъ окармливающихъ нерѣдко бываетъ безуспѣшнымъ. 2) *Отравливаніемъ*: въ этомъ случаѣ самое дѣйствительное противъ круглыхъ глистовъ, среднихъ и мелкихъ (аскаридъ), есть *цытварное сѣмя*. Оно ослабляетъ, одуряетъ, умерщвляетъ глисты, которые потомъ мертвые испражняются *слабительными* лѣкарствами. Для этого берутъ обыкновенно цытварнаго сѣмени изъ аптеки безъ рецепта, стирають его въ порошокъ и на  $\frac{3}{4}$  золотника прибавляютъ *меда* столько, чтобы вышла по смѣшеніи кашка, которой даютъ четыре раза въ день по чайной, или десертной ложкѣ. Продолжая употреблять это средство отъ двухъ до 3 дней, должно давать двѣ столовыя ложки *деревяннаго масла* и

\*) Проф. Дядьковскій (Практич. Медицина книга 7-я, стр. 463) называетъ окармливающими средствами: медъ, сахаръ, сладкія вина, сладкіе плоды, овощи и коренья, особенно въ соединеніи съ лимоннымъ и клюквеннымъ сокомъ и моренымъ уксусомъ.

ложку поваренной соли въ стаканѣ *краснаго вина* за одинъ приемъ, повторяя его раза три въ день, но обыкновеннѣе употребляется это масло въ промывательномъ (клизирѣ). Эти масляныя промывательныя, подслащенные сахаромъ или медомъ, удобно и окончательно изгоняютъ глисты мертвыми по предварительномъ употребленіи цытварнаго сѣмени, вмѣстѣ котораго употребляютъ съ успѣхомъ *стѣмя дикой рябины*, тоже отравляющей глисты; а вмѣсто слабительнаго изъ деревяннаго масла, даютъ и конопляное, но лучше всего *касторовое* или *пальмовое масло* (*oleum palmae christi*), котораго даютъ по столовой ложкѣ черезъ часъ, до тѣхъ поръ, пока послабитъ два и три раза въ день. Полный приемъ этого масла отъ 4 до 6 ложекъ, которымъ изгоняютъ всѣ глисты, даже плоскія. Кромѣ того глисты пропадаютъ отъ *нижмы*, *полыни*, *руты* зеленой, *корки волошскихъ ореховъ*, *корня мауни*, которыя даются врачами натошакъ по утрамъ въ видѣ порошка по 10—20—30 гранъ съ сахаромъ, или наливки изъ  $\frac{1}{2}$  драхмы на чашку горячей воды. Маленькіе глисты, червячки, истребляются еще клизиромъ изъ отвара *табаку* съ *мыломъ*, *солью*, изъ наливки холодной *квасии*, *нижмы*, или дикой *рябины* при внутреннемъ употребленіи цытварнаго сѣмени, которое дѣтямъ достаточныхъ родителей можно давать по утрамъ на тошакъ въ теченіе двухъ недѣль, обсахареннымъ въ видѣ конфетовъ. Нѣкоторые предлагаютъ къ изгнанію глистовъ отваръ изъ сажн и для питья, или для промывательныхъ; въ видѣ промывательныхъ, отваръ употребляется тогда, когда глисты гнѣздятся въ толстыхъ кишкахъ, а въ видѣ питья, когда они находятся въ желудкѣ и тонкихъ кишкахъ. Для питья *сажу* назначаютъ обыкновенно въ слѣдующей формѣ: взять сажн два золотн., налить воды и кипятить полчаса; процедить и подсластить сахаромъ. Дѣти пьютъ этотъ родъ кофе съ большимъ удовольствіемъ. Это не дорогое и простое противоглистное средство, и заслуживаетъ быть извѣстнымъ, потому что оно дѣйствуетъ цѣлбно. Противъ круглыхъ глистовъ, шилохвостыхъ, червяковъ малыхъ, шилообразныхъ, бѣлыхъ, длиною отъ нѣсколькихъ линій до  $\frac{1}{2}$  дюйма, Ланге совѣтуетъ варить отъ 12 до 15 *лимонныхъ зеренъ* въ полфунтѣ *коровьяго масла съ сахаромъ*; больному давать этой смѣси по ложкѣ каждое утро, на тощій желудокъ, въ теченіе 8—14-ти дней \*). Шульцъ противъ мелкихъ круглыхъ глистовъ (аскаридъ) употребляетъ промывательное изъ квасіевой настойки. Для этого настаиваютъ  $\frac{1}{2}$  унціи квасіеваго дерева водою, доводя настойку до 8 унцій. Послѣ каждаго промывательнаго, выходятъ цѣлыя клубки глистовъ \*\*). Много другихъ еще способовъ у врачей, но они не безопасны безъ ихъ надзора, и потому здѣсь излишне упоминать объ нихъ.

Лѣченіе плоскихъ и тесемочныхъ, или ленточныхъ глистовъ, случающихся рѣдко у поселянъ, бываетъ очень затруднительно, потому

\*) Др. Здр. 1838 г. № 15. стр. 116.

\*\*) Др. Здр. 1847 г. № 23. стр. 182.

что эти глисты изгоняются труднѣе другихъ, и потому больнымъ, подозрѣваемымъ въ этой болѣзни, должно совѣтовать обращаться къ врачу, а за неимѣніемъ его по близости, можно употребить слѣдующій простой и безопасный способъ, состоящій въ томъ, чтобы изнурить, ослабить, умертвить глисть, и потомъ выгнать его. Для этого прежде всего *въ теченіи 1—2 недѣль* надобно *содержать* вышеозначенную *противоглистную діету*, потомъ *на ночь* принять 1—2 драхмы *напоротника въ порошокъ* съ 5—10 гранами нашатыря; *поутру* выпить 1—2 стакана холодной воды, а *черезъ часъ* 1—2 столовыя ложки *англійской или горькой соли*, или ложку *кастороваго масла*, затѣмъ *поставить клистиръ изъ молока* и *втирать въ животъ горное масло* (*Oleum petroleum*), если оно есть. Если *черезъ 2—3 часа* больного не прослабитъ, или хотя и прослабитъ, но глисть не покажется, то надобно повторить лѣченіе: *вечеромъ* напоротникъ, а *поутру* на слѣдующій день *горькую соль*, или *касторовое масло*, и *продолжать это лѣченіе 3—4 дня*, увеличивая *приемы соли и масла*, если больного легко слабило (2—3 раза). Но если и послѣ *трехкратнаго повторенія* напоротника, соли или масла, глисть *низомъ* не покажется, то дать больному *отдохнуть 2—3 дня* и потомъ *опять начать* прежнее лѣченіе, не прерывая *впрочемъ* *противуглистную діету*. Если же *глисть* *появится* и *будетъ* *выходить* не *вдругъ*, *клубкомъ*, или *пучкомъ*, но *потянется* *длинною лентою*, то не надобно ее *отрывать*, а *наматываютъ на палочку* и *больного* *посадить на судно*, изъ котораго *выходятъ молочныя пары*, и въ такомъ *положеніи* *оставить* его, пока весь глисть не выйдетъ, или самъ не оторвется. Если въ *вышедшемъ* глистѣ *одинъ* *конецъ* *бываетъ* *узокъ* (*головка* *глиста*), то можно *надѣяться*, что *потомъ* *выйдетъ* и *весь* *глисть*, при *повтореніи* *лѣченія* или и *при* *одной* *противуглистной* *діетѣ*. Профессоръ Дядьковскій, по *достаточномъ* *приготовительномъ* *лѣченіи*, имѣющемъ *цѣлю* *освободить* *тѣло* или *хоть* *желудочно-кишечный* *каналъ* *отъ* *слизи*, *удалить* *сильное* *брюшное* *полнокрое* и *неправильное* *геморoidalное* *состояніе*, если эти *последнія* *существуютъ* (что *очень* *хорошо* *достигается* въ *Солигаличѣ*, *Костромской* *губерніи* *минеральными* *жельзисто-сѣрнокупными* и *горькосолеными* *водами*), предлагаетъ *слѣдующее* *отравливающее* *плоскіе* *глисты* *средство*: *взявъ* *коноплянаго* *масла*, *только* *что* *выжатаго*, *полрюмки*, а *простаго* *вина* *рюмку*, *принять*, *смѣшавъ* *вмѣстѣ*, за *одинъ* *приемъ*, который *должно* *повторить* 2—4 *раза*, *смотря* *по* *привычкѣ* *больнаго* *къ* *вину*. Кромѣ *того* *должно* *имѣть* *въ* *виду*, *говоритъ* *онъ*: 1) что *плоскіе* *глисты* *большею* *частію* *легче* *уступаютъ* *лѣченію*, *когда* *они* *находятся* *въ* *безпокойствѣ* *и* *движеніи*; 2) что *безпокоятся* *они* *преимущественно* *въ* *новолуніи*; *слѣдовательно*, *лѣченіе* *этихъ* *глистовъ* *особенно*, *если* *оно* *уже* *многократно* *оказалось* *неуспѣшнымъ*, *должно* *предпринимать* *во* *время* *новолунія*.

Прим. *Молоко* *коровье*, *миндальное*, *конопляное*, *маковое* (при *поносѣ*), *употребленное* *въ* *видѣ* *глистировъ*, *съ* *припарками* *къ* *живо-*

ту, облегчаетъ страданія, происходящія отъ встревожившихся круглыхъ глистовъ; бывающія же по утрамъ на тощакъ: дурнота, тошнота и слюпотечение, скоро проходятъ отъ стакана холодной воды; а припадки отъ плоскихъ глистовъ прекращаются рюмкою полынной водки.

## Каменная болѣзнь.

**О П Р Е Д ъ Л Е Н І Е.** Каменная болѣзнь есть камнеродное отложеніе или скопленіе каменнаго вещества въ видѣ песка или камней въ какой либо полости тѣла.

**Р а з д ѣ л е н і е.** Тагъ какъ мѣстопребываніемъ этой болѣзни бываютъ, большею частію, желчный пузырь, почки и мочевого пузырь, то и каменная болѣзнь раздѣляется на: 1) *желчно-пузырную*; 2) *почечную* и 3) *мочепузырную*.

**П р и з н а к и** желчно-пузырной каменной болѣзни: часто возвращающееся чувство тяжести и нытья въ печени, ожесточающееся особенно при сильныхъ сотрясательныхъ движеніяхъ и гнѣвѣ; горькій вкусъ, тошнота и самая рвота, потеря аппетита, желудочные спазмы, нерѣдко возвращающіеся безъ всякой другой причины и распространяющіеся по всему животу; испражняемыя низомъ вещества цвѣта бѣлаго, какъ бы молочнаго.

**П р и з н а к и** почечной каменной болѣзни. Боли, болѣе или менѣе постоянныя, въ той, или другой, или въ обѣихъ почечныхъ сторонахъ. къ этимъ болямъ присоединяются: сильная боль въ поясницѣ, а иногда и во всей ногѣ, соответствующей страдающей почкѣ; чувство нытья и боли въ бедрѣ и сильное подтягиваніе соответствующаго ячѣка къ брюшному кольцу; моча часто слизистая и мутная, а иногда совершенно водянистая, въ томъ и другомъ случаѣ дающая тяжелый осадокъ разныхъ цвѣтовъ, въ которомъ обнаруживается присутствіе песка, а иногда мелкихъ камешковъ, которые, большею частію, бываютъ продолговаты, на подобіе или финиковой косточки, или кедроваго орѣха, и притомъ всегда почти имѣютъ цвѣтъ желтовато-бѣловатый.

**П р и з н а к и** мочепузырной каменной болѣзни. Чувство тяжести, нытья и лома въ мочепузырной сторонѣ, боль передъ мочеиспусканіемъ и послѣ него, частое побужденіе къ мочеиспусканію, нерѣдко съ затрудненнымъ, совершающимся капля по каплѣ, и даже совершенною невозможностію, особенно внезапною, и въ ту самую минуту, когда моча бѣжала ручьемъ; чрезъ нѣкоторое время моча дѣлается слизистою съ гноевиднымъ осадкомъ, или кровянистою, причемъ мочеиспражнение становится болѣе или менѣе болѣзненнымъ, преимущественно въ шейкѣ пузыря послѣ движенія, а особливо послѣ ѣзды верхомъ, или въ повозкѣ, по неровной дорогѣ. Эти послѣднія явленія показываютъ отолстѣніе и изъязвленіе мочеваго пузыря. Впрочемъ замѣчено, что мочепузырные камни, достигши высшей степени развитія, иногда не обна-

руживаются никакими болѣзненными припадами въ продолженіе долгаго времени.

**Причины внутреннія (предрасполагающія).** Наслѣдственное и приобрѣтенное огисленіе и ослизненіе желудочно-кишечнаго канала и особенно крови; брюшное полнокровіе и сопутствующіе ему завалы и затвердѣнія брюшныхъ внутренностей, преимущественно селезенки и поджелудочной желѣзы; дѣтскій и старческій возрастъ, также ломота особенно располагають къ этой болѣзни.

**Причины внѣшнія (производящія).** 1) Пища и питье кислыя или легко переходящія въ кислое броженіе, напр. пряныя и вообще приправленныя кушанья, брѣвкія и терпкія (вяжущія) вина, непрерывная мясная пища и постоянное употребленіе наполненной земляными или каменными частицами воды; такъ, въ нѣкоторыхъ странахъ у жителей, равно какъ и у дѣтей, каменная болѣзнь бываетъ народною болѣзнію. 2) Сидячая жизнь. 3) Излишняя теплота въ постели, возбуждающая насильственно испарину и потъ. 4) Злоупотребленіе слабительныхъ средствъ. 5) Лежаніе на очень мягкихъ постеляхъ, особенно на спинѣ.

**Сущность каменной болѣзни** состоитъ въ сильномъ развитіи огисленія крови въ брюшной системѣ, такъ что осаждаются землянистыя вещества, отдѣляясь изъ крови. Но какъ это огисленіе крови принимаетъ свойство разныхъ кислотъ, такъ что въ нѣкоторыхъ случаяхъ походитъ на кислоту углекую, въ другихъ на соленую огисленную, въ нѣкоторыхъ же на сѣрную, то и каменное отложеніе бываетъ болѣе или менѣе различно. По первому случаю оно чаще бываетъ у дѣтей, по второму — у взрослыхъ холодно-мокротныхъ людей, а по третьему — у имѣющихъ мокротное брюшное полнокровіе, завалы и затвердѣнія упомянутыхъ выше внутренностей.

**Распознаваніе** по однимъ признакамъ болѣзни трудно; признаки труднаго мочеиспусканія, особенно у дѣтей, могутъ заставить только подозрѣвать, нѣтъ ли у дитяти въ мочевомъ пузырьѣ камня или камешковъ. Несомнѣннымъ же дѣлается только тогда, когда камнеродныя отложенія показываются наружу, или когда будутъ открыты хирургическимъ изслѣдованіемъ.

**Предсказаніе**, относительно для жизни, зависитъ: 1) отъ мѣстопробыванія камней; 2) отъ ихъ величины; 3) отъ степени развитія производимыхъ ими разстройствъ въ тѣлѣ. Относительно продолжительности, предсказаніе зависитъ отъ степени предрасположенія и возможности удаленія отложений.

**Исходы.** Въ *здоровье* переходитъ эта болѣзнь по удаленіи самыхъ отложений и по уничтоженіи предрасположенія и произведенныхъ ими болѣзней. *Болѣзни*, которыя сопутствуютъ и слѣдуютъ за каменною болѣзнію: разныя спазмы, воспаленія, отолстѣнія, изъязвленія и извуренія. *Смертью* оканчивается при посредствѣ этихъ болѣзней.

**Лѣченіе** діететическое, состоящее въ удаленіи причинъ бо-

лѣзни, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Опасающимся этой болѣзни въ предохраненіе себя должно совѣтовать избѣгать всего того, что сильно располагаетъ къ ней, и особенно того, что производитъ ее, а опасаясь ея по той причинѣ, что она была у ихъ отца и матери, должно избѣгать сидячей жизни, и если съ первыхъ признаковъ песка они будутъ наблюдать приличную діету, имѣть достаточное тѣлодвиженіе, то уничтожатъ причину болѣзни, или по крайней мѣрѣ не дадутъ ей усиливаться; но ежели будутъ продолжать тотъ же образъ жизни, которой причинилъ болѣзнь, то непременно усилятъ и ожесточатъ ее. Въ неизбѣжныхъ же случаяхъ, когда болѣзнь существуетъ въ народѣ отъ употребленія мѣстной воды, полезно, въ предохраненіе себя, пить на тощакъ *сокъ изъ желтой моркови, соки березовый и лимонный съ деревяннымъ масломъ и сахаромъ*, а нижнюю часть живота примачивать самую холодною водою. 2) Всѣмъ *одержимымъ пескомъ*, или *камнемъ*, должно *избѣгать кушаній* свойствъ *вѣтрогоннаго* и *горячительнаго*, какъ-то: соленыхъ плодовъ незрѣлыхъ, а употреблять преимущественно въ пищу картофель, морковь, рѣпу, рѣдьку, хрѣнь, лукъ, спаржу, артишоки, сельдерей, цыбули и разнаго рода крупы безъ мясной пищи, особенно говядины; въ *питье-сыворотку послѣ пахтанья, молоко съ водою, ячкую воду, отваръ изъ корней рожги, петрушки, солодковаго*, или изъ другого какого либо вещества слизистаго, сладкаго какъ-то: изъ *льнянаго семени* и проч. Если больной привыкъ къ употребленію спиртныхъ напитковъ, то можетъ пить *легкій пуншъ* безъ кислотъ. 3) Имѣть *умѣренное тѣлодвиженіе на вольномъ воздухѣ*, какого бы оно вида ни было, лишь бы не производило насильно пота и кровавой мочи. 4) Въ *предупрежденіи возвратовъ* болѣзни *нужно почти постоянно быть на той же діетѣ съ присовокупленіемъ въ пищу по временамъ веществъ животныхъ—мясныхъ и говядины*, а въ *питье бѣлаго вина съ равною частію воды; дѣтямъ дѣлать почаще ванны изъ чистой воды*, и оставлять въ нихъ дѣтя подольше, чтобы вода проникала въ тѣло. Замѣчено, что при уменьшеніи испарины увеличивается отдѣленіе мочи, и потому всего лучше, когда такія дѣти спятъ *на соломѣ, тюфляхъ, подъ легкимъ одеяломъ, въ прохладной спальнѣ*.

Лѣченіе существенное во всѣхъ видахъ каменной болѣзни, какъ трудно излѣчиваемой и при искусномъ пособіи со стороны врачей, требуетъ, большею частію, хирургическаго пособія, безъ котораго, равно какъ и за отсутствіемъ врача по близости, можно употреблять въ крайности слѣдующіе простые способы лѣченія въ разныхъ случаяхъ этой болѣзни.

Лѣченіе желчныхъ камней требуетъ продолжительнаго употребленія внутрь разрѣшающихъ средствъ, какъ-то: отваровъ *одуванчики* и *цикоря* (№№ 1, 2) приготовленныхъ съ *медомъ* или патокою; а *снаружи* мягчительныхъ припарокъ (№№ 54, 55) къ правому подвздоху, употребляемыхъ *каждодневно отъ 2-хъ до 4-хъ разъ въ день*. Для жи-

телей Кавказской области *кавказскія* минеральныя *щелочныя* воды очень полезны, но на употребленіе ихъ нужно испрашивать совѣта кого либо изъ мѣстныхъ врачей.

Лѣченіе песка и мочепузырныхъ камней. Въ этихъ случаяхъ одобряютъ *поташный щелокъ* (№ 215). Онъ имѣетъ очень ѣдкое свойство, и потому никогда не долженъ быть употребляемъ иначе, какъ въ *жидкостяхъ, подобныхъ студню-студенистымъ* или *слизистымъ*, какъ напр. въ *телячьемъ бульонѣ*, свѣжемъ *молокѣ*, *настоѣ* изъ *мянныхъ съмянъ*, *растворѣ аммоніачной камеди* (№ 115), или *отварѣ* изъ *корня рожни*. Больной долженъ сперва принимать это лѣкарство по малому приему, какъ-то: отъ 30-ти до 40 капель, и увеличивать приемы по мѣрѣ того, какъ желудокъ его будетъ привыкать къ нему. Когда камень образовался въ мочевомъ пузырьѣ, то употребляютъ *греческое мыло* и *известковую воду*, дѣлаемую изъ *скорлупы* или *раковинки устрицы* (№ 217). Больной долженъ принимать ежедневно, въ какойнибудь пріятной для него формѣ, сперва по 3 золотника греческаго мыла и выпивать по фунту этой известковой воды, раздѣливъ мыло на 3 неравныя части. Большую часть долженъ онъ принять очень рано поутру на тощакъ, вторую съ полудня, а третью въ 7-мъ часу вечера, запивая каждую изъ нихъ стаганомъ известковой воды. Остатокъ этой воды долженъ быть выпиваемъ между обѣдомъ и ужиномъ вмѣсто всякаго другаго питья; потомъ постепенно увеличивать приемъ мыла до 7-ми золотн., а известковой воды до 2—3 фунтовъ въ день. Но лучше и осторожнѣе будетъ, если больной начнетъ употребленіе известковой воды сперва *вторичной* (№ 218) и даже *третичной* (№ 219), а потомъ *вторичной* чрезъ нѣсколько времени, и наконецъ, когда онъ привыкнетъ къ нимъ, приступить къ употребленію первой, приемъ которой уже мало по малу увеличивать до 3-хъ фунт. въ день. Въ послѣднемъ случаѣ, когда это средство будетъ сносно для желудка больного, надлежитъ дѣлать воду сильнѣйшею, наливая ее во второй разъ на новособранныя и истолченные раковинки. Если употребленіе этихъ средствъ будетъ доступно желудку больного, и онъ замѣтитъ нѣкоторое облегченіе отъ нихъ, то продолжать употреблять ихъ долгое время, нѣсколько мѣсяцевъ и даже лѣтъ, если камень великъ. Но если желудокъ больного не въ состояніи выносить этихъ ѣдкихъ и жгучихъ веществъ, какъ сильно дѣйствующихъ на камень, растворяющихъ и разрушающихъ его, то съ большою пользою употребляется: *казанское мыло*, которое дается одно въ пилюляхъ, вѣсомъ по 2 грана каждая, сперва по 10-ти пилюль, умножая постепенно приемъ до 50-ти на приемъ, одинъ разъ въ день къ ночи; при этомъ не должно ужинать. Послѣ 4-хъ мѣсячнаго употребленія пилюль начинаютъ выходить камушки, причиняющіе мучительныя боли, отъ которыхъ помогаетъ употребленіе *сладко-миндальнаго молока* и т. п. въ большомъ количествѣ, до 2 графировъ въ день и горячія *мыльня ванны* для всего тѣла, полагая по 2 фунта мыла на ванну. Употребленіе этого мыла въ большомъ количе-

ствѣ считается безвреднымъ. При сопутствующемъ каменной болѣзни ревматизмѣ, прибавляютъ къ мылу 3-ю часть *баккаутовой* смолы (№ 230 \*). Отваръ *пастернака*, подслащенный медомъ, отваръ изъ нежжонаго *кофе*, принимаемый поутру и вечеромъ по 2 и по 2½ стакана, усиливаемый прибавленіемъ нѣсколькихъ капель (4—10—15 на стаканъ отвара) часто облегчаютъ больного, выгоняя множество волоконъ землянаго вещества. Очень полезна и *толокнянка*, или *медвѣжье ушко*, высушенные листья котораго употребляютъ и въ настоѣ какъ чай, (полагая золотникъ на стаканъ вскипяченной изъ самовара воды и настаивая въ чайникѣ на камфорѣ самовара отъ 20-ти до 30-ти минутъ, по два и по три раза въ день), а въ порошокъ отъ половины до золотника, также по два и по три раза въ день. Оно не причиняетъ никакого вреда \*\*).

Въ почечныхъ камнеродныхъ отложеніяхъ профессоръ Дядьковскій рекомендуетъ, между прочимъ, употреблять *перегонную воду* и *отвары моркови, петрушки, пастернака, спаржи и сельдерея*, также *содовые шипучіе порошки*, особенно съ *уксусною кислотой*. Взявъ двууглекислой соды 14 золотн., уксусной кристаллизованной кислоты 1½ золотн., смѣшать и употреблять 4 раза въ день и чаще по чайной ложкѣ, въ водѣ слегка подсахаренной, во время шипѣнія, а снаружи прикладывать къ мочепузырной сторонѣ, или къ промежности, мягчительныя припарки (№№ 54 и 55), съ прибавленіемъ къ нимъ листьевъ бѣлены (блекоты), полагая ея отъ 1/8 до 1/3 фунта на 1 фунтъ мягчительныхъ травъ. Употребленіе этихъ средствъ должно быть одновременное.

Анна Стефенсъ прославилась употребленіемъ *перезрѣнной яичной скорлупы*, какъ средства, уничтожающаго мочевые камни. Эту скорлупу можно давать съ пользою въ порошокъ отъ 1/2 до 1 золотн. въ какомъ нибудь питѣи изъ числа вышеозначенныхъ жидкостей, взрослымъ и особенно дѣтямъ, по три раза въ день.

## Желтуха (желтяница).

**О П Р Е Д ъ Л Е Н І Е.** Желтуха есть цвѣтородное отложеніе, обнаруживающееся свѣтло и темножелтымъ цвѣтомъ или всей поверхности тѣла, или нѣкоторыхъ частей, чаще бѣлковидной ткани (оболочки) глазъ.

**П р и з н а к и:** желтый цвѣтъ сначала на глазныхъ бѣлкахъ, на языкѣ, а потомъ и на всемъ тѣлѣ; цвѣтъ представляется въ разной степени густоты: свѣтложелтый (лимонный), яркожелтый (шафранный), темножелтый и даже черный; слюна, харкотина, и особенно моча и потъ, также желты и окрашиваютъ бѣлье; но испраженія низомъ сѣры и даже бѣлы, по недостатку въ нихъ желчи; при этомъ замѣчаются подъ ложечкою вправдъ; въ сторонѣ печени, напряженіе, тягость и тупая боль,

\*) Профессоръ Буальскій. Др. Здр. 1845 г. № 45. стр. 357.

\*\*) Буханъ. Томъ II. стр. 489—493.



даже припухлость и твердоватость печени, отвращеніе отъ пищи, отрыжка, пученіе и урчаніе въ животъ отъ вѣтровъ, горечь, вязкость во рту или кислый вкусъ, тошнота, головная боль; всѣ предметы кажутся желтыми.

Причины внутреннія: полнокрое воротной вены, раздражительность печени, воспаленіе и затвердѣніе ея, засореніе желчныхъ протоковъ камнями, запалывающими глистами, скопленіемъ нечистотъ въ желудкѣ и кишкахъ, препятствующими поступленію желчи изъ желчнаго пузыря въ 12-ти перстную кишку.

Причины внѣшнія (производящія) составляютъ всѣ случаи, которые могутъ раздражать печень и чрезъ то производить спазматическое состояніе желчныхъ протоковъ, какъ то: испугъ, ненависть, зависть, злоба, досада, огорченіе и гнѣвъ; простуда, удары на печеночную сторону, пресыщеніе пищею и питьемъ, раздражающими и способствующими развитію въ большомъ количествѣ въ тѣлѣ углерода и водорода; упорныя перемежающіяся лихорадки и особенно четырехдневныя и вяжущія лѣкарства, не кстатн употребляемыя для остановленія ихъ; беременность, остановка привычныхъ отдѣленій, какъ то: мѣсячныхъ кровей у женщинъ, геморроидальнаго теченія у мужчинъ и фонтанели (источника).

Сущность. Такъ какъ желтуха происходитъ оттого, что отдѣленная печенью желчь не изливается въ кишки, а всасывается и входитъ въ кровь, то сущность ея, слѣдовательно, состоитъ въ поступленіи желчи и ея началъ въ общую массу крови чрезъ всасываніе и отложеніе въ кожную систему (кожу); оттого въ желтухѣ желчь бываетъ вездѣ, кромѣ тѣхъ мѣстъ, гдѣ она должна быть, т. е. кишекъ и кала, который по этому и бываетъ бѣлый, сѣрый.

Распознаваніе очевидно.

Предсказаніе относительно опасности для жизни зависитъ: 1) отъ степени и свойства пораженія печени: чѣмъ ограниченнѣе это пораженіе, чѣмъ болѣе будетъ характера спазматическаго, тѣмъ предсказаніе *лучше*; при воспаленіи, отвердѣніи, камняхъ печени, желчнаго пузыря и желчнаго протока предсказаніе *хуже*; 2) отъ степени и продолжительности дѣйствія причины производящей. Относительно продолжительности болѣзни, предсказаніе зависитъ: 1) отъ степени причинъ внутреннихъ болѣзней; 2) отъ сложности желтухи съ другими болѣзнями печени; 3) отъ степени удаляемости причинъ внѣшнихъ производящихъ, словомъ: *желтухи сама по себѣ* (отъ простуды, гнѣва) *не опасна*, но она *упорна* и даже *смертельна* по своимъ *другимъ причинамъ* (воспаленіе, отвердѣніе, камни) и *послѣдствіямъ* (худосочіе, брюшная водянка и изнуреніе тѣла).

Исходы. Въ *здоровье* болѣзнь эта переходитъ безъ пособія, когда причина ея удалится сама собою, въ противномъ случаѣ переходъ въ *здоровье* возможенъ только при искусственномъ и притомъ правильномъ пособіи. *Болѣзни*: разстройство пищеваженія, недостатокъ питанія, ху-

досочіе, брюшная водянка, сильные поносы и другаго рода изнуренія тѣла. *Смертію* оканчивается при посредствѣ сопутствующихъ и послѣдующихъ болѣзней.

Лѣченіе діететическое желтухи тѣбуеетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) *Одержимые* желтухою *должны быть на діетѣ легкой, прогладительной и мягчительной* и употреблять въ пищу те-лячій или цыплячій бульонъ съ бѣлымъ хлѣбомъ, яичные желтки въ смятку, зрѣлые плоды, сладковатыя растенія и огородныя овощи, напр. печенія и варенныя яблоки, вареный свекольникъ въ видѣ ботвинья, шпинать и т. п. 2) Пить коровье молоко, сыворотку, подслащенную медомъ, и чистую, свѣжую воду; 3) *Имѣть тѣлодвиженіе*, верхомъ ли на лошади, или въ экипажѣ, *соразмѣрное силамъ ихъ*; прогулка пѣшкомъ, тихая и рѣзвая, равнымъ образомъ полезны въ этомъ случаѣ, лишь бы больные не чувствовали оттого боли и не имѣли никакихъ признаковъ воспаления (см. воспаленіе и особенно воспаленіе печени). Не рѣдко излѣчиваются отъ этой болѣзни долговременными путешествіями, предпринятыми уже послѣ безуспѣшнаго употребленія всѣхъ другихъ средствъ. 4) *Развлеченіе духа* веселыми разсказами, пѣніемъ и всѣмъ, что способствуетъ къ усиленію кровообращенія и разсвѣянію мыслей больныхъ, производить на нихъ хорошее дѣйствіе. 5) Подверженнымъ желтухѣ, въ *предупрежденіе возврата* ея, должно *советовать* также *быть*, сколько возможно болѣе, въ *тѣлодвиженіи*, *веселомъ* и спокойномъ *расположеніи духа*, *избѣгать пици и питья вяжущихъ и горьчительныхъ*.

Лѣченіе существенное состоитъ въ утишеніи раздраженія печени и въ доставленіи желчи свободнаго изліянія въ кишки. Это достигается различно: если желтуха есть слѣдствіе воспаленія печени, то она проходитъ отъ лѣченія послѣдняго (см. воспаленія печени). Если желтуха произошла отъ простуды, отъ гнѣва, испуга и т. п., то полезны *потогонныя средства*: баня, теплыя ванны, мягчительныя припарки изъ *стѣнной трухи* (№ 122) и *другихъ травъ* (№№ 54 и 55), пригладываемыя отъ 2 до 4 разъ въ день къ правому подвздоху прямо противъ печени. При этомъ въ промежуточное время между пригладываніями полезно втирать въ это же мѣсто *льняное масло*, вскипяченное съ *листьями бѣлены* (блекоты) или *маковаго цвѣта*, либо *головки маковыхъ* (которыхъ класть по 7 золотн. на 1 фунтъ масла), по чайной ложечкѣ до суха, также отъ 2 до 4 разъ въ день; а внутрь полезно давать *отваръ конопляныхъ сѣмянъ*, приготавливаемый такимъ образомъ: взявъ 28 золотн. коноплянаго сѣмени, налить на него двѣ кружки *блага* (яроваго) *пива*, сварить хорошенько и, подсластивъ сахаромъ, принимать по стакану раза четыре въ день, въ продолженіе 8-ми или 10-ти дней. Другое очень хорошее средство въ этомъ случаѣ есть *бѣлокъ* изъ самаго *свѣжаго яйца*, и если можно, то тотчасъ, какъ только снесетъ курица. Взявъ бѣлокъ изъ такого яйца, сбивать его до тѣхъ поръ, пока онъ будетъ походить на снѣгъ, потомъ, положивъ въ чаш-

ку, прибавить *попутниковой* (подорожниковой) *воды* три ложки, за немѣнѣемъ воды можетъ замѣнить ее *настояй* подорожника, приготовленный *въ видѣ чая*, и принять это лѣкарство за одинъ разъ поутру, будучи еще въ постели; потомъ порядочно укутаться, чтобы не помѣшать поту, возбуждаемому настоємъ. Такой приемъ должно повторять каждое утро до тѣхъ поръ, пока желтуха совсѣмъ пройдетъ; это продолжается обыкновенно пять или шесть дней. *Листья мясного орешника*, высушенные въ печкѣ и растолченные въ порошокъ, въ этомъ случаѣ считаются специфическимъ средствомъ; лѣкарство это готовится слѣдующимъ образомъ: отъ 1 до 2 золотн. порошка надо настоять въ продолженіе ночи въ стаганѣ бѣлаго вина и выпить этотъ приемъ утромъ на тощагъ. 12 или 16 такихъ приемовъ почти всегда бываютъ достаточны для полнаго излѣченія. *Риверово питье* (№ 62), употребляемое чрезъ 1—2 часа по 1—2 столовыя ложки; *штучіе порошки* (№№ 11 и 12), *лимонадъ* и *кислое питье* изъ кремортарта (№ 178) почитаются хорошими лѣкарствами въ этомъ случаѣ болѣзни. Если желтухѣ предшествовали невоздержность въ пищѣ, запоры на низъ, то лѣчение нужно начинать слабительнымъ, и въ этомъ отношеніи *ревень* особенно хорошо дѣйствуетъ и на низъ, и на отдѣленіе желчи. Его даютъ и въ порошокѣ съ водою отъ  $\frac{1}{4}$  до  $\frac{1}{2}$  золотн., и въ ревенномъ простомъ сиропѣ (№ 176), который особенно приличенъ дѣтямъ, по чайной ложечкѣ черезъ 1—2 часа до дѣйствія. Дѣйствіе ревеня полезно поддерживать клистирами (№ 95). За немѣнѣемъ ревеня можно употребить *отваръ* сухой коры *крушины* (№ 74). Если желтуха есть слѣдствие завазовъ въ печени, то врачи назначаютъ продолжительное употребленіе *свѣжихъ соковъ* разрѣшающихъ растений, какъ-то: *редьки*, *цикорія*, *одуванчика*, *чистотѣла* (чистюги), *пырея*, *лопушника* и т. п., также *сыворотки*, особенно *щавельной*, дѣлаемой изъ молока посредствомъ щавеля, *меда*, холодной воды, по утрамъ, которыя также полезны, какъ и *ванны съ поваренною солью*, *ежедневныя тренія живота*, *купанье въ морской водѣ*, *минеральныя стѣрныя и щелочныя навказскія*, *сѣрныя сергіевскія желѣзисто-сѣрно-кислыя и горько-солянныя солталичскія воды*, *сакскія* и *астраханскія стѣрныя грязи* и т. п. Желтуха, продолжающаяся 1—2 мѣсяца, угрожаетъ худосочиємъ, водянкою и настоятельно требуетъ пособія врача.

Примъч. Примѣчено, что *уксусный паръ* разсѣваетъ и истребляетъ желтизну глазъ даже и тогда, когда она остается по совершенномъ излѣченіи желтухи. Простонародіемъ замѣчено, что въ недавней желтухѣ, преимущественно глазъ, помогаетъ слѣдующее: пристально глядѣть на живую щуку въ сосудѣ съ водою, не сводя съ нея глазъ, или больной долженъ взять ее въ руки и смотрѣть на нее; тогда въ слѣдствіе этого щуга постепенно желтѣеть, слабѣетъ и даже часто умираетъ, а больной при этомъ выздоравливаетъ. По мнѣнію народа и янтарь вытягиваетъ желчь изъ тѣла, и для этого многіе носятъ вмѣстѣ съ вѣстомъ янтарную пронизь. Золоту, по мнѣнію нѣкоторыхъ, дана

таже сила. Для этого кладутъ золотое кольцо, а еще лучше червонецъ, въ рюмку хлѣбнаго или винограднаго вина и поятъ этимъ больнаго, страдающаго желтухою.

**Лѣченіе желтухи у новорожденныхъ дѣтей**, если у нихъ нѣтъ никакихъ другихъ болѣзненныхъ припадковъ, состоитъ въ освобожденіи ихъ отъ накопленія нечистотъ въ кишкахъ вышеупомянутымъ простымъ *ревеннымъ сиропомъ*. Когда дитя начнетъ слабѣть раза два въ день, болѣе противъ обыкновеннаго, и испражненія низомъ сдѣлаются натурального цвѣта, то надлежитъ перестать давать слабительное, при этомъ обыкновенно исчезнетъ и желтизна; если же и по прекращеніи слабительнаго она еще замѣтна, то слѣдуетъ всякій день *кнуты* дитя въ ванну, отчего желтизна совсѣмъ пропадаетъ, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда желтуха происходитъ отъ груднаго молока матери или кормилицы, на которыхъ, въ такомъ случаѣ, должно быть тогда обращено особенное вниманіе.

## Водяная болѣзнь (водянка).

**Опредѣленіе.** Водянка есть водородное отложеніе, обнаруживающееся скопленіемъ водянистой или сывороточной жидкости въ какой либо полости тѣла, или въ подкожной клѣтчаткѣ.

**Раздѣленіе.** По мѣстопробыванію своему эта болѣзнь бываетъ: 1) *подкожная*, когда вода находится въ клѣтчатой плевѣ между кожей и мышцами (мясомъ), если во всемъ пространствѣ тѣла, то называется *общей подкожною водянкою*, а если только на нѣкоторыхъ его частяхъ, наприм. на вѣкахъ, мошонкѣ, рукахъ, ногахъ, то называется *мѣстной подкожною водянкою*, или *отекомъ* вѣкъ, рубъ, ногъ и проч.; 2) *брюшная*, когда вода заключается только въ пространствѣ брюшной полости; 3) *грудная*, когда вода содержится въ грудной полости; 4) *головная*, когда вода находится въ полости черепа и 5) *мѣшчатая* (замыкающаяся въ перепонкахъ), когда вода заключена въ сумочкѣ, или въ особенномъ мѣшечкѣ, такъ что она не имѣетъ никакого сообщенія съ другими жидкостями тѣла; сюда принадлежатъ: а) водянка *околосердечья*, когда вода заключается въ околосердечной сумкѣ (сорочкѣ); б) водянка *яичника*; в) водянка *маточная*; г) водянка *брюшины* и *сальника*, когда вода заключается въ этихъ соимянныхъ органахъ и т. п.

**Признаки подкожной водянки.** Блѣдная, мягкая, тѣстовидная опухоль кожи, уступающая давленію, послѣ котораго остается впадина въ кожѣ, какъ на мягкомъ воскѣ, не скоро исчезающая. Если скопленіе жидкости подъ кожей, переходя изъ клѣточки въ клѣточку подкожной клѣтчатой плевы, распространяется, разливается по всему тѣлу и возрастаетъ до значительной степени, то кожа напрягается, расширяется, лоснится, и больной имѣетъ страшный видъ тучнаго человѣка.

**Признаки брюшной водянки.** Увеличеніе живота въ объемѣ; на-

пряженіе, упругость живота, примѣтное зыбленіе — колебаніе жидкости въ немъ; если прижать животъ ладонью руки съ одной стороны, а съ противной стороны другою рукою слегка ударить въ него, то можно чувствовать, какъ, при всякомъ ударѣ рукою въ брюшную стѣну, жидкость волною напираетъ на ладонь руки; въ началѣ болѣзни, когда еще не вся брюшная полость наполнена жидкостью, увеличеніе объема въ животѣ замѣчается только при стоячемъ положеніи больного; — моча мутная, темноватая, съ хлопками и испражняется въ маломъ количествѣ; испражненіе на низъ рѣдкое, даже запоръ, калъ жидкій, почти сухой (катышки); кожа, языкъ, полость рта также сухи, жестки; сильная жажда. По мѣрѣ накопленія воды въ животѣ и прижатія желудка, перевареніе въ немъ, особенно твердой пищи, происходитъ съ трудомъ; больной и послѣ умѣренной ѣды чувствуетъ тяжесть въ животѣ и тошноту; въ высшей степени накопленія жидкости въ животѣ прижимаются легкія, затрудняется одышка, сухой кашель; по мѣрѣ увеличенія живота, спина, руки и ноги худѣютъ, дѣтородныя части; а потомъ и ноги отекаютъ; появляется изнурительная лихорадка, боли въ разныхъ мѣстахъ, пролежни. Смерть слѣдуетъ при безпамятствѣ, или отъ задушенія. Впрочемъ болѣзнь можетъ продолжаться нѣсколько лѣтъ, особенно если не давать водѣ накопляться въ большомъ количествѣ. Изъ всѣхъ водянокъ брюшная случается и излѣчивается чаще другихъ.

**П р и з н а к и** грудной водянки. Стѣсненіе и тяжесть въ груди, одышка при движеніи и положеніи на спинѣ, боль между лопатками, отеки рукъ, лица, особенно вѣкъ; при быстромъ поворачиваніи съ боку на бокъ, больной и даже иногда посторонніе слышатъ въ его груди движеніе жидкости; частая перхота, сухой, короткій кашель, внезапное пробужденіе больного отъ сна, при чувствѣ тоски и задушенія и при усилии встать съ постели и дышать свѣжимъ воздухомъ; при большомъ накопленіи въ груди воды, больной не можетъ лежать на спинѣ, а дышитъ только сидя; пульсъ неправильный; тоска, по временамъ усиленное біеніе сердца, примѣтное даже снаружи чрезъ стѣны; обмороки; моча мутная, но не столько, какъ при брюшной водянкѣ.

**П р и м.** Прочіе виды водянокъ случаются рѣдко и во всякомъ случаѣ требуютъ непосредственнаго пособія самихъ врачей.

**П р и ч и н ы** внутреннія, составляющія предрасположеніе къ этой болѣзни, состоятъ вообще: 1) въ развитіи большаго количества сыворотки въ крови; 2) въ затвердѣніи брюшныхъ внутренностей, препятствующемъ правильному обращенію влаги; 3) въ малодѣятельности всасывающей системы и малоколичественномъ отдѣленіи кожей и почками.

**П р и ч и н ы** вѣшнія (производящія) вообще: 1) Чрезмѣрное употребленіе водянистаго питья и пищи малопитательной и водянистой, особенно въ душномъ нечистомъ воздухѣ, при неопрятномъ, болѣе или менѣе, содержаніи себя, какъ напр. у сыромятниковъ и мельниковъ, бываетъ производящею причиною водяной болѣзни. 2) Простуда и постоянная сырость, дѣйствующая на тѣло и остановившая накожное

отдѣленіе (испарину, потъ), особенно у садовниковъ, огородниковъ, сѣятелей риса, рыболововъ, охотниковъ и кирпичниковъ, мѣсячное очищеніе у женщинъ и геморроидальное кровотеченіе у мужчинъ. 3) Быстро прекращенные поносъ, бѣли, подагра (дактилагра). 4) Давленіе или прижатіе, мѣшающее свободному прохождению крови и соковъ; такъ, затруднительное сидячее положеніе съ потрясеніемъ предсердія ткачей и ткачихъ, бываетъ причиною водянки и такое же положеніе съ наклоненною и сторбленною грудью впередъ, у портныхъ производитъ преимущественно грудную водянку; перевязка руки, беременная матка причиняютъ отеки рукъ, ногъ и т. п. 5) Несчастныи исходъ множества продолжительныхъ болѣзней, болѣе или менѣе изнурительныхъ, какъ напр. продолжительныхъ перемежающихся лихорадокъ и т. п. 6) Большая и частая потеря крови, особенно отъ кровотеченій, ушибовъ, сильныхъ потрясеній, раздавленій. Въ частности: общая подкожная водянка появляется или вдругъ послѣ сильной простуды, остановленія испарины въ кожѣ, сокрытія острой сыпи, особенно скарлатины, или медленно, у людей рыхлыхъ, дряхлыхъ, тучныхъ, особенно у женщинъ. Брюшная водянка чаще происходитъ отъ воспаления брюшины, отъ заваловъ брюшныхъ внутренностей, особенно печени, селезенки, брыжечныхъ кишечныхъ желѣзъ, отъ продолжительной, упорной, худо лѣченной, перемежающейся лихорадки, отъ цынги, ревматизма, скарлатины, пьянства, отъ ушиба живота и проч. Грудная водянка сверхъ того часто есть слѣдствіе колотья въ груди (воспаленіе подреберной плевы), бугорковъ въ легкихъ (бугорчатой чахотки), грудной жабы, завала печени, продолжительнаго удушья и брюшной водянки.

Сущность водяной болѣзни, какъ вообще, такъ и въ частности, состоитъ въ неравновѣси (разладицѣ) между отдѣленіемъ и всасываніемъ сыворотки, по которому (неравновѣсію) оболочка, выстилающая полость, или влѣтчатая плева, отлагаютъ болѣе сыворотки, чѣмъ сколько ея всасывается, а оттого она, накопляясь болѣе и болѣе, образуетъ эту болѣзнь. Въ это понятіе о сущности входятъ и внутреннія причины болѣзни, собственно предрасположеніе.

Распознаваніе водянокъ подкожной и брюшной, какъ въ частяхъ болѣе наружныхъ и доступныхъ чувственному изслѣдованію чрезъ опухоль, увеличеніе объема и зыбленіе скопившейся жидкости, *легко*; но при скопленіи воды въ частяхъ внутреннихъ, недоступныхъ чувственному изслѣдованію, наприм. въ головной, грудной полостяхъ, распознаваніе очень *трудно*, особенно въ началѣ развитія болѣзни чрезъ расстройство грудныхъ органовъ, мозга. Можно однако иногда и брюшную водянку у женщинъ принять за начало беременности; но въ такомъ случаѣ нужно обратить вниманіе на состояніе у женщины мѣсячнаго очищенія, на чувство движенія младенца въ маткѣ; еще труднѣе распознать водянку, когда она появляется у дѣйствительно беременныхъ женщинъ. Эти случаи требуютъ пособія врача и даже акушера.

Предсказаніе, относительно опасности для жизни зависитъ: 1)

отъ степени предрасположенія; 2) отъ степени удаляемости причинъ производящихъ; 3) отъ времени продолженія болѣзни; 4) отъ устройства и важности частей, въ которыхъ развивается водородное отложеніе такъ, что чѣмъ сложнѣе, чѣмъ важнѣе для жизни и чѣмъ менѣе совершается всасываніе въ этой части, тѣмъ предсказаніе хуже; оттого изъ трехъ вышеупомянутыхъ видовъ водянки *грудная* бываетъ *опаснѣе прочихъ*; относительно продолжительности болѣзни предсказаніе вообще всегда *не выгодно*.

**Исходы.** Въ *здоровье* водянка переходитъ, большею частію, не иначе, какъ при самомъ разсчитливомъ пособіи, особенно грудная и другія, легче брюшная, еще легче подкожная, особенно мѣстная (отеки), проходятъ и излѣчиваются. *Болѣзни*, въ которыя она: переходитъ ударъ, задушеніе и другія. *Смертію* оканчивается при посредствѣ этихъ болѣзней.

**Лѣченіе діететическое** въ водяной болѣзни вообще требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Въ *предохраненіи* отъ этой болѣзни должно совѣтовать, сколько возможно, *избѣгать всѣхъ причинъ и поводовъ къ ея* происхожденію, какія выше показаны. 2) *Одержимый* водяною болѣзнію *долженъ воздерживаться* по возможности отъ всякаго питья, въ особенности *отъ напитковъ водянистыхъ*. Для утоленія жажды можно давать ему по глотку сыворотки, разведенной съ горчицею или съ бислымъ сокомъ клюбвеннымъ, брусничнымъ, щавельнымъ, лимоннымъ, померанцевымъ и съ уксусомъ. Для достаточныхъ очень полезно ренское вино, настоенное на мочегонительномъ лѣкарственномъ веществѣ. 3) *Пища* его должна быть *суха, свойства разгорячающаго и мочегонительнаго*, какъ-то: гречки, жареный рябчикъ и другая дичина, ароматическія и возбуждающія растенія, напр. чеснокъ, горчица, лукъ, рѣдька и т. п., изъ плодовъ — особенно свѣжіе, зрѣлые арбузы. 4) Если силы больного позволяютъ, то онъ долженъ *имѣть тѣлодвиженіе*, которое очень полезно въ этой болѣзни, напр. ходить пѣшкомъ, копать землю, *соразмѣрно его силамъ*; если ему этого не позволяютъ, то онъ долженъ по крайней мѣрѣ чаще ѣздить верхомъ или въ экипажѣ, причемъ весьма полезны самыя быстрыя движенія. 5) *Постель* больного должна быть *жестка; воздухъ* въ комнатѣ его *теплъ и сухъ*. Если онъ живетъ на мѣстѣ сыромъ, то долженъ перемѣнить свое жилище и перейти на мѣсто сухое и теплое. 6) Для возбужденія испарины и поддержанія тона въ кожѣ нужно два или три раза въ день *натирать тѣло* больного *сухими полотенцами, или мягкими щетками*, и убѣдить его всегда *носить* подъ рубашкою на голомъ тѣлѣ *фланелевую фуфайку*. 7). Эти діететическія правила нужно *соблюдать и по совершенномъ выздоровленіи* отъ болѣзни, т. е. когда уже выйдетъ изъ больного вода, какими-бы то ни было путями или каналами, собственно въ *предупрежденіе возврата*, съ употребленіемъ пищи сухой и питательной. 8) Для вышеозначенныхъ рабочихъ поселянъ, какъ-то: сыромятниковъ, огородниковъ, сѣятелей

риса, ткачей и портных изложены сверхъ того особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

Лѣченіе существенное, состоящее въ удаленіи причинъ болѣзни и непражненіи накопившейся жидкости, что составляетъ важный и трудный предметъ врачебной науки, требуетъ непременно приглашенія врача, за неимѣніемъ же его по близости надлежитъ совѣтовать больнымъ поступать въ больничныя заведенія, потому что очень мало такихъ простыхъ средствъ, которыя бывають удачны къ излѣченію этой болѣзни въ пребываніи больныхъ при своемъ домашнемъ образѣ жизни, развѣ причина болѣзни довольно удобоотклонима, и крѣпость тѣлосложенія, молодые годы, недавность болѣзни и другія выгодныя условія со стороны больного служатъ показаніемъ, что больному немного нужно для поправленія его здоровья. Въ такомъ случаѣ, и то въ крайности, за небытностію врача, можно прибѣгнуть къ слѣдующимъ простымъ способамъ лѣченія въ разныхъ случаяхъ этой болѣзни. Но прежде скажемъ объ одномъ общемъ престонародномъ потогонномъ средствѣ отъ водянокъ, развившихся послѣ сильной простуды, остановившагося пота и ссрывшихся внутрь сыпей, заслуживающемъ особеннаго вниманія. Взявъ цвѣтныхъ верхушекъ обыкновеннаго *чернобыльника*, наложить ихъ до половины въ кувшинъ, налитый водою, покрыть крышкою, замазать тѣстомъ и поставить часа на два, на три, въ вольную печь. Горючаго этого отвара (декокта) слабымъ больнымъ давать по 2 чайныя чашки, а крѣпкимъ по три, утромъ и вечеромъ, остатокъ же, сливъ въ бутылку, назначить вмѣсто обыкновеннаго питья. При этомъ употребляютъ слѣдующія *ванны*: взявъ корчагу, наполнить её до половины свѣжимъ лошадинымъ навозомъ, на который набросить 3—4 наваленныхъ до красна кирпича и поливать *хлѣбнымъ* (краснымъ) *уксусомъ*. На отдѣляющіеся *пары* каждое утро сажаютъ больного, раздѣвъ его до нага и завернувъ въ теплыя одѣяла; продолжать это до тѣхъ поръ, пока камни не остынутъ, или сколько времени больной можетъ вытерпѣть. Вмѣсто такихъ ваннъ можно дѣлать ихъ изъ *глухой крапивы*; дѣйствіе будетъ одинаково. Кромѣ кашицы или похлебки съ бѣлымъ хлѣбомъ и вышеозначеннаго питья, больнымъ ничего не позволено.

Лѣченіе брюшной водянки. Если при этой водянкѣ замѣчается постоянная боль въ животѣ, жаръ въ тѣлѣ и жажда, полный, скорый, твердый пульсъ; если больной крѣпокъ и полнокровенъ; если у него вдругъ начали пухнуть животъ, лицо, ноги; если болѣзнь произошла отъ прекратившагося кровотечения, или послѣ скарлатины. — то бывають полезны: *мявлицы*, приставляемыя вокругъ больного мѣста, *теплымъ припарки* изъ *сынной трухи* (№ 122) и *другихъ* мягчительныхъ и возбуждающихъ *травъ* (№ 54, 55 и 81), нарывной пластырь на больное мѣсто (№ 58), *слабительныя* изъ *огуречнаго разсола* (№№ 7, 120 и 129), *толокна съ медомъ* и *солью* (№ 72), *кремортарта*, принимаемаго по 2 золотн. съ водою за одинъ пріемъ четыре раза въ день въ продолженіе первыхъ трехъ дней лѣченія имъ, увеличивая потомъ



приемъ его болѣе и болѣе, даже наконецъ втрое противъ означеннаго количества, если только желудокъ больнаго въ состояніи будетъ выносить. Кремортартаръ въ этомъ случаѣ болѣзни имѣетъ иногда очень хорошія дѣйствія; онъ усиливаетъ испражненіе низомъ, гонитъ мочу и чрезъ то часто излѣчиваетъ водянку. Не менѣе того и селитра есть превосходное лѣкарство, особенно для усиленія отдѣленія мочи. Ее принимаютъ каждое утро по золотнику въ рюмкѣ легкаго пива. Но ее болѣе одобряютъ въ большихъ приемахъ, отъ 2—4 золотниковъ въ сутки; въ такомъ случаѣ должно учащать приемы отъ 2 до 4 разъ въ сутки, принимая каждый разъ по золотнику въ пивѣ, какъ выше показано, либо коноплянномъ, маговомъ, сладкоминдальномъ молокѣ. *Ваня*, въ которой простой народъ нерѣдко излѣчивается отъ водянки намазываніемъ тѣла *сырымъ медомъ съ солью, тертою рудкою*, послѣ того потѣніемъ и пареніемъ на полку, если позволяютъ силы больнаго выносить жаръ ея, дѣйствительно съ пользою можетъ быть допущена для привычныхъ къ ней, въ особенности изъ класса рабочихъ поселянъ; въ другихъ же случаяхъ, для непривычныхъ къ ней и болѣе значительныхъ поселянъ, могутъ быть полезны *ванны съ трубами*. Въ водянкѣ, развившейся отъ болѣзненнаго состоянія почекъ, когда онѣ не въ состояніи отдѣлять надлежащаго количества мочи (если, однако, при этомъ нѣтъ воспаленія почекъ и кровавой мочи), испытано слѣдующее мочегонное, простонародное средство: взявъ *нашатыря* и *сосновой смолы*, по шести золотниковъ, распустить то и другое въ штофѣ горячей воды и какъ можно долѣе взбалтывать. Утромъ и вечеромъ давать больному по рюмкѣ; если же онъ довольно крѣпокъ, то можно назначить приемъ по чайной чашкѣ и даже по стакану. Если водянка произошла послѣ заживленія застарѣлыхъ язвъ на ногахъ, остановленія вонючаго пота ножныхъ пальцевъ, то надобно возстановить то и другое: язвы — посредствомъ нарывнаго пластыря (№ 58) и потомъ фонтанели, а потъ — ношеніемъ на голоть тѣлѣ шерстяныхъ чулокъ, напитанныхъ растворомъ *каучука* (резинки) или простой *смолы*. Но если водянка есть слѣдствіе заваловъ внутренностей, застарѣлой перемешающейся лихорадки, то нужно употреблять разрѣшающія слабительныя, какъ напр. *коровье (снятое) молоко*. Его нужно употреблять одно вмѣсто пищи, питья и лѣкарствъ по столько, сколько желудокъ больнаго можетъ выносить, отъ 2 до 4 и болѣе кружекъ въ сутки. При употребленіи этого средства надо все вниманіе обращать на объемъ живота и мочу. На самомъ выпученномъ мѣстѣ водяной опухоли перваго нужно сдѣлать замѣтку или мѣрку на поясѣ, которую повѣрять ежедневно, такъ что, какъ скоро вода начнетъ уходить изъ полости живота, — выпораживаться, то и объемъ живота по этому будетъ уменьшаться, что вѣрнѣе покажетъ поясная замѣтка или мѣрка; а послѣднюю, т. е. урину, не выбрасывая, а накопляя въ теченіе сутокъ, взвѣшивать и замѣчать вѣсъ для памяти, такъ что при удачномъ, очень часто случающемся въ этомъ случаѣ водянки, лѣченіи ея молодомъ

скоро показываются спасительныя дѣйствія этого простаго способа; въ теченіе трехъ сутокъ, много недѣли, начинаетъ обыкновенно убывать объемъ живота на замѣткѣ или мѣркѣ пояса, а количество, или вѣсъ испраженной урины прибывать; при этомъ и больной обыкновенно говоритъ, что ему становится легче сердцу, груди, дыханію, и что онъ сталъ спать покойнѣе. Въ такомъ случаѣ употребленіе молока должно продолжаться до совершеннаго излѣченія болѣзни; тогда оно обыкновенно надобно и становится уже отвратительнымъ для больного, который потому, оставивъ его, непременно долженъ долгое время соблюдать діетическія правила въ предупрежденіе возврата болѣзни. Въ моей практикѣ былъ одинъ случай такого излѣченія этого рода водянки, тогда какъ больной, пользовавшійся постоянно въ теченіе полгода разными врачебными методическими средствами, нисколько не поправлялся отъ нея\*).

*Лимонный сокъ* (и лимонная кислота) съ сахаромъ и разведенный водою такъ, чтобы онъ могъ быть употребляемъ безъ отвращенія, оказываетъ также большую пользу въ этомъ случаѣ болѣзни и другихъ, зависящихъ отъ болѣзненнаго состоянія кожи, или брюшины, или под-реберной плевы. Онъ дается по столовой ложкѣ, раза два или три въ день, смотря по состоянію пищеваренія и силамъ больного \*\*). Въ томъ же самомъ случаѣ болѣзни, т. е. когда водянка происходитъ отъ заваловъ печени и селезенки, а равно и худосочнаго состоянія, въ слѣдствіе перемежающихся лихорадокъ, приноситъ пользу *черная горчица* (почти двѣсти наблюденій подтверждаютъ это), употребляемая въ слѣдующемъ видѣ: биятитъ въ закрытомъ сосудѣ отъ 7-ми до 14-ти золотниковъ зеренъ черной горчицы, приведенной въ крупный порошокъ, въ литрѣ сывотки или стараго вина. Первый отваръ процѣдить и давать больному выпивать его стаканами въ одинъ, или два дня. Въ этихъ случаяхъ горчица не производитъ ни рвоты, ни поноса; но она дѣйствуетъ иногда сильно на отдѣленіе мочи, иногда проходитъ въ нѣсколько дней серозное накопленіе и изліяніе влаги въ вѣтчатку \*\*\*) и съ тѣмъ вмѣстѣ уменьшается и проходитъ водяная болѣзнь. Если же при этомъ лѣченіи возобновится лихорадка, то надобно продолжать декокты; но вмѣстѣ съ тѣмъ употреблять лѣкарство, прямо дѣйствующее противъ лихорадки. Если же вмѣстѣ съ водяною болѣзнію находятся признаки воспалительнаго свойства, то ни подъ какимъ видомъ не употреблять горчичнаго отвара \*\*\*\*). Если и этотъ способъ окажется безуспѣшнымъ, то *кремортартаръ* и *селитру* по вышеозначенному способу ихъ употребленія можно совѣто-

\*) Этотъ способъ лѣченія коровимъ молокомъ особенно бываетъ удаченъ въ весеннее время, когда коровы ѣдятъ свѣжую сырую зеленую траву на луговомъ пастбищѣ, но иногда бываетъ полезнѣе цѣльное, а иногда снятое молоко.

\*\*) Др. Здр. 1847 г. № 5, стр. 36—38; 1844 г. № 50, стр. 392; 1841 г. № 45 стр. 317.

\*\*\*) Др. Здр. 1850 г. № 14, стр. 108.

\*\*\*\*) Др. Здр. 1850 г. № 44 стр. 347.

вать и въ этомъ случаѣ водянки, также *глауберову* горькую соль (№ 34) *можжевельныя ягоды*, варенныя съ молокомъ (взявъ 14 золотн. этихъ ягодъ и полштофа коровьяго молока, сварить вмѣстѣ и, процѣдивъ, употреблять по стакану 4 раза въ сутки) и вышеприведенныя слабительныя. Иногда слабительныя и мочегонныя средства въ соединеніи дѣйствуютъ лучше, чѣмъ даваемыя отдѣльно; въ другомъ случаѣ мочегонныя, прежде не дѣйствительныя, оказываютъ хорошее дѣйствіе послѣ слабительныхъ, равно послѣднія послѣ первыхъ. Отваръ *черныхъ таракановъ* (4—10 штукъ на стаканъ воды), употребляемый по получаскѣ 3—4 раза въ сутки, также сильно гонитъ мочу и испражняетъ воду; равно много способствуютъ всасыванію воды изъ живота *увиванія рукъ*, ногъ и живота. Въ этомъ видѣ водянки, т. е. происшедшей отъ заваловъ и отвердѣній брюшныхъ внутренностей, приносятъ пользу минеральныя воды: на Кавказѣ щелочныя, въ Солигаличѣ (Юстромской губерніи) *стърнокислыя* и *горькосоляныя*, въ Старой Руссѣ *соляныя*. Былъ случай, что одинъ несчастный страдалецъ, очень ослабѣвшій отъ этой болѣзни и долго лѣчившійся безъ всякой пользы, наконецъ покинутый въ самомъ отчаянномъ положеніи, по чьему-то совѣту совершенно и скоро излѣчился накладываніемъ ему на голый животъ и ноги извѣстнаго числа небольшихъ *лягушекъ* и производимымъ треніемъ этихъ частей. Въ продолженіе 3-хъ дней и 3-хъ ночей вложили ему на животъ по 35 лягушечекъ, и возобновляли ихъ по мѣрѣ надобности, а въ промежуткѣ, когда перемѣняли лягушекъ, были производимы сильныя тренія отъ конечностей къ срединѣ тѣла. Послѣ первой ночи, которую онъ едва могъ пережить, испражнения низомъ съ уриною стали отходить въ бѣльшемъ количествѣ. Черезъ три дня употребленія этого средства больной почувствовалъ себя гораздо лучше и, продолжая этотъ способъ лѣченія, черезъ нѣсколько дней излѣчился отъ водяной болѣзни, а вскорѣ и совсѣмъ выздоровѣлъ. Чувствованіе, возбуждаемое лягушками, ползавшими по тѣлу, особенно по животу, состояло въ щекотаніи. Наводимый лягушками ужасъ возбуждалъ во всемъ тѣлѣ трясеніе, ознобъ, дрожь, слѣдовавшія попеременно одно за другимъ; отъ этого особенно судорожно собрашались брюшныя мышцы и появлялись въ тѣлѣ особаго рода движенія, или сотрясенія, на подобіе электрическихъ \*).

Лѣченіе грудной водянки очень рѣдко бываетъ успѣшно. Она обыкновенно убиваетъ больного и притомъ или чрезъ задушеніе, или чрезъ кровавый ударъ въ голову, въ которой скопляется кровь по причинѣ труднаго для нея прохода чрезъ легкія. Самое лѣченіе одинаково съ лѣченіемъ брюшной водянки, особенно же хорошо дѣйствуетъ прописываемый врачами порошокъ изъ  $\frac{1}{2}$ —1 грана наперсточной травы; 8—10—12 гранъ *селитры* и 20—30 гранъ *кремортартара*; больной принимаетъ такихъ порошковъ 4—6 въ сутки въ теченіе 2—3 недѣль, оста-

\*) Др. Здр. 1843 г. № 84.

вляеть потомъ пріемъ порошковъ на недѣлю, а потомъ опять начинаетъ ихъ принимать, когда пульсъ, сдѣлавшійся отъ наперсточной травы медленнымъ, начинаетъ ударять чаще и съ пріостановкою. Но не мѣнѣе того бывають полезны порошки, употребляемые врачами и состоящіе изъ полуунца кремортарта, изъ полудрахмы до драхмы корня ялапны и одного или двухъ гранъ рвотнаго камня, раздѣленныхъ на 6 или 8 порошковъ. Эти порошки производять самыя обильныя, водянистыя испражненія низомъ и помогаютъ въ самыхъ упорныхъ водянкахъ, особенно въ грудной.

Лѣченіе общей подкожной водянки, происшедшей вдругъ (послѣ простуды, скарлатины) производится противовоспалительными (см. воспаление брюшины) и мочегонными, выше показанными средствами. Въ ней иногда бываетъ полезно и кровопусканіе изъ вены руки, но не иначе, какъ по совѣту врача. Медленно развившаяся водянка, кромѣ внутренняго лѣченія средствами, приведенными при водянкѣ брюшной, уступаетъ лѣченію, дѣйствующему на кожу, какъ-то: больнаго заставляютъ почаще и подольше лежать и сидѣть въ натопленной банѣ и намазываютъ его медомъ съ солью и тертою рѣдькою, или на печкѣ, и въ это время даютъ ему пить теплый чай изъ рубленой *соломы*, цвѣтовъ *липы*, *бузины*, *сухой малины*, растирають его суконками, щетками, втирають ему въ кожу *спиртъ березовыхъ почекъ*, *муравейный*, *камфорный* и заставляютъ его носить на голомъ тѣлѣ шерстяную, *фланелевую рубашку*, обуренную смолою, *пахучими травами*, напр. *богородскою травою*, *божьимъ деревцомъ*, *шалфеемъ*, простою *ромашкой* и т. п. Иногда хорошо дѣйствуетъ *березовая припарка* или *ванна*: собирають свѣжіе, сочныя *березовыя листья* и плотно набивають ихъ въ мѣшокъ, переночевавъ въ которомъ они сильно нагрѣваются, и тогда ими обкладываютъ всего больнаго, кромѣ головы; подъ эту припаркою онъ остается до тѣхъ поръ, пока она не пристанетъ, и все это время онъ сильно потѣетъ. Нѣсколько такихъ припарокъ иногда излѣчивають совершенно подкожную водянку. Дѣлають и такъ: набравъ свѣжихъ березовыхъ листьевъ въ концѣ мая или въ началѣ юня (въ сибирскомъ край), высушить ихъ такъ, чтобы сохранять въ нихъ какъ можно болѣе зеленаго цвѣта и свойственнаго имъ ароматнаго запаха. Этихъ листьевъ насыпають въ обыкновенную ванну столько, сколько нужно, чтобы больному не жестко было лежать на нихъ, и, раздѣвъ его до нага, приказываютъ ему ложиться въ ванну, потомъ засыпають его листьями такъ, чтобы ему можно было свободно дышать. Въ такомъ положеніи больной остается до тѣхъ поръ, пока онъ не начинаетъ чувствовать какого-то онѣмѣнія во всемъ тѣлѣ, послѣ чего онъ выходитъ изъ ванны. Эту операцію повторяють ежедневно по вечерамъ. Большею частію въ теченіе одной недѣли (рѣдко долѣе) больные выздоравливають. Точно также лѣчатъ ваннами мучными (изъ муки ржаной и пшеничной) и аромати-

ческими травами \*) Съ подобною же цѣлью сажаютъ больныхъ въ испарную печь, гдѣ они сильно потѣютъ, но могутъ однако и задохнуться, если въ печи будетъ очень горячо и отверстіе печи закрыто. Для приведенія въ дѣятельность кожи, паровыя ванны, особенно съ уксу-сомъ, настоемъ цвѣтовъ липы, ромашки, бузины, *можжевельникомъ отпаромъ*, дѣлаемыя всякій день посредствомъ поливанія на раскален-ный кирпичъ съ пучкомъ мяты, такъ чтобы пары прикасались къ на-гому тѣлу, вокругъ закрытому, дѣйствуютъ также превосходно. При-кладываніе *живыхъ муравьевъ* къ нижнимъ конечностямъ по способу д-ра Н. Шрейбера, описанному въ лѣченіи онѣмѣнія и паралича чле-новъ (см. лѣченіе паралича нижнихъ конечностей) въ водяной болѣзни, происходящей отъ прекращенія отправления испаряющихъ сосудовъ ко-жи въ слѣдствіе простуды, по его увѣренію, излѣчиваетъ эту болѣзнь въ теченіе 6-ти и 7-ми дней \*\*).

Лѣченіе мѣстной подкожной водянки или отека рукъ и ногъ, происходящихъ, большею частію, отъ начинающихъ возникать водя-нокъ, въ первомъ случаѣ грудной, а въ послѣднемъ брюшной, произво-дится также какъ и эти обѣ, только въ меньшемъ размѣрѣ. Чтожъ касается до тѣхъ случаевъ, когда руки затекаютъ при непрерывной и продолжительной работѣ съ опущенными внизъ руками, то по време-намъ, во время болѣзни, обыкновенно протягиваютъ и поднимаютъ ихъ вверхъ, причеиъ приливъ къ нимъ влаги отходитъ; если же отекаютъ ноги отъ продолжительныхъ и пристальныхъ работъ стоя, или сидя, въ такомъ случаѣ нужно носить на нихъ тѣсные-туго-надѣваемые длинные чулки, либо увивать ихъ широкимъ крѣпкимъ холщевымъ бин-томъ; а ложась для отдыха на постель, на диванъ или на полъ, должно поднимать ихъ болѣе или менѣе къверху и класть на что нибудь повыше, сравнительно съ положеніемъ туловища. Кромѣ того частое обмываніе рукъ и ногъ холодною водою предупреждаетъ и поправляетъ отекъ ихъ. Въ преклонныхъ однако лѣтахъ отекъ ногъ до того усиливается, что водянистая опухоль возвышается по колѣна; въ такомъ случаѣ долж-но лѣчить ее болѣе наружными средствами, какія означены въ лѣченіи подкожной водянки общей, особенно обкладываніемъ березовымъ ли-стомъ и ваннами для ногъ. Простой народъ часто избавляется отъ та-кого отека въ ногахъ припарками и ножными ваннами съ *лошадинымъ каломъ* (см. выше). Другое простонародное средство въ отекъ ногъ отъ мѣстной слабости состоитъ въ слѣдующемъ: чернь беретъ смолистую *канатную паклю*, и расчесавши въ правильныя волокна, обвертыва-етъ ею опухшія ноги до колѣнъ и оставляетъ эту обертку до разслаб-ленія ея, послѣ того перемѣняетъ, и до того времени пользуется этимъ средствомъ, пока отекъ пройдетъ \*\*\*). Есть еще средство для лѣченія

\*) Другъ Здр. 1843 г. № 42 стр. 322,

\*\*) Др. Здр. 1838 г. № 2. стр. 9 и 10.

\*\*\*) Др. Здр. 1837 г. № 5 стр. 37.

водяной болѣзни, употребляемое народомъ во всѣхъ видахъ водянки безъ разбора, состоящее изъ *отвара кожи тллы* (№ 223), который даютъ больному пить, вмѣсто питья, такъ чтобы въ день выпить какъ можно болѣе. Во время продолженія лѣченія больной чрезвычайно потѣетъ, чему должно способствовать теплымъ содержаніемъ и употребленіемъ паровъ посредствомъ нагрѣтыхъ кирпичей, поливаемыхъ водою съ пучкомъ мяты или богородской травы, божьего дерева, шаффея, душицы и т. п., чрезъ потъ постепенно уменьшается водяная болѣзнь, проходящая иногда въ двѣ недѣли. При этомъ должна быть диета легкая и умѣренная; лучше ѣсть чаще, но меньше; въ особенности должно избѣгать рыбныхъ яствъ, надобно часто мѣнять бѣлье на больномъ и постельное и всячески избѣгать простуды, особенно отъ сквознаго вѣтра. При лѣченіи водянки у вышеозначенныхъ рабочихъ поселянъ нужно соображаться во всякомъ случаѣ съ правилами, изложенными для нихъ, сверхъ того, особо въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію (см. это росписаніе).

## КЛАССЪ ПЯТЫЙ

### БОЛѢЗНИ ОТДѢЛЕНІЙ И ИСПРАЖНЕНІЙ.

О П Р Е Д Ѣ Л Е Н І Е (см. въ общемъ дѣленіи болѣзней не лихорадочныхъ на классы).

Изъ этихъ болѣзней сюда принадлежатъ наичаще случающіяся у поселянъ слѣдующія:

*Запоръ на низъ, запоръ (задержка) мочи, недержание мочи, болѣзненный потъ (потливость), болѣзненное мышечное очищеніе.*

### Запоръ на низъ.

Испражненіе низомъ есть необходимое условіе здоровья, но только число испражненій не у всѣхъ людей бываетъ одинаково; у маленькихъ дѣтей оно происходитъ 2—6 разъ, у большихъ 2—3 раза, а у взрослыхъ 1—2 раза въ сутки; у женщинъ чаще, чѣмъ у мужчинъ, а есть люди, которые, безъ разстройства здоровья, испражняются низомъ одинъ разъ въ 2—3 дня и болѣе; по этому запоръ на низъ есть дѣло условное. Впрочемъ, взрослый здоровый мужчина и женщина должны ежедневно одинъ разъ имѣть испражненіе низомъ; но если оно происходитъ рѣже, или и ежедневно, но въ маломъ количествѣ, то остающійся калъ скопляется въ толстыхъ кишкахъ, особенно справа и снизу въ животѣ, портится, густѣетъ, твердѣетъ, растягиваетъ кишки, прижимаетъ сосѣднія части, мочевоу пузырь у мужчинъ, матку у женщинъ, препятствуетъ кровообращенію, задерживаетъ кровь въ прямой кишкѣ (поче-

чій), производитъ приливъ крови къ головѣ (головную боль), къ груди (одышку, кашель), разстроиваетъ состояніе духа, помрачаетъ зрѣніе и проч. Такое неправильное (болѣзненное) состояніе недостаточнаго испражнения на низъ называется запоромъ на низъ.

Признаки, которыми обнаруживается, сверхъ того, запоръ на низъ, слѣдующіе: тягость и боль въ поясницѣ, полнота въ нижней части живота, особенно съ правой стороны, гдѣ нерѣдко замѣчается припухлость, возвышеніе, твердоватость и тупая боль; безуспѣшный помывъ къ испражненію низомъ, котораго притомъ уже не было въ теченіе 2—4 дней и болѣе.

Причины внутреннія, предрасполагающія къ запору на низъ: завалъ печени и недостатокъ желчи, ослабленіе кишекъ (привычный запоръ у пожилыхъ людей), опухоли въ животѣ, наросты и опухоли въ кишкахъ (упорнѣйшій запоръ), преимущественно же геморроидальныя страданія, съ которыми часто сопряжена бываетъ недѣятельность заднепроходной кишки.

Причины внѣшнія запора: сухая, твердая (безъ супа или щей), тяжелая пища (сухари, черствый ржаной хлѣбъ, пироги, блины, малороссійская лемешка, бессарабская мамалыга, крутая каша, горохъ, чечевица, фасоль, бобы, жолуди, орѣхи, лѣсныя жесткія груши, каштаны); продолжительное сидѣніе (запоръ у чиновниковъ, ученыхъ, портныхъ, сапожниковъ и башмашниковъ), употребленіе крѣпкихъ и вяжущихъ красныхъ винъ и другихъ крѣпкихъ напитковъ, не умѣренное тѣлодвиженіе, особенно въ верховой ѣздѣ, сжатіе живота корсетомъ (запоръ у женщинъ), беременность, невоздержная жизнь, частое употребленіе слабительныхъ лѣкарствъ.

Лѣченіе діететическое въ запорѣ на низъ, который хотя легко и скоро излѣчивается, но трудно уничтожается расположеніе къ нему, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Должно приучать себя *ежедневно поутру ходить на стулъ*, хотя бы и не было позыва, и, сидя на стулѣ, *тереть и мять животъ* пальцами въ теченіи  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  часа; если не было на низъ, то повторять это чрезъ 1—2 часа, даже въ третій разъ; 2) держать діету, которая доставляетъ болѣе жидкаго, чѣмъ твердаго кала, бушаты ежедневно супъ (съ пыреемъ, шпинатомъ), щи, свѣжее коровье масло, сливки, мозги, жирныя похлебки, особенно изъ потроховъ, растительные бульоны, приготовленные изъ щавеля, кервеля и латука, не очень черный хлѣбъ, болѣе ржаной, чѣмъ пшеничный и крупичатый, сухари, поменьше говядины, дичи, свинины, а побольше овощей, печеныхъ и вареныхъ плодовъ, особенно яблокъ, сливъ, грушъ, смородины, винныхъ ягодъ, винограда (апельсины, бергамоты, съѣденные поутру натошагъ, нѣкоторыхъ людей скоро и легко слабятъ); по утрамъ натошагъ пить холодную воду по 2—4 стакана и послѣ каждаго стакана воды ходить 10—15 минутъ; вообще пить довольно воды, кваса, сыворотки, молока, сыровца, хорошаго не очень крѣпкаго пива, меда, огуречнаго рассола, изрѣдка сокъ

изъ рѣпы, моркови, свѣжей свеклы; по утрамъ съѣдать немного квашеной капусты, кусочекъ селедки: тереть почаще животь просто руками или и масломъ: льнянымъ, деревяннымъ, ходить, ѣздить верхомъ, работать въ саду, огородѣ за токарнымъ станкомъ. 8) Для вышеозначенныхъ рабочихъ поселянъ, какъ-то: портныхъ, сапожниковъ, башмачниковъ и др. изложены сверхъ того особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію. 4) Если при такомъ образѣ жизни, запоръ все-таки продолжается, то надо прибѣгать къ существенному лѣченію.

Лѣченіе существенное въ запорѣ на низѣ состоитъ въ употребленіи противъ него лѣкарствъ, изъ которыхъ дѣйствительнѣйшія и безопасныя слѣдующія: *промывательное* изъ одной простой воды, мѣсяца два продолженное ежедневно, также простое промывательное изъ *маленьки мянныхъ стмянъ*, съ постнымъ, коноплянымъ *масломъ*, съ простымъ *мыломъ*, обыкновенною (столовою) или горькою *солью* (№ 75), наставляемое по утрамъ, бываетъ полезно не только въ то время, въ которое оно дѣйствуетъ, но и въ послѣдствіи имѣетъ ощутительную пользу, потому что отъ него натура можетъ привыкнуть къ ежедневному испражненію по утрамъ. Если же запоръ не уступаетъ этимъ простымъ промывательнымъ, то можно ихъ усиловать, прибавляя сперва въ воду по горсти поваренной соли и понемногу *коровьяго сывага* или *деревяннаго масла*; но когда онѣ подѣйствуютъ и испражняютъ хорошо, то должно приняться за промывательныя, состоящія изъ одной простой воды. *Разсолъ съ медомъ и масломъ* (№ 7); *толокно съ медомъ и солью* (№ 72); *отваръ* сухой коры *крушины* одинъ (№ 74) или съ *горькою солью* (№ 75), *ревень*, принимаемый понемногу ( $\frac{1}{2}$  золот.) два или три раза въ недѣлю, производитъ всегда вѣрное дѣйствіе, насколько не вредя желудочно-кишечному каналу, какъ сабуръ, ялаша и другія скоро и сильно дѣйствующія слабительныя. *Кремортартаръ*, принятый до  $3\frac{1}{2}$  золот. *въ ячмолъ настѣ*, имѣетъ подобное дѣйствіе. *Александрійскій листъ* съ черносливомъ (№ 186), который можно употребить и въ *кофе*, особенно *цикорномъ*: для этого кофе варится въ водѣ, въ которой цѣлую ночь пролежалъ листъ. Еще испытано, что *ставленіе ногъ въ теплую воду* каждое утро есть истинное средство возбуждать ежедневное испражненіе у женщинъ, подверженныхъ спазмамъ: а для другихъ довольно бываетъ посидѣть также поутру нѣсколько времени надъ паромъ теплой воды. Въ упорныхъ случаяхъ нужно прибѣгнуть къ совѣту врача. Въ запорахъ при завалѣ въ печени и др. внутренностяхъ очень полезны, сверхъ того, *минеральныя воды, содержащія стру и щелочь*, какъ-то: *кавказскія* и др. При лѣченіи рабочихъ поселянъ, портныхъ, сапожниковъ и башмачниковъ, нужно соображаться съ особо изложенными для нихъ правилами въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію (см. это росписаніе).

Лѣченіе запора на низѣ у младенцевъ. Младенецъ, питаемый своею матерью и живущій однимъ ея молокомъ, въ продолженіе первыхъ



шести мѣсяцевъ не бываетъ подверженъ этой болѣзни; она случается обыкновенно у тѣхъ дѣтей, которыя сосутъ чужое молоко, особенно если этому молоку 10—12—14 мѣсяцевъ и болѣе. Запоръ у такихъ младенцевъ бываетъ съ болью и располагаетъ иногда къ другимъ труднымъ болѣзнямъ; въ такомъ случаѣ надо взять кормилицу, которая бы имѣла молоко моложе, отъ 6 недѣль до 2 мѣсяцевъ. Но когда запоръ бываетъ у младенца, отнятаго отъ груди, то въ такомъ случаѣ онъ зависитъ отъ его пищи, которую слѣдуетъ перемѣнить и сдѣлать жиже; сверхъ того должно потирать ему каждый день животъ и желудочную часть теплою рукою; давать ему понемногу молока съ отваромъ овсяной крупы, прибавляя туда нѣсколько меда, выносить его для испражнения каждый день въ опредѣленную часть. При этомъ сколько возможно надлежитъ остерегаться дѣтей отъ лѣкарствъ, чтобы не сдѣлать болѣзнь упорнѣйшею. Единственное средство, какое только можно себѣ позволить, когда запоръ усилится, состоитъ въ легкой *рвеной водѣ* или *простою его сиропъ* (№ 176), даваемомъ по чайной ложечкѣ черезъ два часа до дѣйствія.

### Трудное испражненіе, или задержаніе мочи.

**О П Р Е Д ъ Л Е Н І Е .** Подъ этимъ разумѣется то болѣзненное состояніе, когда моча испражняется съ болью, либо она истекаетъ только по каплямъ, или же совсѣмъ останавливается.

**Р А З Д ъ Л Е Н І Е .** Оно бываетъ въ почкахъ, мочеточникахъ (рѣдко, см. воспаленіе почекъ и каменная болѣзнь почечная) въ мочевомъ пузырьѣ, и мочевомъ каналѣ, которое встрѣчается гораздо чаще, чѣмъ въ почкахъ.

**П р и з н а к и** задержанія мочи въ мочевомъ пузырьѣ: Больной имѣетъ частый, почти непрерывный позывъ мочиться, но не можетъ испустить мочи, по крайней мѣрѣ всей; въ нижней части живота спереди и подъ лобкомъ и снизу между бедеръ чувствуется тяжесть и напряженіе, спереди подъ лобкомъ появляется опухоль, мягкая, упругая, съ зыбленіемъ при прижатіи отъ вогнанія въ ней жидкости, причѣмъ чувствуется позывъ мочиться; эта опухоль, возрастая, доходитъ иногда до пупка, занимаетъ средину живота, а иногда ту, или другую сторону. Такъ какъ мочевой пузырь растягивается мочею болѣе къ низу, то, впустивъ пальцы у такихъ больныхъ — у мужчинъ въ задній проходъ, а у женщинъ въ маточный рукавъ, — можно замѣтить упругую, давящую опухоль, которая однако замѣчается явственнѣе у худощавыхъ, чѣмъ у тучныхъ людей. Если накопившаяся въ пузырьѣ моча не испражняется натуральнымъ путемъ, то пузырь можетъ разорваться, моча разольется по смежнымъ частямъ, произойдутъ мочевые нарывы и свищи, либо помертвѣніе брюшныхъ внутренностей и смерть, или же пузырь воспаляется, его воспаленіе переходитъ на брюшные органы и также оканчивается смертію. Отъ всосанія мочи изъ пузыря и ея разложенія въ пузырьъ появ-

вляется жестокая горячка, со рвотою водою и пролившимся потомъ съ запахомъ мочи и скорая смерть. Если моча задерживается медленно и не вдругъ, такъ что въ теченіе извѣстнаго времени она испражняется понемногу, а пузырь остается полнымъ, то послѣдствія задержанія мочи бывають не такъ явны и опасны: моча, разлагаясь въ пузырь, причиняетъ тихое воспаленіе его слизистой оболочки, умноженное отдѣленіе слизи, разстроивается общее здоровье, ослабѣваетъ пищевареніе, лицо блѣднѣетъ, желтѣетъ, тѣло худѣетъ, больной слабѣетъ, имѣетъ по временамъ лихорадку, иногда перемежающуюся, самый пузырь толстѣетъ, мѣстами расширяется въ мѣшки и складки, а его оболочки припухаютъ и толстѣютъ.

Причины внутреннія (предрасполагающія) суть: опухоль геморроидальныхъ сосудовъ, предстательной желѣзы (мочепускательнаго клапана) и другихъ смежныхъ брюшныхъ внутренностей, суженіе (стриктура) мочевого канала и воспаленія мочевого пузыря.

Причины внѣшнія (производящія): песокъ, камушки и камни, образовавшіеся и залагающіе мочевой каналъ, накопленіе сгустившагося кала въ заднепроходной кишкѣ; удержаніе въ пузырь мочи на долгое время; любовное сладострастіе, сидячая жизнь, ушибъ спины, сотрясеніе спиннаго мозга, параличъ ногъ. Задержанію мочи подвержены болѣе люди старыя, жившіе невоздержно, распутно, страдавшіе любовнаго болѣзнію, ломотою, подагрою, предававшіеся въ излишествѣ любовнымъ наслажденіямъ, ругоблудію (онанію), картежники, ученые, разные художники, мастеровые и т. п.

Сущность задержанія мочи состоитъ въ параличѣ, или онѣмѣніи мочевого пузыря при закрытомъ его отверстіи; въ понятіе о сущности его входятъ понятія о сущности и всѣхъ тѣхъ болѣзней, въ которыхъ оно бываетъ припадкомъ, напр. воспаленіе почекъ и мочевого пузыря, геморой, запоръ на низъ, беременность матки, каменная болѣзнь и т. п.

Лѣченіе діететическое въ задержаніи мочи требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) *Одержимый* задержаніемъ мочи *долженъ употреблять пищу въ маломъ количествѣ*, а вмѣсто питья обыкновеннаго *пить легкой бульонъ*, или *отваръ*, либо *настой съ слизистыми растеніями*, какъ то: съ корнемъ рожь, съ цвѣтами липы и т. п. 2) *Подверженные* этой болѣзни, въ предохраненіе себя отъ нея, *должны быть воздержны*, пищу употреблять легкую, а пить холодную воду безъ всякихъ кислотъ и терпкихъ винъ, имѣть умѣренное тѣлодвиженіе, спать на жесткихъ постеляхъ, избѣгать сидячихъ упражненій.

Лѣченіе существенное въ задержаніи мочи, по важности причинъ этой болѣзни и трудному распознаванію ихъ, требуетъ непремѣннаго участія со стороны врача, который всегда почти въ такомъ случаѣ напередъ выпускаетъ накопившуюся мочу посредствомъ катетера и потомъ избираетъ средства къ удаленію изысканныхъ имъ причинъ болѣзни для возстановленія здоровья. За неимѣніемъ же его по близости въ крайнемъ случаѣ при предстоящей опасности могутъ быть

допущены слѣдующіе дѣйствительные безопасные и простые способы лѣченія задержанія мочи. Сперва нужно поставить *промывательное* (№ 95), чтобы очистить и смягчить заднепроходную кишку, какъ часть смежную съ мочевымъ пузыремъ, и назначить употребленіе внутрь *доверова порошка* (№ 137), потому, если нѣтъ признаковъ воспалительныхъ въ тѣлѣ больного, т. е. жара, сухости во рту и другихъ лихорадочныхъ движеній, въ случаѣ сильнаго накопленія мочи въ мочевомъ пузырьѣ, нужно положить на нижнюю часть живота, соответственно положенію мочевого пузыря, *пузырь* (всего лучше свиначій), *наполненный* мелкими *кусочками льда*, въ лежачемъ полугоризонтальномъ положеніи больного вверхъ лицомъ, на столько времени, сколько больной можетъ выносить чувствуемый имъ хододъ ( $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  часа). Потомъ, по снятіи пузыря со льдомъ, если моча не показалась струей, въ то же мѣсто втереть *летучей мази съ камфорою* (№ 77) чайную ложечку до суха. Далѣе, какъ только больной успокоится отъ чувства холода, происшедшаго отъ накладыванія пузыря со льдомъ, немедленно наложить его опять и такимъ образомъ продолжать эти два средства попеременно до тѣхъ поръ, пока моча начнетъ истекать струей; по истеченіи мочи и минованіи, слѣдовательно, опасности, больной, оставивъ употребленіе доверова порошка, можетъ продолжать цѣлебное дѣйствіе холода *холодными частыми обмываніями* всей нижней части живота, поясицы и промежности бедеръ, *холодными примочками* и ежедневными *клизтирами* изъ холодной воды. Кто боится этого лѣченія холодомъ, тому должно принимать камедисто-камфорно-нашатырную смѣсь (№ 221). Во всѣхъ же другихъ случаяхъ задержаніе мочи, какъ то: если оно происходитъ отъ воспаленія мочевого пузыря или почекъ, должно дѣйствовать тѣми средствами, какія описаны въ лѣченіи этихъ болѣзней (см. воспаленіе почекъ и мочевого пузыря); если оно произошло отъ каменной; то и средствами, приличными этой болѣзни (см. каменная болѣзнь и т. д.) Когда задержаніе мочи произошло отъ беременности, то по большей части оно не требуетъ никакого лѣкарства; нужно только приказать больной, чтобъ она на постели искала такого положенія, которое бы удаляло беременную матку отъ нижнихъ частей тѣла, лежа на тотъ или на другой бокъ; а роды не допускаютъ возвратовъ этой болѣзни. Задержаніе мочи, происходящее отъ запора на низъ, излѣчивается средствами противъ послѣдняго, описанными выше (см. запоръ на низъ).

## Недержание мочи.

**О П Р Е Д Ѣ Л Е Н І Е.** Недержаніе мочи есть произвольное истеченіе ея.

**П р и з н а к и.** Моча истекаетъ произвольно и притомъ или безпрестанно по каплямъ (совершенное недержание мочи), или же только при побужденіи мочиться, которое, впрочемъ, происходитъ вдругъ и бываетъ

такъ сильно, что больной не можетъ его остановить и принужденъ мочиться въ постели, въ комнатѣ, въ бѣльѣ (не совершенное недержание мочи), или, наконецъ, больной мочится во снѣ въ постели.

**П р и ч и н ы.** Безпрерывное истеченіе мочи по каплямъ зависитъ отъ раскрытія отверстія мочевого пузыря и есть признакъ его паралича, который можетъ быть слѣдствіемъ трудныхъ родовъ у женщинъ, ушибовъ нижней части живота, спины, крестца, спинной сухотки, расширенія мочевого пузыря отъ частаго и продолжительнаго задержанія мочи; также остается послѣ вырѣзыванія мочевого камня и появляется у стариковъ отъ слабости, а у молодыхъ людей отъ распутной жизни, любовнаго страстнаго болѣзненія, мочевыхъ камней. Временно-непроизвольное (несовершенное) истеченіе мочи зависитъ отъ раздраженія пузыря мочевымъ камнемъ, пескомъ, острою мочою, глистами, особенно мелкими, гнѣздящимися у дѣтей въ прямой кишкѣ, приливомъ къ пузырю геморроидальной, мѣсячной крови; оно также происходитъ отъ окрѣплости стѣнокъ пузыря, отвердѣнія и опухоли прямой кишки, отъ наклоненія матки въпереди или опаденія ея къ низу, отъ язвъ и свищей въ пузырь, равно какъ и отъ привычки часто мочиться, слѣдствіемъ которой бываетъ суженіе пузыря и неспособность держать большое количество мочи.

**Л ѣ ч е н і е** рѣдко удается, особенно у пожилыхъ людей; а потому всѣмъ одержимымъ совершеннымъ и несовершеннымъ недержаніемъ мочи должно совѣтовать обращаться къ врачамъ, которые употребляютъ въ совершенномъ недержаніи мочи разныя крѣпительныя средства внутрь и снаружн, какъ то: *дубовую, ивовую, хинную* горьки, *железныи купоросъ, квасцы* въ видѣ отвара, примочки, *холодныя ванны*, простыя, дождевыя, съ направлениемъ дождевой струи на промежность, а сверху на лобокъ, *холодныя, железныя минеральныя воды*. Для опрятности больной долженъ носить *мѣшечекъ* изъ кожи, или *пузыря*, въ которомъ бы собиралась истекающая моча, для чего въ отверстіи такого мѣшечка слегка укрѣпляется головка ствола, а мѣшокъ помѣщается между бедеръ, близъ мошонки, и тесемкою привязывается къ пахамъ. Не совершенное недержание мочи они излѣчиваютъ чрезъ удаленіе его причинъ: неправильнаго гемороя, мѣсячныхъ кровей, глистовъ, заваловъ внутренностей. При мочевомъ пескѣ, какъ причинѣ недержанія мочи, полезенъ *штучный порошокъ*.

Недержание мочи у дѣтей во снѣ, какъ слѣдствіе дурной привычки, лѣни, холоднаго жилья, худой постели, привычки спать скорчивъ ноги, уничтожается тѣмъ, что дѣтямъ не даютъ пить на ночь, приучаютъ ихъ спать на бокахъ, а не на спинѣ, или животѣ, пробуждаютъ ихъ 2—3 раза ночью для испражненія мочи, стараются ихъ словами, наказаніемъ, сѣченіемъ голенищами сапоговъ, дѣтскую комнату содержать и дитя укрываютъ потеплѣе, дѣтскую постель дѣлаютъ спокойною; иногда помогаетъ покрытіе головки уда *пленкою изъ яичнаго бѣлка*.

## Болезненный потъ (потливость и прѣлость).

**О п р е д ѣ л е н і е.** Болезненный потъ, или потливость, есть неправильное излишнее, грубое, подлежащее чувствамъ водянистое накожное отдѣленіе изъ крови посредствомъ тончайшихъ иснаряющихъ сосудовъ кожи.

**П р и з н а к и.** Болезненный потъ рѣдко бываетъ самостоятельной болезнью, а обыкновенно онъ составляетъ припадокъ другихъ болезней. Онъ замѣчается въ послѣднемъ періодѣ чахотки, въ изнурительной лихорадкѣ, въ высшей степени цынги, перемежающейся лихорадкѣ, и вообще въ болезняхъ, производившихъ общую слабость въ тѣлѣ и изнуреніе; въ просовидной сыпи, также у женщинъ въ первый годъ послѣ прегращенія мѣсячныхъ кровей, у людей нѣжныхъ, чувствительныхъ, рыхлыхъ, тучныхъ, тяжелыхъ въ движеніи; у такихъ людей проливной потъ выступаетъ при малѣйшемъ движеніи, тепломъ питьѣ, въ постели, въ теплой комнатѣ. Болезненный потъ бываетъ холодный, клейкій и часто такъ обилень, что проникаетъ всё платье и постель больного, краситъ его бѣлье, распространяетъ особенный, неприятный, кислый запахъ. Онъ сильно ослабляетъ тѣло, особенно не полносочное, худощавое, и влечетъ за собою изнуреніе.

**П р и м.** Этотъ потъ въ родѣ того, или тотъ самый, по которому простолудины примѣчаютъ у труднаго больного, будетъ ли онъ жить или нѣтъ, посредствомъ небольшого намазыванія сильно потливыхъ мѣстъ его кожи сырымъ медомъ. Если медъ на кожѣ, не распускаясь въ поту, оставляетъ по себѣ пятна, говорятъ: «жить не будетъ»; въ противномъ же случаѣ говорятъ: «онъ встанетъ».

**П р и ч и н ы** этого пота всё тѣ болѣзни, въ которыхъ онъ случается частымъ припадкомъ.

**С у щ н о с т ь** его равнымъ образомъ состоитъ вообще въ сущности каждой изъ тѣхъ болѣзней, отъ которыхъ онъ происходитъ. Въ частности же сущность потливости состоитъ въ слабости тѣла и въ особенностяхъ кожи, въ усиленномъ приливѣ соковъ къ кожѣ, въ разжиженіи, растворѣ крови и соковъ.

**Л ѣ ч е н і е** болезненнаго пота зависитъ отъ излѣченія той болѣзни, которой онъ есть ничто иное какъ частный болезненный признакъ; по этому сильно потѣющіе люди должны прибѣгать къ совѣту врачей, которые, независимо отъ употребленія другихъ средствъ противъ самостоятельной при этомъ болѣзни, назначаютъ собственно противъ потливости *соляную сырную кислоту и квасцы*; за неизмѣнимъ же ни одного врача по близости, можно считать очень дѣйствительными, простыми и безопасными для умѣренія пота средствами слѣдующія: *купанье въ рѣкѣ, морѣ, холодныя ванны*, простыя и дождевыя; *омовеніе тѣла холодною водою съ уксусомъ, соляною кислотою* (2—3 унціи кислоты на ведро воды); нужно только ихъ употреблять тогда, ко-

гда тѣло не разгорячено и не потѣетъ. Для внутренняго же употребленія считается особенно дѣйствительнымъ средствомъ въ потливости холодная наливка въ водѣ, или настойка въ винѣ, *шалфея*.

Чаще случается мѣстная потливость на ногахъ, рукахъ, подъ мышками, на дѣтородныхъ частяхъ. Потъ въ ней отлпчается неприятнымъ запахомъ и причиняетъ попрѣлость; его легко остановить *холодною водою съ уксуомъ, квасцами*, но это часто можетъ быть опасно тѣмъ, что послѣ такой остановки пота появляется слѣпота, глухота, параличь, чахотка, одышка и проч. Гораздо безопаснѣе сильно потѣющія мѣста обмывать холодною *наливкою* изъ *ромашки, шалфея*, а для уничтоженія неприятнаго запаха обмывать ихъ *хлориновою водою*; для безопаснаго уничтоженія кожного пота совѣтуютъ носить *чулки, напитанные* спиртнымъ *растворомъ резинки* и потомъ высушенные. Но не менѣе бываютъ полезны и *березовыя почки* (по-малороссійски брунки), собираемыя при первоначальномъ развертываніи дерева и настоенныя въ хлѣбномъ винѣ (березовая настойка). Напитавъ тонкую бѣлую тряпочку, или хлопчатую бумагу, слегка примачивать прѣлыя мѣста два и три раза въ сутки. Отъ этого бываетъ прежде жженіе, которое потомъ вмѣстѣ съ зудомъ скоро проходитъ \*),

## Болезненное мѣсячное кровоочищеніе.

**Опрежденіе.** Мѣсячное кровоочищеніе, какъ главное явленіе полнаго развитія женскаго тѣла, имѣющее важнѣйшее вліяніе на здоровье и болѣзни женщинъ, называется особенно болѣзненнымъ, когда оно или останавливается, или усиливается и превращается въ настоящее кровотеченіе изъ матки.

**Раздѣленіе.** По этому болѣзненное состояніе мѣсячнаго кровоочищенія бываетъ наипаче двухъ родовъ: 1) *остановленіе мѣсячнаго кровоочищенія* и 2) *кровотеченіе (течь) изъ матки*.

### Остановленіе мѣсячнаго кровотечения.

**Раздѣленіе.** Оно бываетъ: 1) *быстрое*, внезапное и 2) *медленное*, тихое.

**Причины.** Быстрое остановленіе мѣсячнаго кровоочищенія во время его теченія происходитъ: 1) чаще всего отъ простуды, особенно живота, промоченія ногъ, отъ физическаго разгоряченія и потомъ охлажденія тѣла, напр. если молодыя крестьянки послѣ бани, теплой ванны, тяжелой работы до усталости и пота выходятъ, легко одѣтыя, на холодный воздухъ, пьютъ холодную воду, или, если молодыя дамы, послѣ танцевъ, въ легкихъ бальныхъ платьяхъ выходятъ въ холодную галерею, пьютъ холодное питье, ѣдятъ мороженое, или послѣ бала, не достаточно тепло одѣвшись, долго стоятъ на крыльцѣ, ожидая экипажа и

\*) Др. Здр. 1845 г. № 5, стр. 10.

т. п. 2) Нерѣдко отъ душевнаго потрясенія, какъ то: испуга, страха, радости, сильной и внезапной горести, и 3) иногда отъ погрѣшности въ діетѣ обремененіемъ желудка пищею жирною, трудноваримую, особенно кислую, напр. кислыми плодами, кислымъ молокомъ, или разгоряченіемъ его крѣпкимъ горячимъ чаемъ, виномъ.

**Признаки.** Предшествовавшая причина, послѣ которой вдругъ приостановилось теченіе мѣсячныхъ кровей, не смотря на то, что оно не продолжалось и половины обыкновеннаго срока (3—6 дней); въ слѣдъ за прекращеніемъ мѣсячныхъ кровей, появляются: тяжесть, жаръ и боли въ нижней части живота, полный, скорый твердый пульсъ, жаръ во всемъ тѣлѣ, жажда, словомъ: лихорадка. Если притомъ остановившаяся мѣсячная кровь бросается къ другимъ органамъ, то появляется колюще, головная боль, тошнота и рвота.

**Предсказаніе.** Быстрое остановленіе мѣсячнаго кровоочищенія есть опасная болѣзнь, и она еще тѣмъ опаснѣе, чѣмъ моложе, крѣпче и полнокровнѣе больная, еще не рождавшая дѣтей, чѣмъ болѣе она расположена къ удару, чахоткѣ, кровохарганію; у слабыхъ, малокровныхъ, рождавшихъ женщинъ оно не такъ опасно и легко приходитъ въ прежній порядокъ.

Тихое, медленное остановленіе мѣсячнаго кровоочищенія, или непоявленіе его въ свое время у поселянъ бываетъ очень рѣдко и происходитъ всегда отъ слабости въ тѣлѣ, малокровія и недостатка въ крови кровеносныхъ шариковъ, выражающагося всегда особеннымъ изнеможеніемъ и блѣдностью лица, извѣстнаго подъ названіемъ *двичья немочь*.

#### Кровотеченіе изъ матки.

**Опредѣленіе случаевъ,** требующихъ при этой болѣзни врачебной помощи. Мѣсячное, продолжающееся долго съ испражненіемъ въ значительномъ количествѣ крови, можетъ превратиться въ настоящее кровотеченіе изъ матки, которое, съ другой стороны, можетъ произойти и независимо отъ мѣсячнаго очищенія. Въ обоихъ случаяхъ теченіе крови изъ матки вѣрнѣе опредѣляется не количествомъ истекшей крови, которое, будучи въ сущности незначительно, можетъ казаться обильнымъ, особенно на чистомъ бѣлѣ женщины, но послѣдствіями потери крови; поэтому, если при мѣсячномъ очищеніи, или при другомъ кровотеченіи изъ матки, больная чувствуетъ общую слабость въ тѣлѣ, шумъ и звонъ въ ушахъ, потемнѣніе въ глазахъ, головокруженіе, наклонность къ обмороку, или падаетъ въ обморокъ при поднятіи головы; если у больной замѣчается блѣдное, осунувшееся лицо, холодныя руки и ноги, холодный, клейкій потъ, слабое медленное дыханіе, біеніе сердца при движеніи, слабый, скорый, прерывистый, переменяющій пульсъ, недостатокъ аппетита, грустное, унылое состояніе духа, къ вечеру отекаютъ ноги; если мѣсячное очищеніе продолжается 7—8 дней и болѣе, или же возвращается очень часто, чрезъ 1—2 недѣли, или наконецъ появляется чрезъ двѣ недѣли, или дѣлается даже

непрерывнымъ, съ небольшими только перемерками, кровотечение останавливается только на 3—7 дней, но потомъ опять возвращается, — то во всѣхъ этихъ случаяхъ кровотечение изъ матки есть болѣзнь, требующая врачебнаго пособія.

Причины внутреннія (предрасполагающія). Тучное, рыхлое, полнокровное тѣлосложеніе, цыготное худосочіе крови.

Причины внѣшнія (производящія): 1) сидячая жизнь; такъ, фабричные, работающіе сидя, торговки, сидящія въ лавкахъ и прилавкахъ, пряхи, мотальщицы, швеи, вышивальщицы, кружевницы, ведущія сидячую жизнь, подвержены бываютъ этой болѣзни; 2) частые роды и грубые приемы бабки, когда она преждевременно отрываетъ послѣдъ руками; 3) механическія насилія, дѣйствующія на животъ при мытьѣ, вытираніи и натираніи половъ (полотеры), ушибы, толчки при паденіи, прыганьѣ, верховой ѣздѣ и т. п.; 4) частое плотское соитіе, особенно во время теченія мѣсячныхъ кровей, и рукоблудіе (онанизмъ); 5) сочная, прѣная, горячительная пища и питье (мясо, дичь, шоколадъ, кофе, вино, водка, пряности); 6) воображеніе, разгоряченное романами, вольное обращеніе половъ, страстная любовь; 7) другія болѣзни матки, какъ-то: ракъ и полипы (рѣдко).

Исходы: въ *здоровьѣ*, съ удаленіемъ причинъ, особенно внѣшнихъ, и надлежащею помощію. *Болѣзни*, бывающія слѣдствіемъ излишняго маточнаго кровотеченія, слѣдующія: общая слабость, изнуреніе, худосочіе, дѣвичья блѣдность, наклонность къ водянкѣ, заваламъ, внутренностей, сухотка, чахотка.

Лѣченіе діететическое болѣзненнаго мѣсячнаго кровоочищенія, состоящее въ удаленіи причинъ, производящихъ послѣднее, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ вообще и въ частности, соотвѣтственно разнымъ его видоизмѣненіямъ. 1) Въ предохраненіи себя отъ этой болѣзни, женщины, со времени появленія у нихъ мѣсячнаго кровоочищенія (между 13-мъ и 16-мъ годами), до самаго окончанія (между 45-мъ и 50-мъ годами), должны *избѣгать* всѣхъ вышеозначенныхъ *причинъ*, которыя могутъ останавливать, усиливать и дѣлать его неправильнымъ (см. внѣшнія, производящія причины). 2) *Стражающая* быстрымъ, внезапнымъ *остановленіемъ мѣсячнаго очищенія*, должна *оставаться въ постели*, или хотя въ *теплой комнатѣ*, *держатъ ноги въ теплѣ*, не употреблѣть *ничего горячительнаго*, вина, пива, крѣпкаго чая, кофе, мяса и кислаго молока, сырыхъ плодовъ; но легкой супъ, похлебку, кашицу, молоко, воду, квасъ и быть въ покоѣ и хорошемъ, пріятномъ расположеніи духа. 3) Въ тихомъ, медленномъ остановленіи мѣсячнаго кровоочищенія, или неоявленіи его въ свое время, надо обращать вниманіе на причину болѣзни, общее здоровье и цвѣтъ лица и имѣть въ виду, что молодыя незамужнія женщины, бывъ беременными, часто стараются увѣрить, что у нихъ не появляются крови отъ простуды, испуга и проч. Открыть подобный обманъ очень трудно, и потому въ такомъ случаѣ вообще нужно поступать такъ: пока



отъ остановленія мѣсячнаго очищенія не замѣчается никакихъ явныхъ болѣзненныхъ переменъ (припадковъ), не надо употреблять никакихъ средствъ для возстановленія мѣсячнаго очищенія по крайней мѣрѣ въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ со времени его прекращенія. Если же по прошествіи 3—4 мѣсяцевъ не замѣчается увеличенія живота, то нужно пригласить повивальную бабку для осмотра больной, а потомъ пригласить и врача, или акушера, которому предоставить и все лѣченіе болѣзни; если кромѣ общей слабости въ тѣлѣ, блѣдности лица, уважительной причины происхожденія болѣзни, по ихъ осмотру окажется остановленіе мѣсячнаго кровоочищенія дѣйствительно болѣзненнымъ, предоставить больной въ этомъ случаѣ имѣть *достаточное тѣлодвиженіе* на вольномъ, сухомъ прохладномъ *воздухѣ*, употреблять *пищу здоровую, питательную, удобоваримую*, даже и крѣпкіе напитки, проводить время въ хорошемъ и пріятномъ для нея обществѣ. 4) *Страждущая сильнымъ мѣсячнымъ кровоочищеніемъ*, превратившимся въ сильное кровотеченіе (течь) изъ матки, *должна быть въ постели* и *совершенномъ спокойствіи души и тѣла*. *Лежать* ей должно *на спинѣ, на низкомъ изголовьи*; постель ея должна состоять изъ простаго волосянаго тюфяка, или изъ соломенника, потому что всякая перина и пуховая постель, по горячительному ея дѣйствию, считается совершенно неприличною въ этомъ случаѣ. Движеніе ей не позволяется никакое, даже не худо ей воздерживаться и отъ того, чтобы не говорить, если это только можно; неприличнѣйшая для нея *пища легкая и прохладительная*; она можетъ питаться холодными похлѣбками изъ телятины, изъ цыпленка, съ небольшимъ количествомъ хлѣба, но всего лучше первые дня два или три ей ничего не ѣсть, когда еще не будетъ имѣть слабости, а пить холодную воду, и если можно щавельную сыворотку, составляемую изъ щавелеваго сока съ молокомъ, и потомъ процѣженную, которая продолжительнымъ и постояннымъ употребленіемъ нерѣдко, при соблюденіи осторожности отъ всякаго излишняго тѣлодвиженія, воздержанія отъ супружескаго ложа, возбужденія страстей, употребленія вина и мясной пищи, излѣчиваетъ эту болѣзнь безъ возврата. Для вышеупомянутыхъ рабочихъ поселянокъ, подверженныхъ этого рода неправильному мѣсячному кровоочищенію по причинѣ сидячей жизни, какъ то: фабричныхъ, швей и проч., и отъ механическихъ усилій нижней части живота, напр. полотерокъ, изложены особыя правила въ описаніи поселянокъ по ихъ быту и званію (см. это описаніе).

Лѣченіе существенное во всѣхъ видоизмѣненіяхъ болѣзненнаго состоянія мѣсячнаго очищенія требуетъ приглашенія врача, а за неимѣніемъ его по близости, въ крайнихъ случаяхъ, можно употребить слѣдующіе простые дѣйствительные и безопасные способы.

Въ быстро остановившемся мѣсячномъ очищеніи, если больная не полнокровна, уже рождала дѣтей, чувствуетъ только жаръ, легкую боль въ животѣ, достаточны: теплыя *притирки* изъ *спяной труппы* (№ 122) и *другихъ* мягчительныхъ и побуждающихъ *травъ* (№№ 54, 55), при-

кладываемыя къ нижней части живота нѣсколько разъ въ сутки: *впрыскиваніе* въ предматочникъ теплаго отвара *лѣнянаго сѣмени*, *лѣннхъ крупъ* съ *молокомъ*, *корня просвинокъ*, *проскурника*, *мягчительное промывательное* изъ отвара этихъ же средствъ, а по временамъ *прохлаждающія* слабительныя, состоящія изъ *чернослива*, *коринжи*, *кремортартара*, *сыворотки* съ *медомъ* и *селитрою* (№№ 97, 98, 99, 100) или *шипуис порошки* (№ 11, 12), теплыя цѣльныя и ножныя *ванны* съ *отрубями*, *сильною струхою*; *паръ теплой воды*, надъ которымъ сажаютъ больныхъ. Нерѣдко остановленное мѣсячное очищеніе излѣчивается однимъ наружнымъ раздраженіемъ груди. Для этого прикладываютъ по *горчичнику* (№№ 88, 89, 90) къ наружной сторонѣ каждой груди, на 15 или же не болѣе какъ на 20 минутъ. Очищенія отъ этого скоро показываются, а краснота и небольшая опухоль, происшедшія на грудяхъ отъ горчичниковъ, проходятъ въ четверо сутокъ. Это средство полезно въ запоздаломъ очищеніи, и когда оно въ маломъ количествѣ \*). Но если женщина полнокровна, еще не рождала дѣтей, имѣетъ сильный жаръ, боль въ животѣ, или трудное, скорое дыханіе, твердый скорый пульсъ, то надо, чтобы напередъ поставлено было около отверстія предматочника 10—20—30 *пѣвнцъ*, смотря по тому, какъ обильно бываетъ у больной мѣсячное очищеніе. Врачи даже назначаютъ прежде всего *кровопусканіе* изъ носа въ этомъ случаѣ, и потомъ уже употребляютъ вышепоказанныя средства и т. п.

Въ сильномъ кровотеченіи изъ матки, видимо ослабляющемъ и истощающемъ тѣло, какъ скоро одного діететическаго лѣченія бываетъ недостаточно, и больная впадаетъ въ обморокъ, отъ котораго ей надлежитъ давать *нюхатъ уксусъ*, тереть имъ виски и проч. (см. обморокъ), необходимо приступить къ наружнымъ средствамъ: велѣть больной *ставить ноги въ холодную воду*, прикладывать *полотенца*, *намоченныя въ холодной водѣ*, на подбрюшіе и на лобковую кость; *ноги* на бедрахъ умеренно *перевязать поясомъ*, которымъ сжимались бы подкожныя вены, отчего замедлится приливъ крови къ животу \*\*). Самую *матку* можно *шпринцовать* (впрыскивать въ нее посредствомъ сифончика) *сокомъ* изъ *подорожника*, или *уксусомъ*. Сильное и продолжительное кровотеченіе изъ матки, не уступающее всѣмъ этимъ средствамъ въ теченіе 1—2 дней, требуетъ помощи врачей, которые употребляютъ въ такомъ слу-

\*) Др. Здр. 1835 г. № 6, стр. 44.

\*\*) Брестянки имѣютъ большое довѣріе къ дѣйствию этой перевязки поясомъ. У нихъ введенъ въ обыкновеніе еще слѣдующій способъ лѣченія посредствомъ его. Какъ скоро при перевязкѣ ногъ на бедрахъ поясомъ маточное кровотеченіе остановится, то больная, снявъ этотъ поясъ, сама въ началѣ весны, когда березы бываютъ въ соку, идетъ инкогнито въ березовую рощу и опоясываетъ имъ трижды вокругъ избранную ею какую нибудь березу, говоря: «я пограсовалась, покрасуйся и ты», потомъ завязываетъ туго узломъ трижды обведенный вокругъ березы поясъ и уходитъ. Увѣряютъ, что болѣзнь послѣ того не возвращается болѣе, а береза высыхаетъ.

чай *отрыскиваніе* въ предматочникъ отвара ивовой, дубовой, хинной корки съ квасцами, *железнымъ купоросомъ* (1—2 драхмы на фунтъ отвара), *вкладываніе* въ предматочникъ половинокъ сочнаго лимона, *зубки*, напитанной дубовымъ отваромъ съ квасцами; внутрь даютъ *квасцовую сыворотку*, дѣлаемую изъ 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> фунта молога и 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> золотника квасцовъ и потомъ процѣженную; *чай съ корицею* (золотникъ корицы на чашку чаю), при полнокровіи и волненіи крови *железныи* (черпильный) *купоросъ* по 1—2 грана, *селитру* (№№ 86—87), *кремортартаръ* (№№ 9 и 178), *горькую соль* (№№ 34 и 73). При цынготномъ расположеніи *противуцынготныя средства* (см. цынга). Въ застарѣлой этой болѣзни преимущественно полезны *железныя минеральныя воды кавказскія* и *лптецкія*. При лѣченіи вышеозначенныхъ рабочихъ поселянъ (см. причины вѣшней болѣзни) нужно соображаться съ особыми изложенными для нихъ правилами въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію (см. это описаніе).

## КЛАССЪ ШЕСТОЙ.

### БОЛѢЗНИ МѢСТНЫЯ, ОГРАНИЧИВАЮЩІЯСЯ, КАКОЮ ЛИБО ОДНОЮ ЧАСТІЮ ТѢЛА.

Сюда принадлежать, наипаче случающіяся между поселянами, слѣдующія болѣзни: *Раны, язвы, ожога, отмороженіе, ушибъ, цыпки.*

**О п р е д ѣ л е н і е.** Рана есть насильственное недавнее поврежденіе какой либо части тѣла, сопровождаемое слабымъ, или болѣе и менѣе сильнымъ кровоточеніемъ, происходящее всегда отъ причинъ совершенно вѣшнихъ для нашего тѣла.

**Р а з д ѣ л е н і е.** Раны различаютъ: 1) *По ихъ мѣстопребыванію* въ тѣлѣ, какъ напр. раны кожи, мышцъ, сухихъ жилъ, суставовъ, костей, головы или груди, живота, рукъ, ногъ и проч. 2) *По ихъ направленію*, какъ напр. раны продольныя и поперечныя, прямыя и косвенныя, поверхностныя и глубокія, проникающія въ грудь, животъ, раны съ лоскутомъ, т. е. съ полуотдѣленнымъ кускомъ мяса; но лучшее и ближайшее къ существенному объ нихъ понятію въ лѣченіи различіе ихъ: 3) *по роду ранящаго орудія, строенію раненой части тѣла и виду*; въ этомъ различіи онѣ наипаче бываютъ у поселянъ:

*Ръзанныя (поръзы, порубы); колотыя (уколы, проколы); разорванныя; ядовитыя (уязвленія).*

**П р и з н а к и и п р и ч и н ы.** 1) *Ръзанныя и рубленныя* раны въ крестьянскомъ быту самыя обыкновенныя; онѣ отличаются тѣмъ, что бываютъ кровоточивы болѣе другихъ ранъ (у мясниковъ, живодеровъ, плотниковъ и столяровъ); раны, нанесенныя ножемъ или косою, крово-

точивѣе, чѣмъ раны серпомъ, пилюю, за то первыя заживаютъ скорѣе послѣднихъ. Рѣзанныя и рубленныя раны чаще расходятся своими краями, потому что при нихъ бываютъ раздѣлены глубоко и ровно кожа, мышцы, сухія жилы; при этихъ же ранахъ, нанесенныхъ съ большаго размаха, часто отдѣляется лоскутокъ мяса съ кожей, подпальца, часть носа, уха и проч.

2) *Колотыя раны* наносятся остроконечнымъ орудіемъ, какъ-то: иглою (у портныхъ), шиломъ (у саножниковъ и башмачниковъ), вертеномъ, проволокою, пилюю, штыкомъ и т. п. Всѣ эти орудія, вообще въ концѣ тонкія, а въ срединѣ толще, на подобіе клина, распираютъ части нашего тѣла, жмутъ ихъ, ушибаютъ и разрываютъ; поэтому колотыя раны опаснѣе рѣзанныхъ и рубленныхъ: онѣ бываютъ иногда очень длинны и извилисты, проникаютъ до внутренностей, причиняютъ сильное, рожистое воспаленіе, лихорадку, нервныя припадки, обильное нагноеніе.

3) *Разорванныя раны* наносятся зубами животныхъ, которыя часто вырываютъ кусокъ мяса, клещами, колесами телѣгъ, крыльями и шестернею мельницъ, ушибомъ отъ камня, палки, паденія человѣка съ высокаго мѣста, или обрушенія на него бревенъ, кирпичей и т. п. Разорванныя и ушибенныя раны имѣютъ неправильный видъ, не гладкую, темную, черную, синюю поверхность, неровные края съ висящими кусками и лоскутами, иногда цѣлые члены бываютъ отшибены и оторваны. Такъ какъ ушибъ и растяженіе уничтожаютъ жизнь въ мягкихъ частяхъ, то послѣднія теряютъ свою упругость и чувствительность, и оттого такія раны въ началѣ почти не болятъ и края ихъ не сжимаются; онѣ не бываютъ кровоточивы, не смотря даже на разрывъ или раздѣленіе большихъ кровяныхъ сосудовъ, но за то въ этихъ ранахъ на 2—3 день появляется боль, опухоль, жаръ, воспаленіе и во всемъ тѣлѣ обнаруживается лихорадка; воспаленіе или переходитъ въ антоновъ огонь, распространяющійся на смежныя, ушибенныя и растяженныя части, или же причиняетъ обильное, изнурительное нагноеніе. При этихъ жеранахъ бываетъ часто сотрясеніе головы, груди, раздавленіе внутренностей живота, переломы костей и т. п. Ранамъ этого рода бываютъ подвержены особенно: атлеты или бойцы, охотники, носильщики и крочники, бурлаки (лямщики) и мясники во время подниманія цѣлага животнаго или значительной его части. Садины на рукахъ у рыболововъ отъ прикосновенія рыбы принадлежатъ сюда же.

4) *Ядовитыя раны*. Эти раны бываютъ двоякія: нанесенныя здоровыми, но ядовитыми, и больными бѣшеными животными. Перваго рода раны, происходя отъ ужаленія пчелою, осою, паукомъ (тарантуломъ) и укушенія змѣею, производятъ въ нашемъ тѣлѣ описанную уже выше въ числѣ воспаленій болѣзнь, называемую «*бллая рожа*» а послѣднія — раны, наносимыя бѣшеными животными, какъ-то: бѣшеными волками зимою, во время ихъ течи, бѣшеными собаками лѣтомъ, иногда лисицею, рѣдко бываютъ опасны сами по себѣ, но по своимъ

послѣдствіямъ *водобоязни*, ужасной и неизлѣчимой болѣзни. У всѣхъ этихъ животныхъ бѣшенство развивается первоначально чрезъ зараженіе, отъ котораго также бѣсятся кошки и свиньи (очень опасныя въ своемъ бѣшенствѣ), рогатый скотъ, коровы, быки, овцы и лошади: послѣдніе три рода животныхъ рѣдко кусаютъ людей, но бодають рогами и бьютъ ногами. Когда нанесена рана какою либо собакою, то прежде всего нужно знать, не бѣшена ли она.

**П р и з н а к и** бѣшеной собаки слѣдующіе: изъ рѣзвой она дѣлается тихой, по временамъ воетъ, скукаеть, не бѣгаетъ а ходитъ тихо, не ѣстъ и не пьетъ хватаетъ въ ротъ и лижетъ все, что ей ни попадется, начинаетъ бояться воды; встрѣчающіяся съ нею собаки убѣгаютъ отъ нея со страхомъ и визгомъ. При совершенномъ бѣшенствѣ глаза у нея дикіе, блуждающіе, налитые кровью, слезоточивы, бѣшены, хвостъ обвислый и даже вьзатый между ногъ, шерсть на спинѣ стоитъ дыбомъ; на ходу и бѣгѣ собака шатается какъ бы пьяная, бѣжитъ не по прямой линіи, но безпрестанно уклоняется въ стороны, на бѣгѣ часто падаетъ, съ остревненіемъ и безъ страха бросается на людей и животныхъ, и кусаетъ даже своихъ хозяевъ; изо рта течетъ вязкая слюна; собака при видѣ воды визжитъ, получаетъ судороги, въ которыхъ и оболѣваетъ.

Сущность ранъ видна изъ опредѣленія, съ присовокупленіемъ понятій объ ихъ разности, кровоточивости, причинахъ и случающемся при нихъ болшемъ, или меньшемъ, лихорадочномъ состояніи тѣла.

**Р а с п о з н а в а н і е** ранъ, по свойственнымъ каждому ихъ виду вышеописаннымъ признакамъ и причинамъ, довольно очевидно и легко, за исключеніемъ ранъ колотыхъ, которыя, бывая иногда очень длинны и извилисты, проникая до внутренностей, распознаются довольно трудно, такъ что для узнанія длины и хода колотой раны, врачи принимаютъ въ соображеніе форму и длину вошедшаго въ тѣло орудія, разсказы раненаго, направленіе боли въ раненомъ мѣстѣ, и слегка вводятъ въ рану толстый зондъ (металлическій цилиндръ, на подобіе толстой прямой проволоки), слабо держа его между пальцами и двигая по ранѣ безъ всякаго усилія. Впрочемъ, если какъ нельзя узнать длины раны и нѣтъ кровотеченія, то и не дѣлаютъ для того другихъ попытокъ: колотая рана хорошо заживаетъ, хотя бы и не узнали ея длины и направленія.

**П р е д с к а з а н і е** въ ранахъ относительно опасности жизни зависитъ: 1) Отъ ширины и глубины ихъ поврежденій и происходящихъ отъ нихъ кровотеченій, равно и отъ величины ранящаго орудія; такъ, порубъ важнѣе порѣза, уколъ копьемъ или пиквою опаснѣе поруба. 2) Отъ силы стремленія, съ какою понесена рана, и важности части тѣла, пораженной ею. Такъ, разможженіе черепа, сквозной проколъ груди съ поврежденіемъ сердца, равно какъ и проколъ живота съ поврежденіемъ кишекъ, совершенно (абсолютно) бываютъ смертельны, а разможженіе всей руки шестернею колеса на мельницѣ менѣе бываетъ опасно, нежели рана на головѣ отъ ушиба камнемъ, или легкой порѣзъ на шеѣ,

повредившей сонную артерію, даже поранившей пульсовую жилу у кисти ручной; потому что и легкія поврежденія въ кровобіоцихся жилахъ, какъ данныхъ для храненія источника физической жизни чело-вѣка, въ твердой и жидкой его формѣ, бываютъ смертельны столько же, сколько даже и одни потрясенія мозговыхъ нервовъ и самого мозга, какъ данныхъ для душевныхъ его отравленій. 3) Отъ ихъ вида и рода ранищаго орудія; такъ, колотыя раны считаются вообще опаснѣе рѣзанныхъ, разорванныя опаснѣе колотыхъ, а ядовитыя рѣдко бываютъ опасны сами по себѣ, какъ уже было сказано выше, но по своимъ послѣдствіямъ въ болѣзняхъ бѣлой рожи (см. бѣлая рожа) и ужасной, неизлѣчимой водобоязни. 4) Отъ лихорадочнаго, или горячечнаго состоянія, сопровождающаго нерѣдко раны: чѣмъ сильнѣе лихорадка или горячка, тѣмъ опаснѣе бываютъ раны. Относительно продолжительности, предсказаніе въ ранахъ вообще выгодно, потому что они непродолжительны, за исключеніемъ: а) ранъ разорванныхъ, особенно въ ручныхъ кистяхъ, причиненныхъ шестернею колеса на мельницѣ, или разрывомъ ружейнаго ствола при выстрѣлѣ, которыя продолжаются мѣсяцы и даже годы; б) ранъ въ другихъ суставахъ, какъ то: колѣна, локтя, стопы и ранъ отдѣлительныхъ органовъ (слюнныхъ желѣзъ, печени, почекъ, пузыря), которыя заживаютъ трудно, превращаются въ язвы, изнуряютъ раненаго и причиняютъ нерѣдко первыя — негибкость суставовъ, костоду, а послѣднія — свищи (фистулы). в) Возрастъ и здоровье крови также имѣютъ большое вліяніе на продолжительность ранъ, которыя скорѣе заживаютъ у молодыхъ, чѣмъ у стариковъ, страждущихъ лмотою, любострастною болѣзнію, у золотушныхъ, цынготныхъ, нездоровыхъ людей, имѣющихъ, какъ говорятъ, дурную кровь; у нихъ раны чаще заживаютъ чрезъ нагноеніе и переходятъ въ язвы.

Лѣченіе ранъ вообще бываетъ *предохранительное и существенное*. Въ первомъ требуется соблюденіе правилъ, изложенныхъ для вышеозначенныхъ рабочихъ поселянъ, какъ то: атлетовъ, или бойцовъ, охотниковъ, носильщиковъ, крючниковъ, бурлаковъ, мясниковъ, живодеровъ, плотниковъ, столяровъ, портныхъ, сапожниковъ, башмачниковъ и рыболововъ, въ особомъ расписаніи поселянъ по ихъ быту и званію; а въ послѣднемъ существенное условіе успѣшнаго заживленія всѣхъ ранъ, которое состоитъ въ томъ, чтобы раненныя и изломленныя части нашего тѣла привести въ то положеніе, въ которомъ содержитъ ихъ сама природа, то есть сблизить ихъ края между собою и уравнить, защитить отъ непріязненнаго для нихъ дѣйствія воздуха и другихъ постороннихъ тѣлъ и содержать раненныя части въ приличной чистотѣ, теплотѣ и влажності. Нигдѣ такъ не видно могущественное, цѣлительное дѣйствіе природы нашего тѣла, какъ при заживленіи ранъ. Въ нихъ, безъ ея пособія, всѣ наши пластыри, мази, примочки и припарки ничего не значатъ и не заживляютъ даже и простой царапины кожи, какъ это можно видѣть на людяхъ тощихъ, худосочныхъ, изнуренныхъ, у которыхъ легкая раночка дѣлается язвою и не заживаетъ. Природа на-

шего тѣла сама останавливаетъ кровотеченіе, запирая кровотокацій сосудъ, какъ пробкою, стекшеюся кровію и свившимися въ шнурокъ его облочками, удаляетъ изъ раны постороннее тѣло, производя вокругъ его нагноеніе, или запирая его въ особенный мѣшокъ, сдвигаетъ, сближаетъ раздѣлившіяся края раны, и обнаженныя отъ кожи части покрываетъ особенною пленкою, струпомъ, подъ которымъ раненныя части содержатся въ равномерной теплотѣ и влажности и потомъ покрываются настоящею кожей — рубцомъ. Лѣченіе ранъ непосредственнымъ, прямымъ *соединеніемъ ихъ краевъ* между собою происходитъ скоро и бываетъ успѣшно, потому что при немъ выполняются всѣ упомянутыя условія, а выполняетъ ихъ растительная сила нашего тѣла — нашъ внутренній врачъ. И такъ лѣченіе ранъ вообще состоитъ въ изслѣдованіи раны, въ удаленіи изъ нея посторонняго тѣла (если такое есть въ ней), въ остановленіи кровотечения, въ заживленіи раны чрезъ скорое соединеніе, или чрезъ нагноеніе, и въ удаленіи припадковъ раны.

Для выполненія перваго условія прежде всего нужно, когда кто нибудь будетъ раненъ, чтобы разсмотрѣна была рана, нѣтъ ли въ ней какаго нибудь посторонняго тѣла, какъ-то: занозы, стебла, грязи, камня, переломившихся концовъ ранящихъ орудій, доскутковъ какой либо матеріи и т. п.; если есть, то нужно, чтобы всякое постороннее тѣло, не принадлежащее нашему тѣлу, если возможно, было вынуто, и ран промыта. Въ случаѣ препятствія къ тому со стороны сильнаго кровотечения, должно приступить тотчасъ къ остановленію его.

**Остановка кровотечения.** Въ сильномъ, опасномъ кровотеченіи, угрожающемъ смертію, даже прежде прибытія врача, какъ бы близко онъ ни былъ, всякій изъ предстоящихъ можетъ быть полезенъ слѣдующимъ простымъ пособіемъ. Если рана будетъ на рукѣ, ногѣ, лядвѣѣ, то можно остановить кровь *крупнымъ перевязываніемъ* немного повыше раны. Взявъ широкую повязку (шейный мужской платокъ, носовой платокъ, сложенный на подобіе шейнаго, кушагъ, широкій женскій сарафанный поясъ и т. п.), обвить ее около той части, не туго стягивая, чтобы можно было пропустить послѣ между этою частію и повязкою небольшую деревянную скалочку, располагаемую почти также, какъ и тѣ, которыми утверждаютъ товары на возахъ: тогда надобно поворачивать ее до тѣхъ поръ, пока не уймется кровь. Осторожность при этомъ состоитъ въ томъ, чтобы не держать очень долго часть тѣла стянutoю; сильное и продолжительное давленіе можетъ причинить воспаленіе, которое перейдетъ въ помертвѣніе. Когда раненая часть будетъ неудобна для этой перевязки, напр. на головѣ, шеѣ, туловищѣ и т. п., то нужно приступить къ употребленію средствъ стягивающихъ, механически затворяющихъ отверстіе сосудовъ, каковы напр. *холодная вода, ледъ, сыръ, уксусъ, отваръ ивової и дубової корки, чернильныхъ ортнжковъ, винный спиртъ, или водка, растворъ въ водѣ смяго купороса, квасцовъ* (которые простой народъ употребляетъ съ яичнымъ бѣлкомъ), *свинцоваго сахара*. Всѣ они употребляютъ

ся въ видѣ холодныхъ примочекъ, которыми намачивается полотенце или ветошка, нѣсколько разъ сложенная на подобіе салфетки, и кладется на кровоточивое мѣсто. Недавно стали продавать новоизобрѣтенныя *кровоостанавливающія жидкости*, которыя сильнѣе выше упомянутыхъ и останавливаютъ кровь, текущую даже изъ большихъ сосудовъ; такою жидкостью намачивается свертокъ корпіи, вжимается въ рану, сближаются надъ нимъ края раны, и все это укрѣпляется еще компрессомъ и бинтомъ; отъ этой жидкости кровь въ ранѣ артерій створаживается и запираетъ ее какъ бы пробкою. Есть еще средства, механически затворяющія отверстия сосудовъ, каковы: *паутинна, мягкая пакля*, паскобленная ножемъ въ видѣ пуха, старая ветошь, *мягкая избитая корпія, хлопчатая бумага, древесный* или *вешошный* (перезженная ветошь), *трутѣ, порошокъ изъ вишневаго клея, аравійской камеди, камболои, чистой просѣянной золы древеснаго угля*, особенно смѣшаннаго поровну съ *порошкомъ сахара*. Простой народъ употребляетъ *нюхательный табакъ* и др.; ими покрывается равномерно и плотно кровоточивое мѣсто. Трутѣ, губка (грецкая) корпія, бумага намачиваются также яичнымъ бѣлкомъ, слизью камеди, клея, стягивающими примочками и прикладываются на мѣсто кровоточенія. Какъ стягивающія, такъ и механически дѣйствующія средства, для прочнѣйшаго ихъ дѣйствія, соединяются *прижатіемъ*; впрочемъ онѣ не выгодны тѣмъ, что препятствуютъ заживленію раны, усиливаютъ въ ней воспаленія и не предотвращаютъ возврата кровоточенія, которое, по снятіи этихъ средствъ, а слѣдовательно по прекращеніи ихъ дѣйствія, можетъ опять появиться. Чтожь касается до настоеннаго на *березовыхъ почкахъ* простаго *вина*, которымъ крестьяне, особенно эстляндскіе, заливаютъ всякій безъ изыятія ушибъ, порубъ и порѣзъ, то отъ послѣдствій ушиба иногда оно можетъ быть полезно; но заливать имъ свѣжую, кровавую рану — значитъ заливать огонь спиртомъ. *Дубовая губка*, или грибъ, растущій на дубовомъ пнѣ, сосредоточивая въ себѣ дѣйствіе стягивающихъ и механически запирающихъ сосуды средствъ, можетъ быть въ этомъ случаѣ гораздо предпочтительнѣе. Достать ее легко всякому поселянину безъ всякихъ издержекъ, и потому въ каждомъ домѣ не мѣшаетъ имѣть ее на всякій случай. Кусочекъ ея кладутъ на рану, покрываютъ его корпіею въ довольномъ количествѣ, и поверхъ того дѣлаютъ перевязку, такъ чтобы все это было не очень крѣпко стянуто. (Собираніе, приготовленіе и употребленіе дубовой губки совершается слѣдующимъ образомъ: дубовая губка снимается осенью, когда заканчивается хорошая погода. Она, составляя нѣкоторый родъ гриба, или порости на дубовой корѣ, состоитъ изъ четырехъ частей, расположенныхъ одна на другой, въ видѣ особыхъ слоевъ. *Первая* ея *часть* (слой) есть корка, или наружная кожа; она не употребительна. *Вторая часть*, слѣдующая непосредственно за коркою (другой слой), есть употребительнѣйшая и самая лучшая изъ всѣхъ. Ее разбиваютъ молоткомъ до тѣхъ поръ, пока она



не сдѣлается мягкою и гибкою. Въ этомъ и состоитъ все приготовленіе, котораго она требуетъ. Взявши кусочекъ ея надлежащей, какая потребуется, величины, приложить прямо на то отверстіе, изъ котораго течетъ кровь. Она, стягивая сосуды вмѣстѣ и въ тоже время запирая ихъ, какъ тугою пробкою, останавливаетъ кровотеченіе и спадаетъ обыкновенно по прошествіи двухъ сутокъ. *Третья часть*, прикосновенная къ этой второй, останавливаетъ кровь, текущую изъ небольшихъ сосудовъ; чтожь касается до *четвертой*, то она, истолченная въ порошокъ, служитъ для того же употребленія). Но, какъ бы ни были хороши и удобны всѣ эти кровоостанавливающія средства, за всѣмъ тѣмъ, если сильное кровотеченіе происходитъ изъ поврежденной артеріи (кровобіющаго сосуда), что узнается изъ того, что кровь струится алая и струя крови бываетъ съ перемежками, соотвѣтственно біенію сердца и пульса, то усиливается въ теченіи своемъ, то ослабѣваетъ, въ такомъ случаѣ всѣ вышеисчисленныя простыя пособія могутъ имѣть только ту главную цѣль, чтобы не дать раненому изойти кровію и умереть; но для совершеннаго, прочнаго остановленія этого рода сильнаго кровотеченія непременно требуется помощь со стороны опытнаго врача, особенно хирурга, къ которому и должно прибѣгнуть для спасенія такого опасно раненаго, не полагаясь ни на какіе заговоры простолюдиновъ отъ крови. Хирургъ въ такомъ случаѣ дѣйствуетъ, чтобы остановить кровотеченіе безвозвратно, по его усмотрѣнію, *прижатіемъ артеріи* выше раны пальцами, ключемъ, крючкомъ, турникетомъ (простымъ и сложнымъ), или *прижиганіемъ* отверстія сосуда посредствомъ раскаленнаго желѣза, либо *перевязываніемъ* артеріи ниткою (лигатурою) — самымъ дѣйствительнымъ и прочнымъ средствомъ.

Прим. Между простымъ народомъ нѣкоторые пользуются большимъ довѣріемъ по умѣнью останавливать кровотеченіе «заговоромъ», о которомъ В. Даль говорить, что въ двухъ случаяхъ видѣлъ его дѣйствіе, но въ обоихъ, повидимому, не было надобности ни въ заговорѣ, ни въ другомъ какомъ либо средствѣ для остановленія крови: значительная боевая жила не была повреждена, а если этого нѣтъ, то кровь всегда почти запекается и останавливается сама собою \*). А у меня было въ практикѣ три случая, очень незначительныхъ, какъ то: носовое кровотеченіе, порѣзъ, порубъ, въ которыхъ эти сельскіе мастера въ виду моемъ шептали то съ одной стороны, то съ другой, то прямо противъ больнаго, требовали горячую сковороду, на которую кровь текла запекаясь, но ничего успѣшнаго изъ ихъ дѣйствій не было.

Лѣченіе ранъ *черезъ нагноеніе* предпринимается тогда, когда скорое и успѣшное лѣченіе ихъ чрезъ соединеніе бываетъ неудачно, не возможно, или пропущено первое время болѣзни, а края раны уже загноились и разошлись, такъ что нельзя свести ихъ. Если на 2—3 день, послѣ предпринятаго лѣченія раны чрезъ соединеніе, въ ней появится

\*) Жур. М. В. Д. 1843 г. кн. 8, стр. 165.

сильная боль, жаръ, опухоль, если матерія изъ раны пробивается въ большемъ количествѣ, промачиваетъ всю перевязку, которая оттого сама отстаетъ, если по снятіи повязки видно, что края раны не чисты, припухли и разошлись, — то избирается лѣченіе раны чрезъ нагноеніе, выполненіе ея мясными сосочками и заращеніе рубцомъ. Въ такомъ случаѣ рану омываютъ теплою водою или молокомъ, края ея сближаютъ пальцами и закрываютъ ихъ корпійною связочкою, обмакнутою въ жирное масло, или наштанную простымъ спускомъ (воскъ съ саломъ, растопленные и простывшіе, № 29), стягиваютъ ленточкою липкаго пластыря и укрѣпляютъ компрессами и бинтомъ. Если рана очень болитъ, пухнетъ, сохнетъ и отдѣляетъ мало гноя, то къ ней прикладываютъ мягчительныя теплыя *припарки* изъ *отрубей*, *слинной трухи*, (№ 122), *льняного сѣмени* (№ 23) *блага хлѣба* съ *молокомъ* (№ 26) и т. п. Умѣренное воспаленіе необходимо для заживленія раны и чрезъ нагноеніе, и потому, если оно слабо, если рана очень нечиста, края ея блѣдны, слабы, вялы, обвислы, кровоточивы, то на рану кладется корпій, намоченная *отваромъ ивовой*, *дубовой* или *хинной корки*. Это средство возбуждаетъ въ ранѣ воспаленіе, которое производитъ хорошее нагноеніе. Если такая рана глубока и въ ней остаются корпійныя нитки, то дно ея выстилается прежде масляною ветошкою, на которую кладется корпій съ вышеупомянутымъ отваромъ. Если въ ранѣ начинаютъ появляться красныя мясныя сосочки, то рана плотнѣе стягивается *ленточками пластыря*, въ излишествѣ наростшіе мясныя сосочки (дичье мясо) прижигаются ляписомъ (адскимъ камнемъ), которымъ изрѣдка можно дотрогиваться и до блѣдныхъ вялыхъ краевъ раны для оживленія ихъ. Но если рана въ теченіе 2—3 недѣль не очищается, но все остается блѣдною, грязною, кровоточивою, если изъ нея отдѣляется жидкая, ѣдкая, вонючая матерія, больной чахнетъ, худѣетъ, то нужно давать ему внутрь *наливку ирпаго корня*, *отваръ коры ивы*, *хины* (№№ 43, 45, 47), хорошее вино, питательную пищу, доставить чистый свѣжій воздухъ, а между тѣмъ прибѣгнуть къ совѣту опытнаго хирурга. Сверхъ того не должно упускать изъ вида и то, что рану, лѣченную даже и чрезъ нагноеніе, а тѣмъ болѣе чрезъ прямое соединеніе, гораздо полезнѣе перевязывать какъ можно рѣже, чрезъ 1, 2—3 дня одинъ разъ и даже 1—2 раза въ недѣлю, развѣ рана будетъ очень гноеточива и отдѣлять вонючую матерію, которая промочитъ и замараетъ повязку; но и въ такомъ случаѣ нужно, какъ можно скорѣе, обмывъ рану, покрывать ее корпією и перевязывать, стараясь сколько возможно защитить рану отъ воздуха, вредно дѣйствующаго на живыя обнаженныя части нашего тѣла. При лѣченіи ранъ у вышеисчисленныхъ рабочихъ людей нужно соображаться съ правилами, изложенными для нихъ въ росписаніи рабочихъ поселянъ по ихъ быту и званію въ особенности (см. это росписаніе).

Лѣченіе рѣзанныхъ и рубленныхъ ранъ всего скорѣе и успѣшнѣе производится чрезъ первое соединеніе. Если крестьянинъ нанесетъ

себѣ рану въ лѣсу, а плотникъ при стройкѣ топоромъ, косецъ въ лугахъ косяю, жнецъ въ полѣ серпомъ, мясникъ при колотѣхъ скота большимъ ножомъ, и изъ раны будетъ сильно течь кровь,—то прежде всего нужно рубу, ногу, плотно сжать выше раны руками, платкомъ, кушакомъ, смотря по степени кровотоčenja, обвивая достаточно туго, чтобы задержать кровь; потомъ рану обмыть водою, очистить ея поверхность отъ крови, плотно и ровно сблизить ея края между собою, стянуть ихъ ленточками липкаго пластыря и укрѣпить бинтомъ. Если нѣтъ въ готовности липкаго пластыря, то его отчасти можно замѣнить такъ: на кусокъ новой холстины намазать ровнымъ слоемъ кислаго тѣста пшеничнаго и даже ржаного, изъ просѣянной чрезъ сито муки, или покрыть её слоемъ сваренаго клея, крахмала, холстину разрѣзать на ленточки, которыми и покрыть рану, прежде очищенную и стянутую ровно по бряямъ, и всё это укрѣпить бинтомъ, узкимъ поясомъ или широкою тесемкою и потомъ оставить руку и ногу въ согнутомъ или вытянутомъ положеніи, смотря по тому, гдѣ находится рана. Такой пластырь, когда онъ засохнетъ, дѣлается твердымъ и удерживаетъ, какъ въ футлярѣ, края раны одинъ подлѣ другаго, лучше чѣмъ липкій пластырь. Мѣсто выше раны не держать долго стянутымъ, а по минованіи въ томъ надобности, т. е. по наложеніи пластыря и укрѣпленіи его бинтомъ, тотчасъ отпустить, во избѣжаніе могущаго произойти отъ того воспаленія и другихъ еще худшихъ послѣдствій. Если находится при ранѣ висячій лоскутъ кожи, мяса или даже и совсѣмъ отвалился кусокъ пальца, то, очистивъ рану, лоскутъ кожи, и все это хорошо уравнивъ, покрыть ихъ ленточками изъ холстины, довольно плотно намазанной клейстеромъ изъ пшеничной муки или крахмала. Для большей прочности ленточки кладутся въ 2—3 ряда, потомъ укрѣпляются бинтомъ, который можно и снять, когда ленточки высохнутъ и сдѣлаются твердыми, какъ лубъ. Если лоскутъ, или кусокъ члена, еще теплы, то можно надѣяться, что они приростутъ; но если они уже охолодѣли, то ихъ можно прежде очистить, подогрѣть подъ мышками раненаго, на огнѣ, и потомъ прикладывать къ ранѣ. Впрочемъ въ послѣднемъ случаѣ рѣдко удается приростить лоскутъ, а обыкновенно рана заживаетъ чрезъ нагноеніе (см. въ общемъ лѣченіи ранъ). Отъ поруба для остановленія крови и для скорѣйшаго заживленія народъ у насъ прикладываетъ къ ранѣ свѣжіе листы или порошокъ изъ сушенаго растенія «портъз» *ужикъ*, или *подорожникъ*, выбирая тотъ видъ, у котораго по три толстыхъ рубца съ-исподу на листьяхъ. Другіе употребляютъ вмѣсто этого, въ холодной припаркѣ, растеніе *баранья трава*, «*гулявица деревьевъ*» «*тысячелистникъ*» «*вашка*,» «*рябинка*», или *кровавникъ*. На уральскихъ заводахъ и въ другихъ мѣстахъ у мастеровыхъ людей вѣрятъ въ слѣдующее средство: берутъ чистую *ветошку*, *смачиваютъ* ее *въ кровь* отъ нанесенной раны и слегка сушатъ въ рукахъ передъ огнемъ; по мѣрѣ того, какъ она просыхаетъ, кровь должна останавливаться, а когда тряпка суха, то и дѣло кончено. На

заводахъ средство это извѣстно подъ названіемъ *тряпки*: тамъ увѣряютъ, что тряпку сунуть надо передъ огнемъ исподволь, не круто; иначе рана въ послѣдствіи воспалится. Тамъ вѣрятъ этому точно также, какъ вѣрятъ не только простолюдины, но и нѣкоторые врачи, что не должно ставить сосудъ съ кровью, послѣ кровопусканія, на теплое мѣсто, на лежанку, на солище: иначе воспаленіе или горячка въ больномъ еще усилится \*).

Лѣченіе обыкновенной колотой раны вообще довольно просто: извлекиши колющее орудіе, если оно еще въ ранѣ, выжимаютъ слегка кровь изъ канала раны, обмываютъ рану и покрываютъ её *легкимъ пластыремъ*; по направленію раны, кладутъ продолговатые компрессы (нѣсколько разъ сложенная холстина) во всю длину ея канала, намоченные въ *воду съ уксуомъ* или *свинцовой водою*, укрѣпляютъ все это окружнымъ бинтомъ и даютъ раненому члену спокойное положеніе. Большая часть колотыхъ ранъ при такомъ лѣченіи заживаетъ чрезъ первое соединеніе хорошо и скоро. Но если рана, по направленію ея канала, сильно болитъ, горитъ, краснѣетъ и пухнетъ, то вдоль раны и-оболо ея отверстія ставятся *пѣвны*, даже нѣсколько разъ, и прикладываются *холодныя примочки*; если же краснота и опухоль усиливаются, въ каналѣ раны замѣчается зыбленіе, что происходитъ на 3—5 день и позже, то примочки замѣняются *теплыми припарками* (см. выше); раненому члену дается *наклонное къ ранѣ положеніе*, и накопившійся въ каналѣ гной пригоняется осторожнымъ давленіемъ отъ дна раны къ ея отверстию; послѣ этого рана покрывается корпиею, вдоль нея кладется компрессъ, членъ увивается бинтомъ, и вообще опять стараются заживитъ рану чрезъ первое соединеніе. Колотыя раны въ важныхъ случаяхъ и въ такихъ частяхъ тѣла, гдѣ находится много сухихъ жилъ, какъ-то: въ пальцахъ, ручной кисти, стопѣ, переднемъ плечѣ и голени, въ суставахъ: плечевомъ, локтевомъ, коѣнномъ, бедренномъ, причиняющія иногда жестокіе припадки, требуютъ помощи самихъ врачей, которые, для укрощенія жестокихъ припадковъ, назначаютъ припускъ къ члену пѣвогъ, холодныя примочки, или теплыя припарки, натираніе члена *льнянымъ масломъ*, *свинымъ топленнымъ саломъ*, расширяютъ ножомъ отверстіе колотой раны, перерѣзываютъ напряженныя сухія жилы и проч.

Лѣченіе разорванныхъ и ушибенныхъ ранъ не большихъ можно попытаться произвести чрезъ первое соединеніе, сближеніемъ краевъ раны между собою и легкимъ стягиваніемъ ихъ ленточками пластыря, описаннаго выше въ лѣченіи рѣзанныхъ ранъ; но въ этихъ ранахъ такъ зарастаетъ только дно, а края раны заживаютъ чрезъ нагноеніе и наращеніе мясныхъ сосковъ.

Въ разорванныхъ и ушибенныхъ ранахъ нагноеніе и помертвѣніе (антоновъ огонь) почти неизбѣжны; нужно только имѣть въ виду,

\*) Журн. М. В. Д. 1843 г. книж. 8-я стр. 163 и 164.

чтобы первое не было слишкомъ большое, изнурительное, а послѣднее ограничивалось бы только ушибенными и порванными частями. Для этого такія раны покрываютъ связочками изъ коріи, напоенной *льнянымъ, деревяннымъ масломъ, спускомъ* (№ 29), топленнымъ *сояжымъ саломъ*, и обращаютъ вниманіе на воспаленіе и лихорадку, появляющіяся на 2—3 день. Для уменьшенія воспаленія, къ ранамъ прикладываются *холодныя примочки* изъ *воды съ уксусомъ, сныгъ, ледъ* къ ушибеннымъ мѣстамъ припускаются *пльвицы*, даже нѣсколько разъ. Если появится значительная опухоль, готовая перейти въ нарывъ, то къ ранѣ прикладываютъ теплыя *припарки* изъ *сильной трухи* (№ 122), изъ мучныхъ *отрубей, толченаго льнянаго стѣмени*. При лихорадкѣ назначается *свѣжій прохладный воздухъ, кислое питье*, внутреннее употребленіе *селитры* (№ 144), приличная діета (голодная). Врачи назначаютъ *кровопусканіе*. Сильное нагноеніе и помертвѣніе лѣчатся чрезъ описанное выше нагноеніе; сотрясеніе головы, груди, живота и происходящее отъ того безпамятство, бредъ, кровохарканіе, рвота, кровавый поносъ, требуютъ приглашенія къ раненому опытнаго врача, а за неимѣніемъ его нужно раненаго отправить въ ближайшій лазаретъ.

Лѣченіе ранъ ядовитыхъ, нанесенныхъ здоровыми животными, описано въ существенномъ лѣченіи бѣлой рожн. Лѣченіе же ранъ ядовитыхъ, нанесенныхъ бѣшенымъ животнымъ, опаснымъ только по своимъ послѣдствіямъ, состоитъ не въ заживленіи раны, но въ томъ, чтобы чрезъ нее ядъ не попалъ въ тѣло укушеннаго человѣка, если же попалъ, то чтобы вывести его изъ тѣла. По этому лѣченіе этихъ ранъ бываетъ только *предохранительное*, собственно отъ ужасной водобоязни, а именно двоякое: *первоначальное*, предпринятое тотчасъ послѣ укушенія бѣшенныхъ животныхъ, и *послѣдовательное*.

Первоначальное лѣченіе укушеннаго состоитъ въ истребленіи яда въ самой ранѣ; чѣмъ раньше оно предпринимается, тѣмъ больше можно надѣяться на его успѣхъ. По этому надобно совѣтовать немедленно и смѣло употребить слѣдующія средства: прежде всего перевязать руку, ногу довольно туго широкою повязкою выше раны; *крія* выше раны, если можно, *вырвать* совершенно ножницами, приподнявъ кожу раны въ складки, что можетъ выполнить всякій фельдшеръ; если же рана глубока и находится около большихъ сосудовъ, нервовъ, мышцъ, то промывать её долго *соленою водою, мочою, водою съ уксусомъ*; рану глубокую расширить ножомъ по длинѣ, поддерживая кровотеченіе теплою водою, поставленными на рану кровососными банками, что также можетъ сдѣлать фельдшеръ. Когда вытечетъ довольно крови, и укушенное мѣсто побѣлѣетъ, то велѣтъ фельдшеру *выжечь* всю рану такъ, чтобы она покрылась струпомъ; для прижиганія раны онъ можетъ употребить *раскаленное шило, лезвіе ножа, проволоку, вязальную иголку, зондъ, длинный гвоздь*, также *порохъ*, воспламеняемый на *раннѣ, подкій поташъ, подкій нашатырный спиртъ, стѣрную кислоту*, отдѣленіе струпа послѣ прижиганія ускоряютъ теплыми припарками и рану

опять прижигаютъ. По отпаденіи втораго струна рану посыпаютъ порошкомъ *итанскихъ мугъ* и поддерживаютъ въ ней нагноеніе 1—2 мѣсяца. Если же рана закрылась и начинаетъ болѣть, то фельдшеръ разрѣзываетъ рубецъ, ставитъ на немъ *кровоосниа башки*, и потомъ содержитъ рану въ нагноеніи порошкомъ и *пластыремъ итанскихъ мугъ*, точно такъ, какъ фонтанель. Кромѣ этого мѣстнаго лѣченія людямъ укушеннымъ совѣтовать поддерживать спящую испарину движеніемъ, работою, частою банею, ваннами, теплымъ питьемъ *малинового, липового, бузиноваго чаю, парнаго молока*.

*Послѣдовательное предохранительное лѣченіе.* Людей, укушенныхъ бѣшенымъ животнымъ, по видимому совершенно здоровыхъ, должно *содержать подъ надзоромъ*, по крайней мѣрѣ *шесть недѣль*, и во все это время пить ихъ отваромъ *дрока* (дрочникъ красильный); 7 золотн. нагрошенной травы дрока варятся въ двухъ фунтахъ воды въ закрытомъ горшкѣ и отваръ дается 2—3 раза въ день, или давать порошокъ этого растенія отъ половины до цѣлаго золотника, и притомъ ежедневно дважды, поутру и ввечеру; осматривать у нихъ во рту, щечи и особенно нижнюю поверхность языка, по сторонамъ подязычной уздечки; тутъ чрезъ 3—7—9 дней и позже появляются маленькіе, желтоватые, или бѣлые прыщички, въ которыхъ отъ прижатія ихъ булавою, зондомъ (металлическій цилиндръ на подобіе толстой проволоки) замѣчается зыбленіе; они бываютъ очень маленькіе, легко могутъ быть просмотрѣны и для того нужно разомъ сличать языкъ больного и здороваго; ихъ велѣтъ *прокалывать* ланцетомъ, *срѣзывать* ножницами, *выжимать* матерію, а больной долженъ ее выплевывать и выполаскивать ротъ отваромъ дрока и потомъ срѣзанные прыщи *прижечь* *раскаленнымъ желткомъ*. Послѣ этого опять надо наблюдать за больнымъ, и если у него появятся прыщички подъ языкомъ, то ихъ опять срѣзываютъ, прижигаютъ и проч. что можетъ случиться до трехъ разъ. Замѣчательно, что съ появленіемъ прыщей подъ языкомъ, больные дѣлаются безпокойными и успокоиваются по истребленіи прыщей \*).

Лѣченіе ранъ у дѣтей отъ прорѣзанія, или порубленія, или отъ укуса, не требуетъ никакихъ средствъ, особенно раздражающихъ, какъ то: спиртовъ, бальзамовъ и т. п., онѣ заживаютъ сами собою. Достаточно *перевязать рану кортеей и бинтикомъ*, собственно для того, чтобы предохранить ее отъ вліянія воздуха, пыли и отъ всякаго посторонняго раздраженія. Если есть кровотеченіе, но незначительное, то не должно тотчасъ останавливать его, потому что оно предохраняетъ рану отъ воспаленія. Если же оно будетъ легкое, то покрыть рану или *пау-*

\*) Извѣстно, что во всѣхъ почти странахъ и мѣстахъ Россіи между простымъ народомъ есть нѣрѣдко особыя въ томъ знахари, излѣчивающіе (будто бы) эту болѣзнь легко, скоро и безопасно секретными средствами, которыя у нихъ болѣе или менѣе бываютъ различны. Замѣтно, что у нихъ въ употребленіи бываютъ *пчелиная матка, майскій жукъ*, трава *лобазникъ*; но много и другихъ неизвѣстныхъ средствъ.

шину, трютомъ, а въ трудныхъ случаяхъ *кортією*, *чесною паклею*, *хлопчатую бумагою*, намоченною смѣсью изъ одной части *ренискаго уксуса* и *водки*, и сверху перевязать потуже бинтомъ. Если этихъ средствъ будетъ недостаточно, то обратиться въ крайнемъ случаѣ, за неимѣніемъ врача по близости, къ тѣмъ простымъ способамъ, какіе означены выше для остановленія кровотеченія изъ ранъ вообще.

## Язва.

**Опредѣленіе.** Язва есть порча, или поврежденіе, цѣльныхъ, мягкихъ и твердыхъ частей нашего тѣла, болѣе или менѣе давнее, сопровождаемое большею или меньшею гноеточивостію, рѣдко кровотеченіемъ и то очень легкимъ, происходящее всегда отъ болѣзненного состоянія нашего тѣла.

**Причины.** Причиною язвъ всегда бываетъ болѣзненное состояніе нашего тѣла, въ противоположность ранамъ, происходящимъ всегда отъ причинъ для него совершенно внѣшнихъ, и если раздѣляютъ причины язвъ на внутреннія и наружныя, то это дѣленіе разумѣется только въ отношеніи собственно къ нашему тѣлу. Такъ, внутреннія причины язвъ въ нашемъ тѣлѣ состоятъ въ особенномъ какомъ либо нездоровьѣ всего тѣла, въ остротѣ, порчѣ соковъ, слабости и вялости органовъ; таковы язвы: цынготныя, золотушныя, лишайныя, чесоточныя, ломотныя, любострастныя; у такихъ людей царапина, легкій ушибъ, вередъ — превращаются въ язву; а наружными причинами язвъ бываютъ мѣстныя болѣзни: вередъ, нарывъ, ногтоѣда, рана, расширеніе венъ, разные желваки и опухоли, рожа, постороннія тѣла, попавшія въ наше тѣло, порча костей, сухихъ жилъ, твердость вѣтчатой плевы. Поэтому язvamъ бываютъ подвержены вообще всѣ тѣ, кто подверженъ этимъ болѣзнямъ, а въ особенности: живодеры, ломщики судовъ, рыболовы, болесники, обручники, строители судовъ, рѣзчики, дѣлатели рамъ для картинъ, кузнецы, слесари, каменьщики, печники, хлѣбники, маляры, щекатуры, обойщики, оснащики машинъ, пильщики.

**Раздѣленіе.** По различному *свойству* язва бываетъ: 1) *воспаленная*; 2) *чувствительная* и 3) *вялая*.

По различному *наружному виду* язва бываетъ: 1) *гнилая*, *помертвѣлая*; 2) *мозолистая*, 3) *губчатая* и 4) *варикозная* съ расширеніемъ венъ.

По *различію причинъ* язва бываетъ: 1) *цынготная*; 2) *золотушная* и 3) *ломотная*.

**Прим.** Сюда же принадлежатъ язвы: любострастныя, чесоточныя и лишайныя, но объ нихъ излишне будетъ говорить здѣсь, потому болѣе, что излѣченіе ихъ зависитъ отъ излѣченія коренной ихъ болѣзни, а мѣстное лѣченіе почти не отличается отъ лѣченія язвъ вообще.

**Признаки язвы:** 1) *воспалительной*: въ окружности припухшая, чувствительная, горячая, красная, почти сухая, а дно ея по

крыто бѣлыми полосками; язва наичаще воспаляется отъ злоупотребленія острыхъ мазей, ѣдкихъ примочекъ, частой ея перевязки, неосторожности самого больного. 2) *Чувствительной*: красна, не терпитъ ни малѣйшаго къ ней прикосновенія, но не припухшая и горячая. 3) *Вялой*: блѣдная, холодная, слабкая, дряблая, отекистая, не болитъ, но обильно отдѣляетъ жидкій, сывороточный, темный или свѣтлый гной, (у людей молодыхъ, слабыхъ, худосочныхъ, золотушныхъ, чесоточныхъ, бѣдныхъ, худо кормленныхъ, лишенныхъ свѣта, движенія, воздуха). 4) *Гнилой, помертвѣлой*: нечиста, сѣрожелтовата, темноцвѣтна, нечувствительна, вонюча, отдѣляетъ жидкій, ѣдкій, темный гной, а иногда мертвѣють не только язвенныя, но и сосѣднія цѣльныя части, и язва дѣлается гнилою отъ неопрятности, неправильнаго грубаго лѣченія ѣдкими мазями, примочками, отъ несвободнаго кровообращенія, когда мѣсто язвы бываетъ прижато, стиснуто; отъ испорченнаго воздуха, худой пищи, нечистотъ въ желудкѣ и кишкахъ, отъ особаго тѣлосложенія, худосочія; сильно воспаленная или вялая язва легко дѣлается и гнилою. 5) *Мозолистая* язва бываетъ бѣлая, сухая, твердая, жесткая, даже хрящеватая и нечувствительная; такою она представляется или только по окружности своего края, или по всей поверхности. Язва дѣлается мозолистою отъ недостатка въ ней крови или питательныхъ соковъ, и потому замѣчается у людей старыхъ, въ безсочныхъ мѣстахъ тѣла (спереди на голени, на пальцахъ), отъ худаго лѣченія язвы, когда ее часто и долго перевязываютъ острыми, раздражающими средствами при испорченномъ зубѣ, костоѣдѣ и проч. 6) *Губчатой*: эта язва, подобно мозолистой, покрывается или только по окружности своихъ краевъ, или и по всей поверхности, наростами, то блѣдными, рыхлыми, темнокрасными, нечувствительными и кровоточивыми (измѣненными мясными сосочками), то плотными сине-красными и чувствительными; послѣднѣе первыхъ; они появляются при вялой язвѣ, долго продолжавшейся, и зависятъ отъ тѣхъ же причинъ, какъ и сама язва, также отъ продолжительнаго употребленія мягчительныхъ средствъ, слабой перевязки, и особенно отъ костоѣды: губчатые нарывы въ язвѣ очень часто означаютъ, что подъ язвою находится костоѣда. 7) *Варикозной* — съ расширеніемъ венъ; наичаще замѣчается на ногахъ и притомъ на голеняхъ; она бываетъ поверхностная, продолговатая, имѣетъ синее дно и отдѣляетъ красноватую сыворотку; края язвы мозолисты, въ окружности язвы бурый цвѣтъ кожи, расширение венъ, опухоль и отекъ ноги, по временамъ кровотеченіе. 8) *Цынготной*: развитіе въ тѣлѣ цынки; эти язвы, будучи всегда припадкомъ болѣзни, чаще всего появляются спереди и по бокамъ, на голеняхъ, на деснахъ, рѣдко на бедрахъ и почти никогда на рукахъ; онѣ бываютъ не глубоки, синеваты, легко кровоточивы, мало болятъ, по краямъ отекаютъ, а на дни покрываются губчатыми наростами, легко воспаляются и мертвѣють. 9) *Золотушной*: высшее развитіе въ тѣлѣ золотухи; появляются язвы или на одной кожѣ, или въ пасоч-



ныхъ жѣлѣзахъ, которыя твердѣють, пухнуть, тихо воспаляются и медленно нагнаиваются, наичаще около ушей, подъ нижней челюстію, на щекахъ, особенно на шеѣ по бокамъ, подъ мышками и въ пахахъ, но встрѣчаются и въ другихъ разныхъ мѣстахъ тѣла. Вообще онѣ бывають нечувствительны, по краямъ неровны, тверды, твердость при нихъ бываеть ограниченная, кожа въ окружности блѣднаго, синеватаго цвѣта; дно язвы покрыто мѣстами сгущенною насокою; при этомъ больной имѣеть золотушное тѣлосложеніе и страдаетъ другими болѣзнями: сынями на кожѣ, заваломъ въ животѣ, то поносомъ, то запоромъ на низъ. камнемъ въ мочевомъ пузырьѣ и проч. 10) Ломотной застарѣлой въ тѣлѣ — особенно ломотный ревматизмъ (дактилагра), язвы поверхнія, но обширныя, съ неправильными, блѣдными, твердыми краями, отдѣляющія обильно ждкую, острую сыворотку (которая разѣдаетъ смежныя части тѣла и окрашиваетъ повязку и бѣлье чернымъ цвѣтомъ), сильно болятъ предъ дурною погодою и составляютъ, такъ сказать, двери, чрезъ которыя выходятъ изъ тѣла острые соки, сдѣлавшіеся такими отъ продолжительности въ тѣлѣ ломотнаго ревматизма. На извѣстномъ мѣстѣ, наичаще же на ногахъ около колѣнъ, во время приступа дактилагры появляются опухоли, рожисто-воспаляются, нагнаиваются, прорываются и производяють язвы, съ появленіемъ которыхъ ломотный ревматизмъ ослабѣваеть и, напротивъ, опять ожесточается, когда язвы начинаютъ заживать.

Сущность язвы видна изъ опредѣленія, съ присовокупленіемъ понятій о каждомъ изъ тѣхъ болѣзненныхъ состояній въ тѣлѣ, отъ котораго она происходитъ.

**Распознаваніе.** Язвы въ просторѣчии называются и ранами, съ которыми онѣ сходятся тѣмъ, что также состоятъ въ порчѣ, поврежденіи цѣльныхъ, мягкихъ и твердыхъ частей нашего тѣла, а отличаются отъ ранъ тѣмъ, что поврежденіе этихъ частей при язвахъ есть болѣе или менѣе давнее и происходитъ всегда отъ внутренней причины, гнѣздящейся въ нашемъ тѣлѣ и дѣйствующей съ внутри къ наружи, тогда какъ раны зависяють отъ наружнаго, болѣе или менѣе недавняго насилія, дѣйствующаго снаружи внутрь, наприим. порѣзана рука и нанесена рана, но она пришла въ нагноеніе и произвела язву. Свѣжая, кровавая рана легко отличается отъ язвы наружнымъ видомъ; но рану не заживающую скоро и уже загноившуюся съ перваго взгляда трудно отличить отъ язвы, потому что она становится уже язвою, въ которую переходитъ; язва же никогда не можетъ сдѣлаться раню. Рана можетъ зажить, какъ сказано выше, и безъ нагноенія; но происхожденію язвы всегда предшествуетъ нагноеніе, безъ котораго она и зажить не можетъ. Слѣдовательно, кромѣ происхожденія, рана отличается отъ язвы еще и тѣмъ, что при первой нагноеніе есть случайное, а при второй существенное условіе, безъ котораго язва ни произойти, ни зажить не можетъ. Распознаваніе язвъ однихъ отъ другихъ по ихъ свойству, виду, причинамъ и свойственнымъ вышеописаннымъ каждой изъ нихъ при-

знакамъ, *не затруднительно*. Ломотныя язвы тогда только бываютъ трудны для распознаванія, когда больной не страдаетъ правильною ломотою; въ такомъ случаѣ нужно обращать вниманіе на здоровье всего тѣла, расстройство пищеваенія, боль подъ ложечкою и въ правомъ боку, густую мутную песчаную мочу, періодическія боли въ рукахъ, ногахъ, частый насморкъ, съ обильнымъ отдѣленіемъ слизи, разныя пакожныя сыпи, которыя часто бываютъ въ тѣсной связи съ этими язвами.

**Предсказаніе** въ язвѣ основывается на ея различномъ дѣйствіи на все тѣло; она мѣшаетъ свободному употребленію члена, причиняетъ боль, вонь и нечистоту, производитъ трату нужныхъ и порчу здоровыхъ соковъ, превращающихся въ гной, который потомъ опять всасывается. Если отдѣляется въ язвѣ гной острый, жидкій, темноцвѣтный, воюющій, то вредное его дѣйствіе на все тѣло оказывается скорѣе и бываетъ сильнѣе, больной слабѣетъ, блѣднѣетъ, худѣетъ, чувствуетъ попеременно: то ознобъ, то жаръ, ноющія и раздрающія боли въ рукахъ, ногахъ; пульсъ у него дѣлается слабымъ, скорымъ; появляется сухость въ язвахъ, изнурительные поты, поносы, мутная, жидкая моча; язва по временамъ воспаляется, окружныя части твердѣютъ и отсюда происходятъ новыя язвы, свищи, помертвѣніе. Язва застарѣлая, долго продолжавшаяся, (нѣсколько лѣтъ), отбрышнаяся при общей болѣзни и отъ ней зависящая, обратившаяся въ привычку, у людей старыхъ, у подагриговъ (дактилагра) есть болѣзненный органъ, — отводъ или истокъ, которымъ натура больного извергаетъ изъ тѣла разныя нечистоты соковъ, и такимъ образомъ меньшимъ зломъ ограничиваетъ вредное дѣйствіе зла большаго, такая язва есть такое же необходимое условіе здоровья и жизни, какъ и отдѣленіе пота, мочи, слюны и проч.; скорое неосторожное заживленіе такой язвы опасно для больного, особенно у пожилыхъ людей, можетъ причинить воспаленіе мозга, желудка, кровохарканіе, кровавую рвоту, ударъ и проч. Опасность язвы для больного зависитъ отъ ея причинъ, мѣста, продолжительности и вида, также отъ тѣлосложенія и возраста больного. Язва, происшедшая отъ мѣстной причины, излѣчивается довольно скоро и легко; но зависящая отъ общей, внутренней причины, заживаетъ трудно и скоро опять открывается на прежнемъ или новомъ мѣстѣ. Язвы въ кожѣ и вообще въ мягкихъ частяхъ заживаютъ легче, чѣмъ язвы въ желѣзахъ (въ пахахъ, подъ мышками, на шеѣ), въ сухихъ жилахъ и суставахъ. на локтяхъ, кистяхъ рукъ, на стопѣ и въ костяхъ, и, къ несчастію, встрѣчаются чаще. Язвы круглыя заростають медленнѣе, чѣмъ продолговатыя; у молодыхъ, здоровыхъ людей язвы заживаютъ скорѣе и безопаснѣе, чѣмъ у истощенныхъ стариковъ.

**Лѣченіе** діететическое, состоящее въ удаленіи причинъ язвъ и поправленіи порчи соковъ, отъ которой онѣ зависятъ, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) Вышеозначенные, въ особенности *подверженныя* язвамъ *поселяне* должны беречь себя отъ нихъ по *правиламъ*, изложеннымъ для нихъ въ *особомъ* *рассказаніи* *поселянъ* по

нѣхъ быту и званію. 2) Така какъ язвы, подобно ранамъ, заживляетъ сама натура нашего тѣла, а наша обязанность состоитъ въ томъ, чтобы не мѣшать ей цѣлительной силѣ, но *способствовать ей содержаніемъ язвенныхъ*, подобно, какъ и раненыхъ, *частей закрытыми, теплыми и влажными*, то для этого *одержимый* простою язвою *долженъ быть умѣренъ* въ пищѣ и остороженъ въ употребленіи вина, *имѣть покойное положеніе для язвеннаго, какъ и для раненаго члена, наблюдать опрятность въ перевязкѣ*, много способствующей заживленію язвы, какъ и раны. 3) Если язва по свойству своему вялая, то страждущаго ею необходимо поправлять и *укрѣплять* хорошею *пищею, чистымъ воздухомъ и движеніемъ*. 4) *Одержимаго гнилою* повреждаюю язвою тѣмъ болѣе нужно *содержать опрятно, въ чистой, свѣтлой комнатѣ*, отбросить острия мази и примочки, если онѣ были въ употребленіи, *ослабить тѣсную перевязку, поправить воздухъ*, дать больному рвотное, слабительное, — *очистить желудочно-кишечный каналъ рвотнымъ, слабительнымъ* (см. лѣченіе существенное) и потомъ *хорошую питательную пищу, горькое вино, питье съ кислотамъ сокомъ, клюквеннымъ, черно-смородинымъ, ежевичнымъ, лимоннымъ*, изъ *брусничнаго моченья и съ уксусомъ*, въ небольшомъ количествѣ прибавленнымъ къ водѣ. 5) Въ язвахъ варикозныхъ съ расширеніемъ венъ, по заживленіи ихъ на ногахъ, нужно стараться уничтожить расширеніе венъ; для этого надобно носить *утруги чулки*, которые, подобно корсетамъ, плотно охватываютъ и сжимаютъ ноги и голени до колѣнъ; простой народъ можетъ для этого употреблять *увязаніе ногъ* по колѣна *лыками* и носить длинныя, шерстяныя *опучи и лапти*. 6) Язвы вообще не рѣшаются лѣчить безъ употребленія приличныхъ внутреннихъ средствъ (исключая тѣхъ, которые происходятъ отъ наружныхъ мѣстныхъ болѣзней, напр. раны, вереда, гостоѣды, ссадины и т. п.), а имѣя намѣреніе залѣчить застарѣлую язву, сверхъ того, надобно напередъ произвести въ другомъ мѣстѣ, избранномъ по совѣту врача, *искусственную язву*, посредствомъ *гноеточниковъ* (Фонтанелей), и если за всеѣмъ тѣмъ, послѣ залѣченія такой язвы, появятся опасныя *припадки*, то, кромѣ лѣченія послѣднихъ, нужно немедленно *открыть застарѣлую язву*. 7) Въ *цынготныхъ язвахъ*, происходящихъ отъ *цынготнаго* расположенія тѣла, по которому всякая другая язва дѣлается *цынготною*, требуется соблюденіе правилъ *діететическаго лѣченія* собственно *цынга* (см. *цынга*, — *скорбуть*); пища должна быть хорошая, достатокъ въ *огородной зелени*, особенно *кислой капусты, свѣклы и т. п.*, сухое *свѣтлое, съ свѣжимъ воздухомъ жилище и дѣятельность*. Въ 1840 году, послѣ *неурожая хлѣба и зелени* въ 1839 году, къ веснѣ въ *губерніяхъ южной* полосы Россіи, особенно въ *Екатеринославской, Полтавской, Бѣвской, Воронежской, Саратовской, Пензенской и др.*, въ сильной степени *свирѣпствовала цынга съ язвами*. 8) Въ *язвахъ золотушныхъ* требуется соблюденіе правилъ *діететическаго лѣченія* *золотухи* (см. *золотуха*),

сверхъ того вялыя золотушныя язвы, какими онѣ бывають очень часто, требуютъ укрѣпляющей діеты, о чемъ сказано выше, а *омозолитыніе*, которымъ часто окружаются края золотушныхъ язвъ, *предотвращается рѣдкою и скорою ихъ перевязкою*. 9) Въ язвахъ лomotныхъ требуется соблюденіе правилъ діететическаго лѣченія лomotнаго ревматизма.

Лѣченіе существенное язвъ, состоящее въ поправленіи самаго поврежденія частей мягкихъ и болѣе или менѣе твердыхъ, должно быть точъ въ точъ такое же, какое сама натура избираетъ для этого. Но какъ мы видимъ, что загноившаяся рана и язва, предоставленная цѣлебной силѣ природы, заживають одинаково, то есть поверхность язвы, какъ и раны, теряетъ свой нечистый видъ, темный и ѣдкій, жидкій гной дѣлается бѣлымъ, желтымъ, жирно-маслянымъ и густымъ, изъ дна язвы, какъ и изъ раны, вырастають мясные сосочки, мягкіе, нѣжные, красные, сочныя и выполняють всю пустоту язвы, послѣ чего эти сосочки стягиваются, сбиваются въ кучку и, поровнявшись съ кожей, покрываются тонкою кожицею и такимъ образомъ заростають рубцомъ, — то и лѣченіе язвы, какъ и гноящейся раны, основывается на искусственномъ произведеніи этихъ же перемѣнъ. По этому въ обыкновенныхъ случаяхъ лѣченіе язвы, какъ и гноящейся раны, состоитъ въ покрытіи язвенныхъ, какъ и раненыхъ частей, чѣмъ либо такимъ, что бы, хотя отчасти, замѣняло имъ кожу и защищало ихъ отъ воздуха, слишкомъ для нихъ непріязненнаго и остраго; покрытыя части язвы, какъ и раны, сами овлажатся отдѣленными соками и нагрѣются собственною теплотою.

Лѣченіе простыхъ язвъ. *Всякую язву*, какъ и рану, нужно сколько можно рѣже перевязывать, менѣе держать открытою и не подвергать воздуху, но *непрерывно покрывать* ее. Язвы, какъ и раны, покрываются *ветошкою*, или *кортійною связочкою*, намазанными *свѣжимъ масломъ, саломъ, спускомъ* (№ 29), покрываются и стягиваются *ленточками липкаго пластыря*, *заливаются* растопленнымъ, не горячимъ *жиромъ, воскомъ*, свареннымъ въ сметку *яичнымъ желткомъ*, также завлаждаются свѣжимъ *творогомъ* и потомъ *одѣваются компрессомъ* (нѣсколько разъ сложенною ветошкою), и члены увиваются бинтомъ. Такъ перевязанныя язвы, какъ и раны, оставляются подъ повязкою до тѣхъ поръ, пока не заживуть, или пока что нпбудь особенное (боль, несносный зудъ, непріятный запахъ, накопленіе гноя въ язвахъ, какъ и въ ранахъ) не заставитъ снять перевязки; тогда, замѣнивъ ее новою, нужно опять содержать язву, какъ и рану, закрытою почти наглухо; перевязку возобновлять какъ можно рѣже и никогда не снимать ее безъ особенной причины, потому что частое возобновленіе перевязки, подвергая язву, какъ и рану, воздуху и разнымъ неосторожнымъ при томъ приемамъ перевязывателя, замедляетъ ея лѣченіе. Язвы, какъ и раны, заживляетъ сама натура нашего тѣла, а наша обязанность не мѣшать ея цѣлительной силѣ, но способствовать ей содержаніемъ язвенныхъ, какъ и раненыхъ, частей закрытыми, теплыми и

глазными, — а этого достигаемъ мы сказанными мѣрами. Язвы, бывающія на ногахъ чаще у *поселянъ* рабочаго класса, нередко неопредѣлительнаго свойства, очень полезно *перевязывать укусомъ*. Это средство не только очищаетъ язвы, но и заживляетъ ихъ при благоприятныхъ къ тому обстоятельствахъ; особенно язвы *гнетнаго свойства*, чаще всего бывающія у простаго народа, излѣчиваются этимъ средствомъ. Надобно только перевязывать раны правильно, держать на нихъ перевязку постоянно мокрую и вообще наблюдать за опрятностью. Самыя нечистыя язвы скорѣе очищаются и уменьшаются. Обыкновенно каждое утро язву сперва обмываютъ холодною или теплою водою, чтобы её хорошенько очистить, а потомъ еще простымъ укусомъ, и наконецъ на рану кладутъ сложенную ветошку, смоченную простымъ укусомъ, или же корнѣю; всё обвертывается бинтомъ \*). Продолжительныя язвы на ногахъ очень хорошо излѣчиваются и частыми обмываніями ихъ *мыльнымъ растворомъ*. Три или четыре раза въ день дѣлать растворъ мыла въ дождевой холодной, или чуть теплой, водѣ и вбалтывать такъ, чтобы было много пѣны, причѣмъ прибавлять къ водѣ понемногу мыла, чтобы дойти до совершеннаго ея насыщенія. Этою мыльною водою обмывать язвы въ продолженіе 10 или 20 минутъ. Сверхъ того, отъ времени до времени, наливать эту воду съ пѣною сверху струею или въ видѣ дождя на самыя язвы. Вытирать язвы тонкимъ полотенцемъ и перевязывать спускомъ (№ 29) \*\*). Язву какъ и рану, близкую къ заживленію, можно перевязывать *свинцовымъ* спускомъ, или стягивать ленточками *свинцоваго* (гнетнаго) *пластыря* и укрѣплять перевязкою, которую нужно еще нѣсколько времени носить и по заживленіи язвы, дабы тонкій и нѣжный рубецъ могъ укрѣпиться и не порваться при неосторожномъ употребленіи члена. У людей молодыхъ, здоровыхъ, полносочныхъ, мясные сосочки разрастаются въ дикое мясо, которое лучше всего можно истребить *ляписомъ* (адскимъ камнемъ) или порошкомъ *жженыхъ квасцовъ*. Язву, какъ и рану, поверхностную, широкую или въ которой выростаетъ слишкомъ много мясныхъ сосочковъ, врачи *прижигаютъ слегка палочкою ляписа* (адскаго камня), отъ котораго язва, какъ и рана, вдругъ подергивается тонкою корою и скоро заживаетъ подъ нею. Такъ лѣчатся чрезъ нагноеніе простыя, недавнія и чистыя язвы, какъ и раны.

Лѣченіе язвы воспалительной. Язву воспалительную нужно перевязывать, какъ можно рѣже и скорѣе, покрывать её *мягкими притирками* (№№ 26, 149, 151); къ мякишу бѣлаго хлѣба свареннаго въ молокѣ очень полезно прибавлять *свинцовой воды*, сдѣланной изъ воды съ свинцовымъ сахаромъ (распуская золотникъ послѣдняго въ фунтъ первой), или *жиромъ, спускомъ* (№ 29), *яичнымъ желткомъ*; если воспаленіе не унимается, то вокругъ язвы можно поставить нѣ-

\*) Др. Здр. 1848 г. № 28 стр. 222.

\*\*\*) Др. Здр. 1850 г. № 32. стр. 253.

сколько *пйавицъ*, больному дать внутрь порошки изъ *салитры* съ *кн. мортартаромъ* (№ 181), *кислое питье* (изъ воды съ кислымъ сокомъ) и назначить холодное и спокойное содержаніе.

**Лѣченіе язвы чувствительной.** Въ этой язвѣ, бромъ рѣдкой перевязки, которой не терпитъ и самъ больной, и закрытаго содержанія язвы, бываютъ полезны болеутоляющія, притупляющія, одуряющія лѣкарства (наркотическія): *свѣжія листьа бѣлены* (блекоты) *съ льнянымъ стѣменемъ*, *маковья головки*, *листья паслена* въ припаркахъ, вмѣсто мази, *масло* изъ *бѣлены*, которое втирается и въ окружность язвы.

**Лѣченіе гнилой, помертвѣлой язвы.** Въ этой язвѣ полезны: *лепечки* изъ *кислаго пльста* съ *медомъ*, или *изъ муки*, *дрожжей* и *мѣда*, присыпка порошкомъ; такъ напр. порошкомъ изъ двухъ частей *березоваго угля* и одной части *урнаго корня* или *хины*, язва посыпается и потомъ порошокъ смачивается *скимидарнымъ масломъ*; отъ этого происходитъ на язвѣ струшь, съ отпаденіемъ котораго отдѣляются помертвѣлыя части, которыя нужно осторожно снимать ножницами, щипчиками, и язва очищается; примочка изъ *наливки урнаго корня*, *отвари дубовой* или *хинной корки* съ *камфоромъ*, которые даются и внутрь больному (№№ 46, 48); врачи прибавляютъ еще къ нимъ небольшое количество *стърной* или *соляной кислоты*, но прежде всего даютъ *рвотное* (изъ 15-ти гранъ ипекакуаны) и *слабительное* изъ *отвари сухой коры крушины* (№№ 74, 75), или *александрійскаго листа* (№ 186). Заведшіеся въ язвѣ черви истребляются *скимидаромъ*, а новое ихъ появленіе предотвращается опрятнымъ содержаніемъ больного; вообще, однако, гораздо лучше при гнилой червенной язвѣ пригласить врача.

**Лѣченіе мозолистой язвы.** Мозолистыя части нужно или размячить, или и совсѣмъ удалить, иначе язва не заживетъ, а превратится въ свищъ (фистула); мозолистыя мѣста язвы можно смягчить теплыми и ароматными припарками, намазывая ихъ жиромъ, масломъ, покрывая свѣжими листьями травъ *подорожника*, *лонунины*, *капусты*, *мякотью моркови*, *свеклы*, *мягчительными пластерями*, примачивая камедистымъ, мыльнымъ, растворомъ нашатыря. Если послѣ употребленія этихъ средствъ въ теченіе 1—2 недѣль не разрѣшаются мозолистыя части, то ихъ можно истребить ѣдкими средствами: порошкомъ *жженныхъ квасцовъ*, ѣдкимъ нашатырнымъ спиртомъ, *скормянымъ масломъ*, а еще лучше *ляписомъ* (адскимъ камнемъ); врачи, если мѣсто язвы позволяетъ, насаждаютъ мозолистыя мѣста ланцетомъ или и совсѣмъ срѣзываютъ, либо отдѣляютъ черешкомъ ножица, какъ настоящіе мозоли.

**Лѣченіе губчатой язвы.** Губчатые наросты въ язвѣ, часто означающей, что подъ нею находится костоѣда, проходятъ иногда отъ сухой, плотно сжимающей повязки язвы, и отъ ѣдкихъ средствъ: отъ *присытки* язвы *порошкомъ* изъ *сахара*, *жженныхъ квасцовъ*, *ревеня*,

отъ *прижиганія лянисомъ, сурмянымъ масломъ*. Губчатые наросты, съ узкимъ основаніемъ на тонкихъ корешкахъ, *перевязываются ниткою, срѣзаются* врачами *пожеемъ* или *пожницами*, или *прижигаются раскаленнымъ желѣзомъ* (большою иглою, шиломъ): последнее употребляется и для остановленія кровоточенія изъ губчатой язвы.

Лѣченіе язвы варикозной съ расширеніемъ вены бываетъ продолжительное и требуетъ особенной внимательности для открытія ихъ причинъ, безъ удаленія которыхъ усилѣхъ лѣченія язвъ бываетъ не вѣренъ и непроченъ, такъ что зажившія язвы опять открываются. Поэтому при лѣченіи этихъ язвъ всегда нужно прибѣгать прежде къ совѣту врача. Впрочемъ язвы эти *покрываются сухой кортеею, стягиваются латкнымъ пластыремъ*, отекающій членъ равномерно, но плотно, *уви- ается бинтомъ*.

Лѣченіе цынготныхъ язвъ. При этомъ лѣченіи нужно прежде всего лѣчить самую цыngu (см. цынга). Самыя язвы нужно *примачивать отварами дубовой, ивовой корки съ квасцами*, или *наливкою ирнаго корня* (врачи прибавляютъ нѣсколько къ отвару этому *соляной кислоты*), посыпать ихъ порошкомъ изъ *угля дубовой же корки* или *хины съ камборою*; окружныя мѣста натирать *муравейнымъ, березовымъ спиртомъ, хрѣнковою водкою*; голени и бедра покрывать ветошками и увивать бинтомъ, намоченными въ хрѣнновомъ винѣ, *спиртъ ложечной травы* и проч. При язвахъ во рту на деснахъ, дѣлается *полосканье изъ отвара дубовой корки, наливки ирнаго корня съ квасцами, медомъ и хрѣнновымъ виномъ*, также изъ отвара *хинной корки*, или язвы эти намазываются *мазью изъ меда, буры, уксуса, либо лимоннаго сока*.

Лѣченіе золотушныхъ язвъ зависитъ отъ излѣченія самой бо- лѣзни (см. лѣченіе золотухи). Опухоли желѣзъ нужно стараться разо- гнать, втирая въ нихъ *летучую мазь* (№ 76) одну и попеременно съ *мазью изъ бодяги* (№ 78); врачами сверхъ того употребляется и *ртутная*, покрывая ихъ свѣжими, сочными *листьями* растений *подорожника, лопушника, бѣлены, пластырями: изъ мыла съ камборою* или съ *бысачьею желчью, ртутнымъ изъ болиголовы, аммиачной камеди*. Если опухоли болятъ и краснѣютъ, то къ нимъ повторительно припу- скаются *пѣявицы*, прикладываются сухіе *травяные мѣшечки* (№№ 68, 69), или *мягчительныя* мокрыя *припарки* (№№ 26, 54, 55, 151). Самыя золотушныя язвы заживаютъ очень медленно и лѣченіе ихъ должно быть очень простое: сухая, или свѣжимъ *масломъ*, либо спускомъ намазанная *корпійная связочка, ленточки* какаго либо изъ упо- мянутыхъ *пластырей, компрессъ, укрѣпляемая бинтомъ*, — вообще бы- ваютъ достаточны. Въ противномъ случаѣ обыкновенный *щелокъ изъ золы* (какъ дѣлаютъ для бѣлья) оказываетъ превосходное дѣйствіе; имъ обмываютъ язвы три раза въ сутки въ видѣ струи сверху, и потомъ обкладываютъ рану чистою сухою кортеею. Въ 10-ть дней (рѣдко до-

лѣе) язвы заживаютъ отъ этого простаго средства совершенно \*). Точно такимъ же образомъ должно пользоваться золотушныя язвы, извѣстныя въ народѣ подъ названіемъ *волосатикъ*. *Припарки* изъ травы *руты* съ *солью* и *виномъ* также цѣлбно дѣйствуютъ на нечистыя язвы, даже и такія, въ которыхъ бываютъ черви. Простонародныя лѣкарки лѣчатъ успѣшно волосатикъ такъ: готовятъ изъ древесной золы горячій щелокъ, нѣсколько *хлѣбныхъ колосьевъ* и большое корыто. Больной ложится въ корыто нагой, лѣкарка набрасываетъ на страждущую часть его колосья, потомъ немедленно выливаетъ на него ушатъ горячаго щелока, поливая имъ постепенно поверхность тѣла. Черезъ нѣсколько минутъ на колосьяхъ показываются свившіеся въ клубъ волосатики. Способъ этого лѣченія повторяется черезъ день и при каждомъ разѣ на колосьяхъ находятъ новыхъ червей, подобныхъ прежнимъ. Полный курсъ лѣченія назначается слишкомъ три недѣли и 12-ть приемовъ этихъ щелочныхъ поливаній. Нѣкоторыя лѣкарки вмѣсто щелока употребляютъ отваръ корня *водянаго лопушника* (бахтовникъ) съ одинаковою пользою.

Прим. Золотушное воспаленіе и изъясненіе носа, губъ, щекъ, причиняетъ упорный, продолжительный насморкъ, непріятный запахъ, уничтожаетъ обоняніе и производитъ безобразіе; такія язвы скорѣе всего проходятъ отъ обмыванія ихъ отваромъ изъ стеблей *чернаго наслени*, травы *руты*, особенно съ *солью* и *виномъ*, и отъ прижиганія ихъ *ляписомъ* (адскимъ камнемъ).

Лѣченіе язвъ ломотныхъ. Ломотныя язвы бываютъ очень упорны въ излѣченіи, осаждаютъ на своей поверхности известковую массу, и при заживленіи требуютъ особенной осторожности, потому что острые соки ломоты легко бросаются на желудокъ, легкія, сердце и мозгъ и причиняютъ опасныя болѣзни. Ломотныя язвы сами по себѣ заживаютъ при надлежащемъ общемъ лѣченіи ломоты и ревматизма внутренними и наружными средствами (см. ревматизмъ); мѣстное лѣченіе этихъ язвъ ничѣмъ не отличается отъ лѣченія язвъ вообще.

При лѣченіи язвъ у вышеозначенныхъ, подверженныхъ имъ рабочихъ поселянъ (см. причины язвъ), нужно соображаться съ изложенными для нихъ правилами въ особенности въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію. (См. это росписаніе).

Лѣченіе язвъ у дѣтей. Изъ предъидущаго уже видно, что язвы, такъ же, какъ и лишай, очень важны въ отношеніи къ здоровью. Ни подъ какимъ видомъ не должно рѣшаться заживлять язвы безъ употребленія внутреннихъ средствъ, потому что, пока язвы находятся на тѣлѣ, дитя предохраняется чрезъ то отъ худыхъ послѣдствій худосочія, и какъ только здоровье дитяти поправится, то язвы почти всегда заживаютъ сами собою. По большей части достаточно перевязывать язвы *спускомъ* (№ 29), или *мазью* изъ *угля*, либо *сажи*, смѣшанныхъ съ *саломъ*. Еслибъ очень много отдѣлялось матеріи, то перевязывать язвы

\*) Др. Злр. 1845 г. № 31. стр. 242.



*чесанымъ льномъ, а лучше чесаною хлопчатого бумагою, которую перемѣнять раза два въ день: еслибъ было около язвъ раздраженіе, то хлопчатую бумагу смачивать прованскимъ, либо деревяннымъ масломъ, а иногда свищовою водою. Для уничтоженія раздраженія очень полезно также перевязывать язвы тсорогомъ. Если язва очень болитъ, то употреблять припарку изъ льянянаго и коноплянаго съмеси: если матерія сильно воиная, то посыпать язву толченымъ углемъ, а чтобъ скорѣе язвы зажили, довольно потуже стягивать бинтомъ тотъ членъ, на которомъ находятся язвы. Во всемъ прочемъ должно поступать такъ, какъ сказано при лѣченіи язвъ у взрослыхъ людей.*

## Ожога.

**Опредѣленіе.** Ожога есть мѣстное пораженіе какой либо части нашего тѣла съ бѣльшимъ или меньшимъ разстройствомъ кожи и рдѣющею краснотою, въ слѣдствіе прикосновенія къ нему огня въ видѣ пламени, раскаленнаго угля, кипящей жидкости (у стряпокъ и поваровъ) металла, камня (у трубочистовъ), масла, или ѣдкихъ веществъ минеральныхъ кислотъ: сѣрной (купоросное масло), соляной, селитряной, (царской, или брѣнкой водки), ѣдлага жидкаго поташа и т. п.

**Раздѣленіе.** По степени жара, ѣдкости и количеству веществъ, по мѣсту, обширности и продолжительности ихъ дѣйствія на тѣло, ожога бываетъ очень различна; чѣмъ сильнѣе жаръ, дѣйствующій на обширное мѣсто и притомъ долго, тѣмъ жесточе и опаснѣе бываетъ ожога, которая по этому имѣетъ четыре главныя степени. *Первая легкая степень* ожоги обозначается рожистой краснотою и незначительною болью, безъ опухоли и лихорадки; *вторая степень* ожоги обнаруживается яркою краснотою, сильною болью, значительною опухолью, лихорадкою; *въ третьей степени* ожоги, кожа на обнаженномъ мѣстѣ отстаетъ отъ кожи вдругъ, или медленно вздувается въ пузыри, содержащіе прозрачную или мутную желтоватую жидкость, по лопнутіи же пузырей обожженное мѣсто покрывается струпомъ; *въ четвертой степени* обожженное мѣсто только на поверхности или въ глубинѣ, либо и весь членъ до кости разстроивается и помертвѣваетъ; иногда кожа перегораетъ въ струпъ.

**Признаки.** Въ первыхъ двухъ степеняхъ (исключая ожоги глаза), ожога мало беспокоитъ больнаго, воспаление разрѣшается удобно безъ всякихъ послѣдствій, и больной выздоравливаетъ. Въ третьей степени ожоги, воспаление всегда переходитъ въ нагноеніе, часто очень обширное, изнурительное; отъ вліянія воздуха на обнаженныя отъ кожи части послѣднія сильно страдаютъ и причиняютъ мучительную, жгучую боль; если ожога въ этой степени занимаетъ богъ или полтѣла, какъ то случается при обвареніи кипяткомъ на винокуренныхъ заводахъ, въ баняхъ, прачечныхъ и проч., то обожженный всегда умираетъ отъ жестокаго и обширнаго воспаления и отъ мучительныхъ

болѣй; впрочемъ нагноеніе въ этой степени бываесть поверхностное, ограничивается одною кожею и только изрѣдка появляются глубокіе нарывы, жестокая лихорадка, страданіе желудка. Поверхняя, но обширная ожога заживаетъ медленно, потому что обнаженное мѣсто не скоро покрывается новою кожицею и затягивается рубцемъ, очень часто не ровнымъ, безобразнымъ. Обожженные пальцы, вѣки, губы, нерѣдко сростаются между собою и причиняютъ безобразіе. Въ четвертой степени ожоги, воспаленіе проникаетъ глубоко, мягкія части помертвѣваютъ и отпадаютъ кусками, обнажаются бровяные сосуды, нервы, кости, появляются судороги, горячка съ бредомъ, или слѣдуетъ скоростигшая смерть.

**Предсказаніе** зависитъ отъ степени и обширности ожоги. Вообще при ожогѣ не такъ важна степень, какъ обширность: обгорѣвшій до кости палецъ не такъ опасенъ, какъ обвареніе кипяткомъ головы, обожженіе всей спины, живота и проч.

**Лѣченіе предохранительное** состоитъ вообще въ преподаваніи правилъ оберегать себя отъ всѣхъ причинъ или непосредственнаго прикосновенія къ огню, въ какомъ бы онъ видѣ ни былъ, и къ ѣдкимъ веществамъ, а въ частности для стряпокъ (кухарокъ), поваровъ и трубочистовъ изложены особыя правила въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію.

**Лѣченіе существенное** ожоги имѣетъ главною цѣлью какъ можно поспѣшнѣе умѣрить воспаленіе и защитить обожженные части отъ воздуха. Для этого легкія ожоги, тотчасъ послѣ обожженія, должно намазать густо *чернилами*, если есть они подъ руками, и по мѣрѣ того, какъ чернила на нихъ начнутъ подсыхать, намазываніе ими повторять до тѣхъ поръ, пока боль совершенно въ ожогѣ затихнетъ и уничтожится. Но лучше употреблять въ этомъ случаѣ *настоящую чернильную орѣшковъ*, приготовленную такимъ образомъ: взявъ полфунта чернильныхъ орѣшковъ, истолочь крупно, и наливъ осьмуху пѣнаго вина, настаивать въ тепломъ мѣстѣ дней шесть; процѣдивъ и сливъ съ осадка, примачивать обожженные мѣста посредствомъ ветошки. Предъ чернилами настойка эта имѣетъ преимущество, во первыхъ, по тому, что гораздо дѣйствительнѣе ихъ, и во вторыхъ, что въ составъ иныхъ чернилъ входятъ такія смѣси, которыя могутъ оказать на обнаженные отъ кожицы части вредное вліяніе, какъ напр. уксусокислая мѣдь, селитрокислая, или красноосадочная ртуть, а сверхъ того нерѣдко готовятъ домашнія чернила изъ синяго сандала; слѣдовательно, они въ ожогахъ вовсе не дѣйствительны. За неимѣніемъ этихъ средствъ подъ руками, должно обожженный членъ въ ту же минуту *погрузить въ горячую* (сносную для опущенной въ нее здоровой руки) *воду*, или *держатъ* обожженную часть *передъ огнемъ* до тѣхъ поръ, пока не уменьшится боль, *тереть* ее *солью*, *спиртомъ*, *водкою*, или приложить къ ней ветошку, вчетверо сложенную. Такъ легкія ожоги всегда удобно излѣчиваются, не болѣе, какъ въ  $\frac{1}{2}$  часа, безъ всякихъ вредныхъ по-

слѣдствій. Но если въ теченіе этого времени боль не прекратится, то нужно употребить другія средства: *въ первыхъ двухъ степеняхъ ожоги*, пока еще не обнажены обожженные части, покрывать ихъ *третьимъ картофелемъ, морковью, свеклою, рѣпою, свѣжими листьями капусты, подорожника, свеклы, лапушника*, примачивать *холодную водю*, простою или *свинцовою*, взятою изъ аптеки, либо составленною дома изъ свинцоваго сахара и воды (золотникъ свинца. сахар. на 1 ф. холодной воды, взбалтывая, смѣшавъ); натирать *снѣгомъ и льдомъ. Въ третьей степени*, когда появятся пузыри и обнажатся части, нужно защищать ихъ отъ воздуха; въ этомъ случаѣ оказываютъ чрезвычайную пользу: *яичный бѣлокъ, взбитый съ двумя ложками хорошаго деревяннаго (оливковаго, прованскаго) масла*, которымъ намазываютъ ожоги или прикладываютъ его къ нимъ на ветошѣ (последнее лучше, потому что не такъ скоро высыхаетъ); *мягкая мука*, которою посыпаютъ ожоги или прикладываютъ ее къ нимъ, также какъ *мѣлъ* къ красной рдѣющей рожѣ; *конопляное, льняное, свѣжее коровье масло, сливки, гусиное и свиное сало, пакля и хлопчатая бумага съ уксусомъ*, особенно *краснымъ*. Изъ всѣхъ этихъ средствъ конопляное масло, пакля и хлопчатая бумага съ уксусомъ неоднократно убѣждали меня въ превосходномъ ихъ дѣйствиіи, даже въ обширнѣйшихъ ожогахъ кожи, груди, шеи и лица, происходившаго въ деревняхъ отъ пожаровъ, возникавшихъ внутри крестьянскихъ избъ отъ загорѣвшагося мочала по случаю тканья циновокъ для рогожей и кулей. Коноплянымъ масломъ, налитымъ въ плошку или черепокъ, помазываютъ посредствомъ гусинаго пера почти непрерывно обожженные части и постоянно продолжаютъ это дѣлать до совершеннаго окончанія болѣзни, когда струпуя отпадутъ и останется только покраснѣлость подъ ними кожи. Изъ числа многихъ больныхъ; успѣшно этимъ средствомъ излѣчившихся, въ моемъ виду былъ одинъ случай, особенно замѣчательный. Старуха въ 70 лѣтъ, у которой вся передняя часть груди, шеи и лица была обожжена пламенемъ огня, развившимся внутри избы въ ночное время, въ продолженіе 6-ти недѣль совершенно излѣчилась этимъ однимъ средствомъ. Расчесанною хорошо паклею изъ льна или хлопчатую бумагою въ видѣ ровнаго и въ палецъ толстаго слоя, намоченною уксусомъ, покрываютъ обожженное мѣсто; тамъ, гдѣ пакля или бумага противъ прорвавшихся пузырей протекаетъ, нужно положить новые слои пакли или бумаги, также смоченной уксусомъ, — не снимая прежняго слоя, — которые остаются до тѣхъ поръ, пока вздувшіяся въ пузыри мѣста, отъ прижатія ихъ не будутъ причинять никакой боли: это значить, что отдѣлившаяся кожа замѣнилась новою. Если обожжены и обнажены отъ кожицы части тѣла, прикасающіяся другъ другу, напр. пальцы, вѣки, плеча подъ мышками, паха, то непременно нужно между ними вѣсть ветошку или корпю, напитанную масломъ, сливками, мазью, иначе соприкасающіяся части легко сростутся между собою и будутъ причиною не свободнаго владѣнія членовъ и безобразія. Но если не за-

медляютъ употребленіемъ надлежащихъ этихъ средствъ, то большею частію ожоги оканчиваются безъ вздутія пузырей и безъ нагноенія. При недостаткѣ пагли или хлопчатой бумаги можно насыать на обнаженныя мѣста, чрезъ частое сито, слой муки вездѣ равномѣрно, а на пузырь и толще; если мука промокнетъ отъ лопнувшихъ пузырей, то нужно вновь насыать свѣжей муки. Если слой пагли, хлопчатой бумаги, или муки начнутъ отставать, то это значитъ, что подъ ними началось нагноеніе, и тогда нужно гноящіяся мѣста перевязывать густыми *сливками, коноплянымъ, льнянымъ* и свѣжимъ *коровьимъ масломъ*; этими средствами намазываются холстинки, которыми и покрываются обожженные мѣста, одѣваемые сверху того компрессами. *Пузыри*, не прорывающіеся произвольно на толстокожихъ мѣстахъ, можно допустить *прокалывать* ланцетами, иглою и жидкость слегка выжимать и собирать мягкой губкою, корпіею, паблею, хлопчатую бумагою. Если сойдетъ кожа, и обожженное мѣсто очистится нагноеніемъ, то многіе изъ врачей обожженные части прижигаютъ *ляписомъ* (адскимъ камнемъ), отъ этого онѣ покрываются струпомъ, на который кладутъ *масляную тряпку* и ожидаютъ отдѣленія струпа, по отпаденіи котораго, если ожога не покрывается кожей, то прижиганіе повторяютъ и даже нѣсколько разъ, пока, съ отпаденіемъ струпа, не заростутъ рубцомъ обожженные части. Прижиганіе ляписомъ бываетъ нужно и тогда, когда обожженные мѣста разрастаются въ мясные сосочки (дигое мясо), которые отъ прижиганія увядаютъ, и язва заживаетъ скоро. Такия прижиганія смѣло производятъ на обширной поверхности (по всей спинѣ, на ляжкахъ, по лицу и пр.), даже и тогда, когда еще нѣтъ наросшихъ мясныхъ сосочковъ, но кожа сошла со всего обожженного мѣста, которое притомъ не распухло, не болитъ, гноится и поблѣднѣло. Послѣ этихъ прижиганій остается струпь, сначала сѣрый, а потомъ черный, который плотно покрываетъ обнаженные части, какъ временная кожа, и защищаетъ ихъ отъ воздуха и подъ которымъ скоро и быстро вырастаетъ кожа и рубецъ. Если вокругъ обнаженныхъ и обожженныхъ мѣстъ продолжается воспаленіе, жаръ, опухоль и боль, то самая ожога перевязывается вышесказанными мазями, а окружное мѣсто холодными примочками, особенно *свинцовой водою*. Если въ третьей степени, при обширной ожогѣ важной части тѣла, появится горячка, то приглашеніе врача становится необходимою потребностію, за неимѣніемъ же его по близости въ этомъ крайнемъ случаѣ должно назначать *строгую діету*, какъ и въ воспалительной горячкѣ, а внутрь давать *селитру съ кремортартаромъ* (№ 181), *кислое питье* (№ 178), *слабительное изъ вѣнскаго питья* (№ 139), или *англійской соли* (№ 73). Если обожженное мѣсто сильно распухло и болитъ, ожога находится на лицѣ, спинѣ, груди, больной молодъ, то врачи назначаютъ *кровопусканіе* изъ вены руки; приставляютъ *пѣвицы* вокругъ страдающихъ мѣстъ, которыя покрываютъ ветошкою съ *мягчительною мазью*, состоящею изъ известковой воды съ деревяннымъ масломъ, и часто пере-

мѣняютъ, намазывая вновь ея же (въ недавнихъ ожогахъ), а потомъ для уменьшенія сильнаго жара и воспаленія во всѣхъ обожженныхъ частяхъ прикладываютъ къ нимъ припарку изъ мякиша бѣлаго хлѣба съ молокомъ и свѣжимъ коровьимъ масломъ. Тоже дѣлаютъ при ожогѣ *въ четвертой* ея степени, обозначающейся толстымъ струпомъ въ видѣ коры (при ожогѣ огнемъ, кислотами), или блѣднымъ сварившимся мясомъ (при ожогѣ кипяткомъ), и сопровождающейся помертвѣннемъ, противъ котораго компрессы, смоченные теплымъ *отваромъ коры ивовой, дубовой, ольховой*, но всего лучше *хинной*, прикладываютъ къ помертвѣвшимъ мѣстамъ ожоги (антоновъ огонь) одни (№№ 43, 45, 47) и съ бамфорю (№№ 44, 46, 48) и даютъ оныя внутрь.

## Отмороженіе (ознобленіе).

**О п р е д ѣ л е н і е.** Отмороженіе, или ознобленіе, есть мѣстное воспалительное пораженіе, причиняемое сильнымъ холодомъ, подѣйствовавшимъ продолжительно на какую либо часть нашего тѣла съ большимъ или меньшимъ разстройствомъ на ней кожи и рдѣющею краснотою.

**Р а з д ѣ л е н і е.** Отмороженіе, подобно ожогѣ, бываетъ трехъ степеней или видоизмѣненій.

**П р и з н а к и.** *Въ первой степени* замѣчается въ кожѣ рдѣніе или легкая краснота, небольшая припухлость, жаръ, зудъ, жженіе, стрѣляніе, особенно въ теплотѣ, ввечеру въ постели. Это отмороженіе, оставленное безъ вниманія, дѣлается какъ бы привычнымъ, а въ худую погоду, осенью беспокоитъ, на холодѣ же легко возобновляется. *Во второй степени*, отмороженіе представляетъ значительную, даже высокую рожистую красную или синеватую, мягкую опухоль, въ которой снаружи въ кожѣ чувствуется жгучая, а внутри колючая боль; на опухоли появляются иногда пузырьки, наполненные темною жидкостію; при этой степени отмороженія, смотря по его мѣсту и обширности, замѣчается лихорадка. Эта опухоль рѣдко разрѣшается, но обыкновенно переходитъ въ нагноеніе и язву, которая бываетъ глубока, нерѣдко проникаетъ до костей и трудно излѣчивается. *Въ третьей степени* отмороженные мягкія части помертвѣваютъ до костей, и это происходитъ или во время ихъ оттаиванія, или же послѣ непродолжительнаго, но сильнаго воспаленія; въ этой же степени у людей слабыхъ появляется горячка. Вторая и третья степени могутъ быть вмѣстѣ: на срединѣ отмороженія бываетъ помертвѣніе (антоновъ огонь), а вокругъ послѣдняго нагноеніе и воспалительная опухоль, которыя остаются по отпаденіи поумертвѣвшихъ частей и такимъ образомъ представляютъ переходъ третьей степени отмороженія во вторую.

**П р и ч и н ы.** Чѣмъ сильнѣе холодъ и рѣзче вѣтеръ, тѣмъ легче отмораживаются части тѣла; но худая, плохо грѣющая одежда, тѣсная непрочная обувь, сырая постилка въ сапогахъ, мокрые чулки и онучи, сидѣніе на одномъ мѣстѣ, пустой желудокъ, предшедшее разгоряченіе

вспомъ, теплымъ питьемъ, горячимъ, жидкимъ кушаньемъ — усиливаютъ расположеніе къ отмороженію, которое по этимъ причинамъ бываетъ возможно не только зимою въ морозы, на открытомъ воздухѣ, но и въ другія времена года, даже лѣтомъ, въ жилыхъ покояхъ. Отмороженія происходятъ удобнѣе у людей нѣжныхъ, слабыхъ, худощавыхъ, у женщинъ, у непривыкшихъ къ холоду и чаще всего на мѣстахъ тѣла, удаленныхъ отъ сердца, малокровныхъ и открытыхъ: на лицѣ, рукахъ и ногахъ.

Лѣченіе. Предохранительное состоятъ: 1) въ остереженіи отъ предшествовавшихъ причинъ болѣзни и 2) въ заблаговременномъ предотвращеніи развитія болѣзни, дѣлающейся въ послѣдствіи трудно излѣчивасюю. Для этого въ легкой степени отмороженія и незначительной части тѣла *отмороженное мѣсто* нужно *вскорѣ оттирать снѣгомъ* и въ *холодномъ мѣстѣ* (не въ теплой комнатѣ) до тѣхъ поръ, пока оно изъ бѣлаго или сняго *не сдѣлается краснымъ* и не появится въ немъ жаръ и жженіе; тогда оставить треніе, а ознобленное мѣсто нужно еще *покрывать снѣгомъ* до тѣхъ поръ, пока въ немъ *не прекратится чувство жара*, послѣ того оно *натирается водкою, камфорнымъ спиртомъ*. Если ознобленіе очень сильно и обширно, то ознобленная часть тѣла покрывается снѣгомъ, или *погружается* въ самую *холодную воду*, вода и снѣгъ безпрестанно возобновляются свѣжими, по мѣрѣ ихъ таянія и нагрѣванія; ознобленная часть и сосудъ съ водою покрываются чѣмъ либо для защиты отъ воздуха, который можетъ ихъ скоро нагрѣть; намерзающія вокругъ части тѣла ледяныя сосульки осторожно удаляются. Все это дѣлается въ холодномъ мѣстѣ и продолжается до тѣхъ поръ, пока въ ознобленной части не появится натуральная теплота, затѣмъ членъ вынимается изъ воды, освобождается изъ подъ снѣга и натирается еще снѣгомъ *съ солью* до тѣхъ поръ, пока не покраснѣетъ, послѣ того ознобленное мѣсто натирается уксусомъ, водкою, *камфорнымъ спиртомъ*, и покрывается холстинною, суконкою, фланелью, намоченными въ этихъ жидкостяхъ; ознобленный помѣщается въ теплой комнатѣ, получаетъ теплое питье изъ липоваго бузиноваго цвѣта, сухой малины, съ виномъ, ложится въ постель и покрывается тепло, чтобы пропотѣть. Если руки и ноги сильно озноблены и вовсе неподвижны въ суставахъ, то съ ними нужно осторожно обходиться при погруженіи въ воду или треніи, иначе ихъ легко можно переломить. Главное дѣло при оттаиваніи ознобленныхъ частей, равно какъ и при оттаиваніи всего тѣла, состоитъ въ медленномъ сообщеніи имъ теплоты и для того гораздо безопаснѣе и лучше долѣе продолжать обкладываніе снѣгомъ и держать членъ въ холодной водѣ, чѣмъ раньше это прекратить, и такимъ образомъ сообщать члену теплоту, которой онъ теперь еще не можетъ вынести, и потому опухаетъ, краснѣетъ и подвергается воспаленію.

Лѣченіе существенное отмороженія, въ какой бы оно степени ни было, сколько бываетъ успѣшно въ началѣ болѣзни, столько же, напро-

тивъ, безуспѣшно, когда она застарѣетъ и превратится въ гноеточивую съ помертвѣніемъ рану. Въ началѣ всегда нужно употреблять *холодную примочку* изъ *слиз*, самой *студеной воды со льдомъ*, послѣ этого обмывать и *примачивать* членъ *водою съ уксуомъ, водкою, камфорнымъ спиртомъ, известковою водою, скипидарнымъ масломъ, растворомъ нашатыря*; средства эти сначала употребляются холодными, а потомъ и теплыми. Испытанное средство для уничтоженія послѣдствій отмороженія, познаваемыхъ изъ того, что отмороженныя части, при наступленіи зимнихъ морозовъ, опухаютъ и нерѣдко принимаютъ синева-то-красный цвѣтъ, состоитъ въ слѣдующемъ: двѣ драхмы *камфорнаго спирта* смѣшиваются съ полудрахою *шафранной настойки*. Этою жидкостью смазываются посредствомъ пера отмороженныя части передъ печью 2—3 раза въ день. На другой день исчезаетъ зудъ и припухлость, а на 3—4 день части, потерпѣвшія отъ холода, приходятъ опять въ здоровое состояніе. При образовавшемся уже изъязвленіи должно, для излѣченія болей, смазывать только припухшую округность язвъ, потому что, по удаленіи опухлости, язвы обыкновенно заживаютъ сами собою, послѣ чего можно намазывать и самыя мѣста бывшихъ язвъ означеннымъ составомъ \*). Сухія *огуречныя корки* въ простонародіи употребляются съ лучшимъ успѣхомъ. Высушиваютъ корки съ огурцовъ, оставленныхъ на грядкахъ до совершеннаго ихъ созрѣнія для сѣмянъ, и въ ознобленныхъ отмороженныхъ мѣстахъ прикладываютъ ихъ, размочивъ предварительно въ теплой водѣ, мякотью къ тѣлу; какъ скоро онѣ высыхаютъ, ихъ переменяютъ на другія. Если этого недостаточно, и отмороженное мѣсто распухло, покраснѣло или почернѣло, то необходимо обратиться къ кому либо изъ врачей, которые часто прежде всего назначаютъ въ этомъ случаѣ припустить *пѣвицы*, а потомъ распухшее мѣсто намазывать *саломъ*, особенно *свинымъ, гусинымъ, оленьимъ, льянымъ, деревяннымъ масломъ*, либо примачивать *сокомъ* изъ *рты, моркови, петрушки, рѣдьки, отваромъ можжевельныхъ ягодъ*, или покрывать *густымъ тѣстомъ*, приготовленнымъ изъ *моркови, рты, картофеля* изъ *печенаго лука, чеснока* (при отмороженіи рукъ, ногъ, пальцевъ), *припарками* изъ *гилыхъ яблокъ, ромашки, бузины, теплымъ столярнымъ клеемъ*. Всѣ эти средства употребляются въ такомъ порядкѣ, въ какомъ они здѣсь значутся, и притомъ сначала холодными, а потомъ теплыми, возвышая теплоту не вдругъ, а постепенно; ихъ можно смѣшивать одно съ другимъ. Вообще при лѣченіи отмороженій врачи наблюдаютъ слѣдующее: въ первыя минуты оттираніе снѣгомъ и холодныя примочки; при опухоли сало, масло, припарки и пѣвицы; *пузырьки* на опухоли *вскрываются ланцетомъ*, обнаженное мѣсто покрывается *спускомъ* (№ 29) пластыремъ; при нарывѣ и изъязвленіи, мѣсто язвы покрывается густымъ, медвѣжьимъ саломъ, спускомъ, известковою, цинковою мазью съ миррою, камforoю, а при боли

\*) Др. Здр. 1843 г. № 13. стр. 99.

съ опіемъ; язва обмывается *растворомъ* въ водѣ хлориновой *известки* (на фунтъ первой столовую ложку второй) и членъ увивается бинтомъ, дикое мясо на язвѣ истребляется *лписомъ* (адскимъ камнемъ). Если отмороженіе не перешло въ нарывъ и язву, или послѣдняя уже зажила, но въ отмороженномъ мѣстѣ продолжается зудъ, стрѣльба, щемленіе, боль, то полезна бываетъ *мыльная* жидкая *мазь* съ *настоящою* *ишанскихъ* *мушекъ* или *стручковаго* *перца* (на унцію мази драхму настоянки); эту же мазь можно натирать и цѣльную окружность язвы, членъ содержать въ теплѣ, увивая его суконнымъ бинтомъ. Отмороженіе съ помертвѣніемъ лѣчится, какъ послѣднее; обнаженные суставы пальцевъ отдѣляются ножомъ или ножницами самимъ врачомъ или свѣдущимъ фельдшеромъ. Однажды отмороженное мѣсто остается очень чувствительнымъ къ холоду; въ такомъ случаѣ не надобно тепло одѣваться, избѣгать скорого отогрѣванія озябшей части, обмывать ее почаще холодною водою или тереть льдомъ, либо снѣгомъ. Противъ застарѣлыхъ ознобленій помогаютъ *квасцы*. Ознобленныя части покрываются компрессомъ, смоченнымъ тепловатымъ растворомъ одного лота квасцовъ въ одной квартѣ воды. Это повторяется довольно часто въ теченіе дня.

## Ушибъ.

**Опрежденіе.** Ушибъ обнаруживается краснымъ, багровымъ, темноватымъ, синимъ и даже чернымъ цвѣтомъ кожи въ ушибенномъ мѣстѣ, различной величины опухолью ушибенныхъ частей, тупою ноющею болью, или и совершеннымъ безчувствіемъ въ ушибенномъ мѣстѣ, смотря по тому, въ какой степени бываетъ ушибъ.

**Раздѣленіе.** По этому ушибъ бываетъ 3-хъ степеней: 1) *Легкій*, удобно разрѣшающійся, не оставляя по себѣ никакихъ послѣдствій. 2) *Сильный* не разрѣшающійся и производящій воспаленіе и обширные нарывы, которые нагноеніемъ изнуряютъ больного; при этомъ ушибъ иногда происходитъ противо-ударъ, т. е. ушибъ въ точкѣ тѣла, противоположной мѣсту, на которое дѣйствовалъ ударъ; такъ при быстромъ паденіи на задницу, сильномъ прыжкѣ, происходитъ противоударъ — ушибъ въ спину, грудь, въ голову. Сильные ушибы въ голову, грудь, животъ, причиняютъ сотрясеніе мозга и безпамятство, кровохарганіе, разрывъ желудка и шиекъ, пузыря, печени, селезенки и даже мгновенную смерть, безъ всякихъ слѣдовъ поврежденія. 3) *Сильнѣйшій* ушибъ размокаетъ мягкія и твердыя части тѣла, превращаетъ ихъ въ безобразную массу (въ кашу), причиняетъ помертвѣніе, которое происходитъ или скоро послѣ ушиба, или медленно. Такіе ушибы наносятся мельничными камнями, тяжелыми телѣгами, обрушившимися строениями, большими упавшими деревьями, колодами и т. п.

**Причины.** Ушибъ происходитъ по двумъ причинамъ: 1) отъ паденія и 2) нанесенія, т. е. когда или мы сами стремительно падаемъ



на кабую либо плоскость, или когда въ насъ ударяеть съ силою что либо твердое, тупое. Въ особенности тѣло наше ушибается отъ различныхъ побоевъ, когда оно упадаетъ на землю при ходьбѣ, съ высоты, или когда на него падаютъ разныя тяжести, когда его части сжимаются, ущемляются, растягиваются,

**Распознаваніе** ушиба довольно *легко* по его причинѣ и признакамъ; иногда, однако, ушибенная кожа бываетъ черна и безчувственна и походить на помертвѣлую; но этой ошибкѣ можно избѣгнуть распросомъ больного и внимательнымъ разсмотрѣніемъ ушиба, въ ушибенномъ мѣстѣ не бываетъ ни боли, ни жара, кожа въ немъ темнѣе къ срединѣ и свѣтлѣе къ окружности, между тѣмъ какъ при помертвѣніи, въ помертвѣломъ мѣстѣ прежде бываетъ боль и жаръ и черный цвѣтъ замѣчается въ одинаковой степени какъ по срединѣ, такъ и въ окружности. Иногда рабочій народъ искусственно производитъ ушибъ, намазывая руку или ногу черною или желтою краскою и перетягивая ихъ бинтомъ подъ окрашеннымъ мѣстомъ, для произведенія опухоли, но такая опухоль ни чуть не походить на ушибенную; она скоро проходитъ по снятіи повязки, и краска легко смывается водою, льнянымъ масломъ, спиртомъ и проч.

**Предсказаніе** ушиба зависитъ отъ его дѣйствія на разныя части нашего тѣла, соотвѣтственно степени, такъ что: *легкій* ушибъ *неопасенъ* и скоро проходитъ самъ по себѣ или отъ употребленія простыхъ средствъ безъ всякихъ послѣдствій; *сильный* ушибъ *опасенъ*, особенно по его послѣдствіямъ, которыя бываютъ продолжительны и нерѣдко обанчиваются смертію; *сильнѣйшій* ушибъ большую частію *смертеленъ*. По различію мѣстъ и частей нашего тѣла дѣйствіе ушиба бываетъ различно. Кожа на мѣстахъ мягкихъ, на шеѣ, животѣ; задницѣ, бедрахъ, не такъ легко повреждается при ушибѣ, но за то подъ нею на такихъ мѣстахъ часто происходитъ разлитіе крови, кровяныя опухоли, которыя особенно скоро происходятъ при незначительномъ ушибѣ въкъ, мошонки. Легкій ушибъ кожи на головѣ, какъ то часто случается при паденіи маленькихъ дѣтей, причиняетъ кровяной волдырь, то мягкій, то твердый по своей окружности, или мягкій и зыбкій только по срединѣ, а твердый по краямъ; такіе волдыри разрѣшаются часто всасываніемъ излившейся крови, которая впрочемъ иногда причиняетъ нарывъ или требуетъ, чтобы разрѣзана была кожа. Сильный ушибъ въ голову можетъ причинить потрясеніе въ головѣ и воспаленіе мозга, излитіе крови въ черепъ, безпамятство, обмѣніе, судороги, потерю разсудка, зрѣнія, слуха, падучую болѣзнь, упорную головную боль и проч. Ушибъ шеи спереди, женскихъ грудей, мужскихъ яичекъ, оставляетъ послѣ себя зобъ, отвердѣніе грудей, яичекъ. Сильный ушибъ груди можетъ разорвать сердце, большіе кровяные сосуды, причинить кровохарканіе, воспаленіе легкихъ, одышку, водянку въ груди. Жестокій ушибъ брюха противъ ложечки можетъ причинить мгновенную смерть, безъ всякихъ слѣдовъ какого-либо по-

врежденія; гораздо чаще ушибъ въ животъ, особенно при полномъ желудкѣ, причиняетъ разрывъ желудка и кишекъ, мочевого пузыря, селезенки, печени, отчего происходитъ изліяніе крови въ брюхъ, кровавая рвота и поносъ, грыжа и проч. Ушибъ суставовъ оставляетъ послѣ себя ихъ негибкость, онѣмѣніе, сухотку руки, ноги и пр.

Исходы: въ *здоровье*, *болѣзни* и въ *смерть* видны изъ предъидущаго.

Лѣченіе діететическое въ сильныхъ и сильнѣйшихъ степеняхъ ушиба требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Больной долженъ *употреблять легкую и прохладительную пищу*, подобно какъ и въ воспаленіяхъ, а *въ питье воду съ кислымъ сокомъ* или *кремортартаромъ* (№ 178), также *отваръ ячменя, сыворотку*, подслащенную медомъ; 2) *Страждущую часть* или членъ, въ случаѣ и все тѣло, *содержать въ покоѣ* и неприкосновенности отъ всякаго движенія, тряски и раскачиванія.

Лѣченіе ушиба существенное имѣетъ цѣлью въ началѣ предотвратить воспаленіе и произвести всасываніе излившейся крови, а потомъ укрѣпить ушибенныя части. Оно бываетъ различно по степени ушиба: легкіе ушибы достаточно припаривать *теплымъ уксусомъ*, къ которому прибавлять понемногу водки, или рому, что случится, и держать постоянно компрессы, намоченные въ этой смѣси. Одна часть уксуса, полагаемая на 6 или на 8 частей настоя изъ *конскаго щавеля* и *зверобоя*, считается превосходною припаркою въ этомъ случаѣ. Этотъ способъ болѣе приличенъ, нежели тереть ушибенную часть водкою и другими спиртовыми жидкостями. Крестьяне въ нѣкоторыхъ губерніяхъ и уѣздахъ имѣютъ обыкновеніе прикладывать на свѣжіе ушибы *коровій навозъ* въ видѣ припарки (катаплазма), даже въ значительныхъ ушибахъ отъ паденія, толчковъ и т. п. Это средство дѣйствительно имѣетъ хорошее дѣйствіе. Чаше бываетъ у нихъ въ употребленіи отъ ушибовъ *скипидаръ*, которымъ намазываютъ ушибенную часть тѣла, или погружаютъ ее въ него, смотря по тому, какъ бываетъ удобнѣе, даже внутрь принимаютъ по столовой ложкѣ безъ вреда, если и внутри есть боль; замѣчательно, что скипидаръ не производитъ у нихъ раздраженія въ животѣ; ни боли, ни рѣзы оттого не бываетъ, а только наступаетъ послѣ него обильный потъ и обильное отдѣленіе мочи, рѣдко поносъ, и то легкій, внутреннія же боли отъ него затихаютъ, какъ и наружныя, и скоро совсѣмъ проходятъ \*). Сверхъ того легкіе ушибы кожи, при паденіи на полъ дѣтей, а также послѣ наказанія розгами, проходятъ отъ прикладыванія къ ушибенному мѣсту *холодныхъ металли-*

---

\*) Кроме того они обыкновенно натираютъ ушибы *виномъ* или *бодягою*. В. Далю случилось однажды видѣть, что мужикъ, оступившись больно, такъ что началъ прихрамывать, воротился на то мѣсто, гдѣ съ нимъ случилась бѣда, положилъ три поклона въ землю, приговаривая: «прости меня мѣсто свято!» и потомъ пошелъ далѣе въ полной увѣренности, что ему ногу отпустило.

*чекских пластинок* какой-либо монеты, оловянной или серебряной ложки, желѣзной задвижки, ножнаго лезвія, ключа, замка и т. п. Всѣ эти холодныя вещи нужно довольно плотно прижимать къ ушибу, котораго большую часть онѣ должны покрывать. Если отъ него ушибъ не разрѣшится, а ушибенное мѣсто опухаетъ, болитъ и начинаетъ даже горѣть, то употребляются примочки: холодная вода со льдомъ, снѣгомъ, съ уксусомъ, водкою или спиртомъ, растворъ въ водѣ мыла, нашатыря, съ селитрою, квасцами, поваренной соли, камфоры, полагаая на фунтъ воды  $\frac{1}{4}$  фунта уксуса, 3—4 ложки водки или спирта, 2 лота мыла, по лоту нашатыря и селитры или поваренной соли, лоть камфоры, распущенной прежде въ спиртѣ. Всѣ эти средства, въ различномъ смѣшеніи, употребляются въ видѣ холодныхъ примочекъ и продолжаются до тѣхъ поръ, пока не разрѣшится ушибъ, т. е. въ теченіе 3—7 дней. Если въ ушибѣ замѣчается излітіе крови подъ кожею (кровяной волдырь), опухоль, боль, жаръ, то къ окружности приставляется нѣсколько *пѣвицъ* или *рожковъ*, что бываетъ иногда нужно и повторить, даже нѣсколько разъ. Пѣвицы бываютъ полезны и необходимы и при легкомъ ушибѣ глаза, околоушныхъ желѣзъ, шеи, женскихъ грудей, яичекъ или одной мошонки, далѣе ихъ нужно припускать при всякомъ появленіи въ ушибенномъ мѣстѣ боли, жара и опухоли. Кромѣ того очень одобряють *припарку*, состоящую изъ *отрубей* и бѣлаго уксуса. Для приготовления ея должно кипятить полчаса эту смѣсь въ закрытомъ сосудѣ, потомъ остудить и намазать на холстъ. При употребленіи этой припарки появляются прыщи, переходящіе въ пѣязвленіе, но скоро заживающіе \*).

Это лѣченіе нужно продолжать и въ послѣдствіяхъ ушиба по прошествіи 1—2 недѣль; но упомянутыя средства лучше употреблять теплыми. Кромѣ того въ послѣдствіяхъ сильнаго ушиба бываютъ полезны *теплые отвары* изъ *полыни*, *розмарина*, *руты*, *богородской* и *бараньей травы*, смѣшанные съ уксусомъ, камфорнымъ, миндереровымъ спиртомъ, *летучая камфорная мазь*, *теплая моча*, *травяные ароматные мѣшечки*, *увиванге члена* суконнымъ бинтомъ.

Въ жестокихъ ушибахъ и сотрясеніяхъ головы, мозга, груди или брюха, нужно бываетъ *кровопусканіе*, даже повторительное, *холодныхъ примочки* въ большомъ видѣ, внутреннее употребленіе *селитры* (№№ 86 и 87), *наливки* изъ *бараньей травы* съ *нашатыремъ*, *слабительныя* (№№ 97, 98, 99, 100, 128 и 129). Въ такихъ ушибахъ, равно какъ и въ тѣхъ, которые соединены съ разможеніемъ рукъ, ногъ, съ обширнымъ подкожнымъ разлитіемъ крови, непременно надобно прибѣгнуть къ совѣту врача, иначе ушибенный умретъ отъ воспаленія, можетъ потерять употребленіе члена или получить неизлѣчимую болѣзнь.

Ушибы сухихъ жилъ на рукахъ и ногахъ, суставовъ, костей и

\*) Др. Здр. 1843 г. № 23. стр. 183.

тупое чувство въ ушибенномъ мѣстѣ, требуютъ продолжительнаго употребленія пронизательныхъ спиртовъ — *муравейнаго, розмариннаго, пихатиннаго, лаванднаго, гофманскихъ капель, персичной и шпанискыхъ мушекъ настойки, скипидара* и электризованія.

Съ излѣченіемъ ухаба проходятъ и изліянія крови подъ кожею и кровяные волдыри: раздавленные сосудцы укрѣпляются, заростають, разлившаяся кровь всасывается. Такому обончанію волдырей много способствуютъ травяные, ароматные мѣшечки. Но если мягкій волдырь не расходитя, въ немъ замѣчается зыбленіе, когда онъ находится на безопасномъ мѣстѣ на лбу, тѣмени, затылкѣ, спинѣ, груди и пр., лежитъ сейчасъ подъ кожею, то его *вскрываютъ* (прорѣзываютъ) *ланцетомъ*, производя имъ небольшой разрѣзъ въ кожѣ, до излившейся крови, выжимая кровь и обмывая раночку *наливкою* изъ *ромашки, мяты* и *сжимая* умѣренно *волдырь бинтомъ*; но волдыри глубокіе, обширные, около глаза, на шеѣ и вообще вблизи кровяныхъ сосудовъ — спереди на ногахъ и рукахъ, требуютъ иногда глубокихъ и длинныхъ разрѣзовъ кожи, которые можетъ произвести только врачъ.

## Цыпки.

**О п р е д ѣ л е н і е.** Цыпки обнаруживаются истрескиваніемъ поверхности кожи на ногахъ и рукахъ, преимущественно съ тыльной стороны, сопровождаемымъ зудомъ, саднящею болью, огрубѣlostію и красноватостію кожи.

**П р и ч и н ы.** Мокрота и сухость, холодъ и жаръ, быстро (безъ всякой постепенности) смѣняемые одно другимъ. Такъ въ весеннее время у крестьянскихъ дѣтей, даже и у взрослыхъ, ходящихъ босикомъ по сырой землѣ въ жаркіе дни, бывають цыпки на ногахъ, а иногда и на рукахъ, если часто мочать ихъ при непосредственномъ вліяніи на нихъ солнечнаго жара или огня. Но бывають цыпки и въ другія времена года, даже зимою, на рукахъ, особенно у тѣхъ, кто бываетъ подверженъ перемѣнамъ стужи и тепла, кто погружаетъ часто руки то въ холодную, то въ теплую воду, какъ напр. повара, стиральщицы, прачки и т. п.; случаются, хотя рѣже, и у тѣхъ, кто зимою умываетъ себѣ руки теплою водою.

**Л ѣ ч е н і е** предохранительное, состоящее въ удаленіи причинъ болѣзни, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) Въ предупрежденіе этой болѣзни *крестьяне*, особенно *ихъ дѣти*, должны быть обуты, когда выходятъ изъ домовъ своихъ, преимущественно въ *весеннее время*. 2) Они должны *одинаково беречь себя*, какъ *отъ* сильной стужи, такъ *и внезапнаго жара*, и въ другія времена года. Когда у кого озябнуть руки или ноги, то онъ не долженъ держать и грѣть ихъ тотчасъ у огня, а имѣть въ движеніи и тереть ихъ самъ или при посредствѣ другаго кого либо изъ близкихъ ему людей. 3) *Кухарки* и всѣ женщины, занимающіяся стиральною, равно *повара* и *прачки*, должны

остерегаться мочить руки непрерывно то холодною, то теплою водою; въ неизбежныхъ же случаяхъ имъ надобно намазывать чаще руки свинымъ, коровьимъ масломъ, бараньимъ, свинымъ саломъ и другими жирно-масляными веществами. 4) Страждущіе цыпками на ногахъ или рукахъ должны, вымывъ большія части хорошенько теплою водою съ виномъ, уксуомъ и мыломъ, надѣвать на ноги шерстяныя чулки, а на руки такіе же варежки и содержать ихъ въ теплѣ и сухо. Многие съ большою пользою кладутъ на цыпки теплую золу, завернутую въ ветошку, такъ что не рѣдко излѣчиваютъ ихъ этимъ средствомъ.

Лѣченіе существенно состоитъ въ уменьшеніи раздраженія, воспаленія въ цыпкахъ и защищеніи ихъ отъ воздуха; для этого полезно напередъ дать *слабительное* изъ *огуречнаго разсола съ медомъ* (№№ 7, 128), либо изъ *кваса* (№ 129), или изъ *толокна* (№ 72) и намазывать цыпки ежедневно по два и болѣе раза *деревянныимъ масломъ, свинымъ, ветчиннымъ саломъ*. Но если сдѣлаются на нихъ нарывы, то прикладывать къ нимъ на ветошкѣ *спускъ* (№ 29) а въ случаѣ, если это средство окажется безуспѣшнымъ, то *мягчительную мазь*, состоящую изъ *свѣчнаго сала и крупчатой муки* (№ 149), либо изъ сала съ *мыломъ* (№ 180) и *мягчительную примарку* изъ *зальчей кожи, кудели, разваренныхъ въ молоко* (№ 157).

## РОСПИСАНІЕ

### ПОСЕЛЯКЪ ПО ИХЪ БЫТУ И ЗВАНІЮ.

**Атлеты или бойцы.** Трудныя упражненія въ бояхъ, особенно вскорѣ послѣ сытнаго и обильнаго обѣда, равно какъ и вскорѣ послѣ отдыха, бывають причиною, что они подвергаются: *удару* (апоплексія), *болѣзни сердца, удушающему катарру, разрыву кровеносныхъ сосудовъ* и нерѣдко *внезапной смерти*.

Въ предохраненіе ихъ отъ такихъ опасныхъ болѣзней, должно имъ совѣтовать не выходить на бой послѣ сытнаго, обильнаго обѣда и руководствоваться правиломъ Иппократа, который говоритъ, что опаснѣе приниматься за занятія послѣ отдыха, нежели послѣ занятій предаваться отдыху.

Лѣчатъ ихъ отъ этихъ болѣзней преимущественно *кровопусканіемъ*, потомъ *слабительными* и строгою *діетой*, во все время продолженія болѣзни.

**Бабки повивальныя (повитухи).** 1) Усталость и бессонница во время родовъ и послѣ нихъ подвергаетъ ихъ совершенному *изнуренію*.

2) Послѣ-родовое очищеніе, бывающее перѣдбо очень зловоннымъ, производитъ у нихъ *тошноту и головную боль*. 3) Рукодѣйствіе, состоящее въ изслѣдованіи женскихъ половыхъ частей, одержимыхъ иногда прилипчивыми болѣзнями, подвергаетъ ихъ *язвамъ сифилитическаго и раковиднаго свойства*.

1) Въ предупрежденіе послѣдствій отъ усталости и бессонницы бабки должны соблюдать прохлаждающую діету, чаще бывать въ банѣ, мѣнять бѣлье и вообще содержать себя опрятно. 2) Въ предотвращеніе послѣдствій отъ зловоннаго ощущенія чаще освѣжаться умываніемъ лица холодною водою и выходомъ на свѣжій воздухъ. 3) Въ предотвращеніе прилипчивыхъ болѣзней, пальцы рукъ передъ введеніемъ ихъ въ половыя женскія части надобно обмочить деревяннымъ масломъ, или смазать какою либо жирною мазью, причемъ, если пальцы одной руки ссаднены или изъязвлены, то надобно вводить пальцы другой руки. Послѣ скорѣе обмыть руки водою съ мыломъ или уксусомъ.

**Виноградари, пивовары и переливщики острыхъ хмѣльныхъ напитковъ.** 1) Большое количество спиртныхъ испареній, отдѣляющихся при безпрестанномъ переливаніи винограднаго вина, пива, сидра, водки и спирта изъ одного сосуда въ другой подвергаетъ ихъ *охлажденію, дурнотѣ, усталости, одуренію, въ послѣдствіи головокруженію, потерю аппетита*. 2) Господствующій паръ, отдѣляющійся изъ чановъ, гдѣ квасится виноградъ, въ пивоварняхъ, погребахъ, гдѣ много винограднаго вина, представляющій поверхъ чановъ довольно густое облако, и кадъ, въ которой виноградари толкутъ виноградъ, подвергаетъ ихъ *онемѣнію рукъ и ногъ, сжатію груди и горла, оглушенію, словомъ, смертоподобію и самой смерти*.

1) Въ отвращеніе этихъ болѣзней совѣтовать означеннымъ работникамъ не пить вина и водки, по крайней мѣрѣ во время работы; оставлять по временамъ занятія и выходить на чистый воздухъ. Отъ пьянства, которому предаются эти работники, предлагать употреблять капусту, горькій миндаль, кофе и воду, разведенную уксусомъ; но спокойствіе и сонъ предпочтительнѣе этихъ средствъ. 2) Смертоподобнаго надо, какъ можно скорѣе, вынести и положить на чистый воздухъ; обливать ему лицо свѣжею водою и уксусомъ и слегка тереть грудь. Если дыханіе не возстановляется, то надо вдохнуть воздухъ въ легкія посредствомъ трубочки въ носъ и въ ротъ, либо съ помощью маленькихъ мѣховъ. Кромѣ того полезны: *промывательныя, слабительныя и приложеніе горчичниковъ* и сухихъ *кровососныхъ банокъ* на различныя части тѣла. Въ предотвращеніе смертоподобія не должно имѣть много кадей въ одномъ и томъ же погребѣ такъ, чтобы онѣ не касались накатинъ, какъ это бываетъ въ деревняхъ, и отчего пары наполняютъ всѣ промежутки. Надо, чтобы двери и окна были одни противъ другихъ, чтобы паръ (газъ) могъ выходить въ нихъ; работники всегда должны стоять со стороны кадей и наклоняться въ нихъ головою какъ можно

менше. Никогда не должно одному ходить въ погреба, которые худо провѣтриваются.

**Водоносы.** Въ слѣдствіе смачиванія себя водою при пошеніи ея плечомъ въ ведрахъ на коромыслѣ, уменьшающаго и задерживающаго испарину, водоносы бываютъ подвержены *ревматизму, груднымъ припадкамъ, колику, водяной болѣзни и мозольной жесткости плечъ*. Они должны одѣваться въ сухое платье; треніе всего тѣла сухою фланелью очень способствуетъ восстановленію испарины и гораздо лучше, нежели теплое питье, которое очень расслабляетъ желудокъ. Самое привычное для нихъ питье изъ воды съ хлѣбнымъ виномъ (4 столовыя ложки водки на штофъ воды). Подъ коромысла на плечо подкладываютъ подушку, набитую конскимъ волосомъ

**Волосяники** (торгующіе волосомъ). Работники, разнимая свернутый волосъ и выколачивая его, поражаются *злокачественными вередями и карбункулами*.

Необходимо обращать вниманіе на вещества, привозимыя изъ странъ, гдѣ находятся повѣтренныя (міазматическія) болѣзни. Подозрительные въ такомъ случаѣ товары надобно оставлять на открытомъ воздухѣ для провѣтриванія и окуривать ихъ парами минеральныхъ кислотъ, особенно соляной; работники же, занимающіеся разниманіемъ и выколачиваніемъ этихъ товаровъ, должны мыть себѣ лицо и руки водою съ уксусомъ.

**Живодеры и сыромятники.** Непосредственное соприкосновеніе съ убитыми или падшими животными, ихъ внутренностями, костями и мясомъ, пришедшими въ гніеніе въ вонючемъ воздухѣ, подвергаетъ живодеровъ *чирьямъ, огневикамъ, злокачественнымъ прыщамъ, портямъ рукъ*, сопровождающимся у нихъ ужасными припадками. Сыромятники же, будучи блѣдны, трупны, синеваты: 1) отъ отдѣленія изъ мастерскихъ заводовъ до того заразительныхъ паровъ, особенно лѣтомъ, что лошади не охотно приближаются къ этимъ мѣстамъ, подвергаются *удушью, отвердѣнію селезенки и водяной болѣзни*; 2) отъ сырости и изменности мѣстъ, частаго обмагиванія ногъ и рукъ въ воду, бываютъ подвержены *ревматизму*.

Живодеры и сыромятники въ предохраненіе себя отъ злокачественныхъ сыпей должны послѣ своей работы мыть себѣ руки и лицо мыльною водою или разведеннымъ уксусомъ. Въ случаѣ болѣзни работниковъ, занимающихся выдѣлкою кожи, не должно совѣтовать пускать имъ слишкомъ много крови. Прохладительныя питья и потогонительныя лѣкарства, треніе тѣла суконкой, фланелью, составляютъ средства, для нихъ самыя употребительныя. Злокачественныя сыпи, которыхъ имъ надо бояться, состоятъ въ антоноогненномъ воспаленіи (пущырекъ, потомъ твердая, глубокая, обширная опухоль и гнилая горячка). Для удержанія распространенія этой болѣзни врачи немедленно прижигаютъ воспаленное мѣсто, даютъ внутрь хину, горькія и сердцегрѣпительныя средства.

**Жнецы и косцы.** Сильный жаръ, особенно когда солнце печеть имъ на открытую голову, и сильный свѣтъ до того вредно дѣйствуютъ на нихъ, что они страждутъ обыкновенно: 1) *горячками* и *лихорадками*; 2) *внутреннимъ головнымъ воспаленіемъ* и 3) *глазовоспаленіемъ*.

Жнецы и косцы 1) должны оставлять работу въ тѣ часы дня, когда сильно печеть солнце; не работать съ открытою головою; не пить холоднаго питья, когда они въ поту, и не ложиться на холодную сырую землю; не слишкомъ скоро переходить отъ холода къ теплу и особенно отъ тепла къ холоду: отъ этого дѣлается колика, кровавый поносъ и другія болѣзни. 2) Обыкновенное питье ихъ должна быть вода, которая дѣлается вредною, если имѣетъ вкусъ дерева, травы, болота. Для отнятія этого вкуса у воды въ крайнемъ случаѣ надо процѣживать её сквозь угольный порошокъ, или наливать въ деревянное внутри выжженное ведро. Чтобы очищенная такимъ образомъ вода была свѣжа и здорова, надо прибавить къ ней небольшое количество уксуса или водки или то и другое вмѣстѣ. 3) Пищу они должны употреблять питательную, всего лучше мясную, если бы жнецы могли имѣть её, но къ несчастію они должны довольствоваться во время своей работы хлѣбомъ съ квасомъ или даже съ водою.

**Земледѣльцы.** 1) Большею частію неудобства жилищъ, особенно курныя избы съ низкою дверью, служатъ зародышемъ гибельныхъ болѣзней, уничтожающихся только со смертію послѣдняго члена семейства; 2) полевая работа, положеніе странъ и свойство годовыхъ временъ; 3) успія при работахъ и поднятіе тяжестей; 4) безпечность о своихъ домахъ, дурной обычай складывать навозъ предъ хлѣвомъ и даже предъ самымъ домомъ и содержаніе зимою скота въ избахъ; 5) жилища на низменныхъ, сырыхъ, болотистыхъ мѣстахъ, вблизи прудовъ и 6) грубая, мучнистая пища, подвергаютъ земледѣльцевъ разнымъ болѣзнямъ, какъ то: 1) *Повальная болѣзнь* въ бѣдныхъ деревняхъ опустошаютъ людей. 2) Зимой и въ началѣ весны: *воспаленіе легкиихъ, катарръ и жаба, куричья слѣпота*; лѣтомъ, особенно въ іюнѣ и іюлѣ, *воспалительная горячка*; осенью, *кровавые поносы*; у женщинъ отъ вытаскиванія пачекъ пеньки и льна изъ воды острья болѣзнь, *ревматизмъ, колика, воспаленіе подреберной плевы*; 3) *грыжа*; 4) *удушье*; 5) *лихорадка* и 6) *воспаленіе кишекъ*.

О лѣченіи земледѣльцевъ должно замѣтить, во первыхъ, что при воспаленіи подреберной плевы и легкиихъ не должно пускать крови такъ много, какъ пускаютъ горожанамъ; иначе организмъ земледѣльца, истощенный трудами, легко ослабѣваетъ. Также, если кровь пускается большою струею, то силы земледѣльца упадутъ, такъ что онъ не въ состояніи перенести болѣзнь, хотя бы это даже было зимою, когда кровь у земледѣльцевъ обыкновенно бываетъ гуще, чѣмъ лѣтомъ и осенью. Замѣчено, что слуги, имѣющіе крѣпкое тѣлосложеніе и хорошее здоровье, болѣе поражаются слабительными и кровопусканіемъ, нежели ихъ господа, которые гораздо слабѣе и нѣжнѣе. Имѣя въ виду основа-



ниемъ болѣзней земледѣльцевъ слабость и истощеніе силъ работою при недостаточной, болышею частію, пищѣ, не удивительно, что многіе изъ нихъ выздоравливаютъ отъ острыхъ болѣзней тѣмъ, что ѣдятъ болѣе обыкновеннаго; равнымъ образомъ не удивительно и то, что отъ этой же причины они скорѣе умираютъ, потому что это не всегда можно. Когда крестьянинъ боленъ, то не смотря на крайнюю его бѣдность родные его и друзья толпами приходятъ навѣщать его и приносятъ ему яйца, цыплятъ и другія кушанья, отъ которыхъ онъ или выздоравливаетъ, или скорѣе умираетъ. Выздоровѣвшій крестьянинъ вступаетъ на прежнюю стезю жизни, ѣстъ лукъ, чеснокъ, пріятную для него пищу, которая служитъ ему вмѣсто лѣкарства. Многіе излѣчиваются въ зимнее время отъ трехдневной лихорадки *лукомъ, чеснокомъ и водкою*. Въ холодныхъ странахъ сѣверной части Россіи эти средства особенно бываютъ полезны земледѣльцамъ и помогаютъ имъ даже отъ колики. Перевязавъ себѣ крѣпко животъ, потомъ наѣвшись лука, они продолжаютъ работу цѣлый день и избавляются такимъ образомъ отъ недуга. Въ другихъ мѣстахъ крестьяне иначе излѣчиваются отъ колики. Они берутъ измельченные *листья трилистника*, дѣлаютъ *припарку* вмѣстѣ съ *яичнымъ желткомъ* и прикладываютъ ее *на животъ*. *Рвотное* даже иногда для земледѣльца сноснѣе, чѣмъ кровопусканіе и слабительное. *Кровососныя банки* (рожки) дѣлаютъ чудеса при продолжительной лихорадкѣ, чему много содѣйствуетъ увѣренность крестьянъ въ ихъ пользѣ. Лѣченіе потогонными лѣкарствами также полезно для нихъ.

Вообще отъ лихорадки имъ нужна діета, или по крайней мѣрѣ уменьшеніе количества пищи; они должны пить воду съ медомъ, не париться подъ одѣялами, не открывать оконъ въ избѣ, избѣгать посѣщенія родныхъ, которые дыханіемъ своимъ еще болѣе портятъ воздухъ. Къ знахарямъ, заговорщикамъ, совѣтовать не обращаться и не принимать ихъ предложеній: это одно шарлатанство.

**Игольщики.** 1) Незамѣтно отскакивающія частицы точильнаго камня и стали, если онѣ попадаютъ въ глаза работникамъ, могутъ причинить *жестокую боль и воспаленіе глазъ* и даже *потерю зрѣнія*. 2) Если есть незамѣтныя трещины въ точильномъ камнѣ, то онъ можетъ переломиться и причинить рабочему *смерть*.

Въ первомъ случаѣ очки могутъ предохранить отъ вреднаго вліянія частицъ камня и стали; а для предохраненія отъ опасности въ послѣднемъ случаѣ, должно укрѣплять колесо въ желѣзномъ ящикѣ, такъ чтобы видна была только та часть колеса, на которой точатся иглы.

**Кирпичники, горшечники и изразчики** (дѣлатели кирпича, горшковъ, изразцовъ и т. п.) Работая цѣлый день изъ глины кирпичъ, горшки, изразцы и т. п., суша ихъ на соломѣ и обжигая въ печахъ, по причинѣ печнаго жара, непогоды и дурной пищи, они бываютъ подвержены злокачественнымъ и четырехдневнымъ перемежающимся *лихорадкамъ, воспаленіямъ, сухоткѣ и водянкѣ*.

Крайне вредно пускать этимъ людямъ кровь и давать слабительныя лѣкарства: силы ихъ и безъ того изцурены отъ занятій. Для смягченія кожи и возбужденія пепарины кирничники должны ходить чаще въ баню, что полезно для нихъ даже въ здоровомъ состояніи.

**Кожевники** (очищающіе и гладящіе кожи послѣ дубленія). 1) Противный, тяжелый запахъ отъ кожи, жира и масла, употребляемыхъ при этой работѣ, подвергаетъ кожевниковъ *тошнотѣ и головной боли*. 2) Успіе, употребляемое ими для придачи кожѣ гладкости и лоска, при сильномъ треніи кожи деревянною скалкой, которую они проводятъ правою рукою съ большимъ движеніемъ, бываетъ причиною, что они подвергаются: *кровохарканію, болѣзни сердца, трудному дыханію и безобразію грудной клятми*.

Кожевникамъ должно совѣтовать употребленіе въ пищу и питье кислаго, пребываніе на чистомъ воздухѣ и соблюденіе умѣренности въ занятіяхъ.

**Колесники, обручники, стронтели судовъ, рѣзчики, дѣлатели рамъ для картинъ** (рамщики). Утомительное занятіе въ работѣ стоймя подвергаетъ ихъ *опуханію венъ и язвамъ на ногахъ*.

Этимъ людямъ надо, для предохраненія себя отъ болѣзни, работать не слишкомъ долго, но съ отдыхомъ, чтобы силы ихъ могли возстановляться; для нихъ полезно треніе ногъ деревяннымъ масломъ. Въ случаѣ, когда откроются у нихъ острыя болѣзни, надобно помнить, что эти люди истощены уже работою, и что по этому надо съ благоразуміемъ давать имъ лѣкарства.

**Кормилицы** (женщины, питающія своею грудью своихъ дѣтей и чужихъ). 1) Частое и продолжительное кормленіе грудью (болѣе 9-ти мѣсяцевъ и даже года) подвергаетъ кормилицъ *слабости общей и зрѣнія, истерикъ, одышкѣ, головокруженію, бѣлямъ, сухоткѣ, чахоткѣ*. 2) Ношеніе дѣтей, одержимыхъ сыпью, и излишнее употребленіе пищи и питья, съ цѣлью умножить молоко, подвергаетъ ихъ *чесоткѣ, лишаямъ, зуду* по всему тѣлу, *нарывамъ и изъязвленіямъ* сосковъ. 3) Излишество молока въ грудяхъ, при слабомъ сосаніи ребенкомъ груди, производитъ *боль въ спинѣ съ лихорадкою и воспаленіе сосковъ*. 4) Бѣднѣе и частое прерываніе сна бываетъ причиною, что кормилицы подвергаются засореніямъ брюшныхъ внутренностей.

Въ предохраненіе отъ этихъ вредныхъ послѣдствій, кормленіе грудью достаточно 9-ть мѣсяцевъ, соответственно сроку утробноматеринскаго пребыванія младенца. При ношеніи дѣтей, страдающихъ сыпью нужна осторожность, опрятность и постоянная чистота тѣла, дѣтей же съ сыпью чаще сажать въ теплыя ванночки съ отрубями, отъ которыхъ сыпь у нихъ скоро проходитъ. Молоко въ грудяхъ не должно умножать излишествомъ пищи и питья, а при излишествѣ молока въ грудяхъ нужно ихъ побрывать спускомъ, но не надолго, минутъ на 5 и на 10 смотря по надобности; возбраненіе же засореній въ брюшныхъ внутрен-

постяхъ совѣтовать имъ животъ свой чаще растирать суконкою, ва-  
ришкою, а въ банѣ намыленною мочалкою.

**Кузнецы, слесари, каменщики, печники, хлѣбники, маляры, ще-  
катуры, обойники, оснащики машинъ, также пильщики.** По причинѣ  
производства работъ своихъ стоймя (стояніе на ногахъ, хотя бы оно про-  
должалось менѣе, нежели ходьба или бѣганье, утомляетъ болѣе, потому  
что при стояніи на ногахъ, дѣйствуютъ одиѣ разгибающія мышцы, а  
сгибающія остаются въ покоѣ) подвергаются: *опухольи венъ и язвѣмъ  
на ногахъ, слабости въ членососудиніяхъ, боли въ почкахъ, крова-  
вому мочетеченію, слабости желудка, и грыжѣ.*

Должно совѣтовать мастеровымъ, работающимъ стоймя, чтобы они  
не всегда держались въ этомъ положеніи, но садилась, прохаживались  
или дѣлали какое либо иное тѣлодвиженіе, даже лучше постоять на одной  
ногѣ, пока другая отдыхаетъ, тѣмъ болѣе, что меньше устаешь, перемъ-  
щая тѣло то на ту, то на другую ногу. Самыя животныя подтверждаютъ  
это. Иногда цыплята стоятъ на одной ногѣ и приподнимаютъ другую.  
Гуси дѣлаютъ тоже. Между четвероногими ослы останавливаются и под-  
нимаютъ одну изъ заднихъ ногъ. Для работающихъ стоя полезны лѣкар-  
ства, восстанавлиющія силу членовъ, именно: треніе тѣла, припарки и  
баня. При грыжѣ эти мастеровые должны носить бандажъ; для отвраще-  
нія или для лѣченія узловъ на ногахъ, должно стягивать послѣднія шти-  
блетами; язвы же на ногахъ надо лѣчить обмываніемъ: это содѣйствуетъ  
заживленію язвъ и не препятствуетъ продолжать работу, доставляющую  
большой части мастеровыхъ дневное пропитаніе.

**Кухарки (стряпки) и повара.** 1) Исправляя свое дѣло стоймя, стра-  
даютъ *опухольями жилъ и язвѣми на ногахъ.* 2) Угольные пары и уду-  
шающій жаръ кухни въ лѣтнее время производить у нихъ: *головную  
боль* (почти привычныя), *усталость, приливъ крови къ головѣ, распо-  
ложеніе къ удару* и самый *ударъ.* 3) При загребаніи угольевъ, или вы-  
ниманіи руками кусковъ мяса или рыбы изъ горячаго котла, они *об-  
жигаются, обвариваются,* имѣютъ *лишай* и *зудъ* по тѣлу. 4) Отъ  
кухонной мѣдной посуды, подверженной окисленію, получаютъ: *ко-  
лику, тошноту, рвоту* и *припадки отравленія,* потому что они пре-  
жде другихъ отвѣдываютъ кушанье и дѣлаются первою жертвою ихъ не-  
бреженія.

1) Имъ должно носить на ногахъ болѣе узкіе, чѣмъ широкіе, чулки  
въ башмакахъ или котлахъ съ подвязками поверхъ чулокъ или штибле-  
ты. 2) Чаще давать слабительное, которое помогаетъ и отъ головной  
боли, и сберегаетъ тонкость ихъ вкуса, также совѣтовать имъ выхо-  
дить, хоть на короткое время, но почаще на свѣжій воздухъ. 3) Не брать  
горячихъ угольевъ голыми руками, но желѣзными щипчиками, а куски  
мяса или рыбы вынимать вилкою. 4) Посуда кухонная, особенно мѣд-  
ная, должна быть содержима въ чистотѣ, кромѣ того никакое кушанье  
не должно оставаться долго въ мѣдной посудѣ, которую надо часто лу-  
дить, либо употреблять вмѣсто мѣдной глиняную муравленую.

**Красильщики.** По причинѣ работы въ жаркой сырой атмосферѣ съ густымъ паромъ и мочки матерій въ водѣ они подвергаются: *лихорадкамъ, удушью и грудной водяной болѣзни.*

Имъ должно, какъ можно менѣе, наклоняться къ котлу, откуда выходят пары, и по временамъ выходить на воздухъ, а зимою одѣваться теплѣе. Окна въ красильняхъ должно дѣлать съ форточками, которыя почаще открывать для выпущенія пара и впуска свѣжаго воздуха. Въ предохраненіе себя отъ сырости они должны одѣваться въ сухое платье и тереть тѣло сухою фланелью.

**Крахмальщики.** 1) Отъ сильнаго остраго запаха, отдѣляющагося изъ закишей смѣси, они страдаютъ сильною *головною болѣзью* и *удушливымъ кашлемъ.* 2) Отъ неопрятности и невоздержности страдаютъ злокачественными *лихорадками.* 3) Отъ пыли во время измельченія крахмала, также какъ и отъ муки, подвергаются тѣмъ же болѣзнямъ, которыми страдаютъ хлѣбники по этой же самой причинѣ.

Приготовленіе крахмала должно дѣлаться въ помѣщеніи пространномъ и хорошо провѣтриваемомъ. Въ случаѣ болѣзни работниковъ, занимающихся приготовленіемъ крахмала, надо давать имъ *сладко-миндальное масло, эмульсію изъ дынныхъ стѣмянъ, ячмыи отваръ* и т. п.

Въ отвращеніе паровъ, отдѣляющихся изъ закишей смѣси, полезно вливать въ послѣднюю нашатырный спиртъ.

**Ломщики судовъ.** Въ слѣдствіе постоянного пребыванія въ водѣ, по причинѣ мокроты онѣ подвергаются всѣмъ, происходящимъ отъ нея *болѣзнямъ простуднымъ;* кромѣ того у нихъ часто дѣлаются *ссадины на ногахъ,* переходящія въ неизлѣчимыя *язвы.* Ломщики судовъ (барокъ и др.) должны для защищенія себя отъ простуды носить высокіе сапоги, сдѣланные изъ плотной хорошо дубленой кожи, изрѣдка пить хлѣбное вино и по окончаніи работы перемѣнять платье.

**Могильщики** (жревіи которыхъ самый печальный; лицо ихъ обыкновенно блѣдно, взглядъ мрачный, и ни одинъ изъ нихъ не достигаетъ старости). Нерѣдко случается, что при выкапываніи могилы работники подвергаются внезапной *смерти.*

Могильщики должны быть осторожны при выкапываніи ямъ и не повреждать труповъ, не совсѣмъ согнившихъ, иначе имъ предстоитъ неминуемая смерть. Въ случаѣ же вырытія погребеннаго тѣла, для перенесенія его на другое мѣсто, или для судебного освидѣтельствованія, надлежитъ оставлять яму открытою, по крайней мѣрѣ на трое сутокъ, и даже очистить еѣ парами соляной и сѣрной кислотъ и марганца и уже послѣ того вновь зарывать туда вынутое тѣло. Не лишнее тоже, если могильщики будутъ соблюдать опрятность и чаще мыть тѣло, лицо и руки разведеннымъ уксусомъ. Кромѣ этого можно совѣтовать имъ носить при себѣ стѣляночку съ нашатырною солью или спиртомъ и нюхать эти вещества. По окончаніи работы они должны надѣвать чистое бѣлье и платье. Касательно лѣченія этихъ людей должно замѣтить, что въ случаѣ болѣзни не надо *пускать* имъ *кровь,* по причинѣ предраспо-

ложенія ихъ къ слабости, или по крайней мѣрѣ дѣлать это съ большою осторожностію. Вообще для нихъ болѣе приличны *слабительныя лекарства*, нежели кровопусканіе.

**Мыловары** (занимающіеся приготовленіемъ мыла). По причинѣ необходимости выходить по временамъ изъ мастерской на свѣжій воздухъ во время томительной денной и ночной работы въ сильномъ жару, они поражаются *горячками* и *колотьемъ*. Во избѣжаніе этого совѣтуютъ имъ, выходя съ своей работы изъ жаркой мастерской, покрываться, чтобы потъ не скрывался. Большею частію замѣчено, что острия частицы испаренія при мыловареніи имъ не вредятъ; они здоровы, крѣпки, имѣютъ хорошей цвѣтъ лица.

**Мельники.** 1) Живя въ атмосферѣ, наполненной мучною пылью, которую они поглощаютъ, мельники страдаютъ *удушьемъ* и *водянкою*. 2) Поднимая и таская на себѣ мѣшки съ мукою, они подвергаются *грыжѣ*. 3) Отъ шума мельничныхъ колесъ и жернововъ поражаются *глухотого*. 4) Отъ холодныхъ и сырыхъ жилищъ на водѣ бываютъ подвержены: *ревматизмамъ* и *хроническому страданію грудныхъ органовъ*. 5) Отъ неопрятности или отъ смѣшенія муки съ жиромъ кожи подвергаются *вшивости*.

Мельникамъ должно соблюдать тѣ же предосторожности, какія предписываются хлѣбникамъ, потому что болѣзни ихъ происходятъ также отъ муки, которая, носясь въ видѣ пыли, проникаетъ въ дыхательные органы. Мельники должны покрывать лицо кисеею, сложенною въ нѣсколько разъ. Въ случаѣ грыжи, мельнику должно постоянно носить грыжевую повязку, которая можетъ служить даже въ предотвращеніе этого поврежденія. Для уменьшенія неприятнаго впечатлѣнія, производимаго шумомъ колесъ, мельники должны затыкать себѣ уши хлопчатого бумагой; отъ сырости имъ должно одѣваться потеплѣе. Что касается до вшивости, встрѣчающейся теперь уже рѣже, то для ея лѣченія всего лучше бани и смѣна бѣлья. Если же этотъ припадокъ будетъ упоренъ, то надобно совѣтовать умываться наливкою полыни, алтейнаго корня и даже дѣлать втиранія ртутною мазью.

**Мясники.** 1) Будучи здоровы, полны, свѣжи, румяны, по причинѣ изобилія въ нихъ соковъ, они подвержены: *тяжести головы*, *одышкѣ*, *кровотеченію* и *апоплексіи*. 2) Лѣтомъ, когда жаръ ускоряетъ гніеніе мяса, по причинѣ вонючихъ испареній, распространяющихся въ бойнѣ и безпрестанно поражающихъ легкія, у мясниковъ дѣлаются *огневики* (гарбунгулы), *злонакачественныя сыпи* и *гнилыя горячки*. 3) Сильное напряженіе мышцъ, необходимое иногда для поднятія цѣлаго животнаго, или значительной его части, часто причиняетъ *грыжу*, *аневризмы* и даже *разрывъ* самыхъ мышцъ. 4) Ножемъ, которымъ они рѣжутъ мяса, верѣдко случается, что подвергаются *значительнымъ пораненіямъ*.

1) Кровопусканіе, дѣлаемое по временамъ, соблюденіе діеты или по крайней мѣрѣ умѣренность въ пищѣ, разводящее питье (вода, сыворотка) составляютъ средства болѣе приличныя къ отвращенію этихъ

болѣзней, которыя вообще бываютъ жестоки. Лѣтомъ надобно имъ вдвое болѣе обращать вниманіе на свое положеніе. именно: должно часто мыть бойни, употреблять растительную пищу, пить кислое питье (воду съ клюквеннымъ или лимоннымъ сокомъ), нюхать уксусъ и не долго оставаться въ мясной лавкѣ, а по окончаніи работъ выходить на чистый воздухъ. 3) Во избѣжаніе этихъ болѣзней мясники должны поднимать тяжелья части животныхъ съ помощью принаровленныхъ къ тому рычаговъ. 4) Края ранъ тотчасъ должны сводить плотно одинъ съ другимъ и туго перевязывать лентою изъ пузыря, кишки, желудка — сырыми, или размоченными, а по приходѣ домой покрывать сведенные края раны поперегъ ленточками изъ липкаго пластыря, не снимая его, пока края раны не сrustутся.

**Носильщики, крющники** (последніе носятъ кули съ мукою въ третій этажъ магазиновъ), **бурлаки или лямщики.** 1) Сильное напряженіе всѣхъ мышцъ, особенно мышцъ груди и живота, съ необходимымъ удержаніемъ притомъ воздуха въ легкихъ, выпускаемаго не иначе, какъ мало по малу и въ небольшомъ количествѣ, подвергаетъ этихъ рабочихъ: *разрыву сосудовъ въ легкихъ, кровотеченію съ опасными послѣдствіями, воспалительнымъ болѣзнямъ, кровавому удару.* 2) Отъ усилія, съ какимъ поднимаютъ эти люди тяжести, они подвергаются: *удушью, грыжѣ, болѣзнямъ сердца и большимъ его кровеносныхъ сосудовъ, разрыву связокъ и мышцъ.*

Надобно совѣтовать носильщикамъ, крющникамъ и лямщикамъ, чтобы они вели себя умѣренно и берегли силы, которыя для нихъ очень нужны. Для избѣжанія грыжи надобно носить бандажъ. Въ случаѣ болѣзни, всего лучше для нихъ *кровопусканіе, слабительныя, баня и треніе тѣла.* Нельзя не удивляться ловкости, съ какою эти люди, особенно мальчики и женщины, носятъ большія тяжести на головѣ; конечно здѣсь многое зависитъ отъ привычки. Нѣкоторые полагаютъ, что ношеніе тяжестей на головѣ препятствуетъ развитію умственныхъ способностей, особенно если кто съ дѣтства начнетъ заниматься этимъ дѣломъ.

**Осушатели болотъ или работники, осушающіе болота.** По причинѣ пагубнаго повѣтрія отъ вонючихъ испареній, поднимающихся изъ грязной, тинистой, разрываемой работниками земли, они подвергаются опасной *перемежающейся лихорадкѣ, кровавому поносу, воспаленію желудка и кишекъ.*

Въ концѣ зимы и въ началѣ весны, по видимому, наилучше предпринимать осушеніе болотъ, соблюдая слѣдующія правила: 1) работать въ высогихъ сапогахъ, противодѣйствующихъ вліянію сырости и воды; 2) въ разныхъ мѣстахъ болота разводитъ огни и для уменьшенія сырости, и для движенія воздуха въ застоявшейся атмосферѣ, и для согрѣванія людямъ, и для сушки платья, и для приготовленія пищи; 3) имѣть стѣляночку сильно пахучаго вещества, напр. уксусъ, разные ароматы для нюханія; 4) употреблять въ пищу самыя питательныя вещества; 5) вечеромъ послѣ работы скидать съ себя одежду, развѣшивать, сушить

и оставлять её на воздухъ до утра; также часто должны они мыть себя тѣло водою и уксусомъ и вообще соблюдать опрятность. Для этого подчинить ихъ нѣкоторому управленію, иначе трудно убѣдить простолудна въ томъ, что ему полезно. Въ случаѣ приступа жестокой болѣзни должно отнести больного далѣе отъ мѣстъ нездоровыхъ. При лѣченіи этихъ болѣзней, имѣя въ виду, что болотные миазмы (повѣтрія) производятъ, болѣе или менѣе, сильное раздраженіе кишечнаго канала, должно быть осмотрительнымъ въ употребленіи вяжущихъ укрѣпляющихъ средствъ.

**Охотники.** 1) Неумѣренная страсть охотиться во всякое время года подвергаетъ охотниковъ острымъ болѣзнямъ; лѣтомъ: *горячки*, простому поносу, или *со рвотою* (холера); зимою: *воспаленію подреберной плесви* и *легкихъ*, *головной боли* и *ревматизмамъ*; осенью: трехъ и четырехъ дневной перемежающейся *лихорадки*, также *ревматизму* и *водянкѣ*. 2) Отъ разрыва ружья, отъ скачковъ и неправильнаго движенія, когда они гоняются за звѣремъ, особенно краснымъ, они подвергаются разнымъ, болѣе или менѣе, опаснымъ *поврежденіямъ*.

Нельзя осуждать охоты, предохраняющей отъ многихъ опасныхъ болѣзней, особенно мороваго повѣтрія, и излѣчивающей многія хроническія болѣзни, какъ занятія пріятнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ очень полезнаго; но неумѣренность въ страстной охотѣ изнуряетъ и по различію времени года и даже сутокъ, напр. по утрамъ, поздно вечеромъ, въ зной полудня, подвергаетъ разнымъ неосторожностямъ, влекущимъ за собою различныя болѣзни; слѣдовательно надобно совѣтовать охотиться умѣренно, зимою въ холодъ и морозы одѣваться теплѣе, осенью отъ росы надѣвать сапоги, или обуваться въ кожаныя онучи, въ полуденный зной лѣтомъ не утолять жажду водою, а глоткомъ водки. Люди, желающіе охотиться, должны быть крѣпкаго тѣлосложенія, иначе они ослабѣваютъ и подвергаются различнымъ болѣзнямъ. При пользованіи охотника надо обращать вниманіе на чрезвычайное истощеніе силъ и съ осторожностью назначать лѣкарства. Такой больной не можетъ переносить повторительнаго кровопусканія и сильныхъ слабительныхъ; охота не укрѣпляетъ тѣла, но дѣлаетъ охотника столько же тощимъ, какъ и его собака. Галенъ совѣтуетъ не ограничивать діеты охотника въ случаѣ болѣзни, чтобы не изнурить его. Пользованіе охотника должно быть производимо болѣе легкими потогонными средствами. Въ случаѣ хронической болѣзни, особенно четырехдневной перемежающейся лихорадки, не должно употреблять разводяща лѣкарства и хину; въ этомъ случаѣ всего лучше совѣтовать заняться снова охотою, т. е. лѣчиться тѣмъ, отъ чего заболѣлъ. Во избѣжаніе поврежденій совѣтовать имѣть ружья прочныя, а заряжать ихъ, особенно ружье двуствольное, обращая замкомъ, или выгнутою стороною къ себѣ, причемъ въ случаѣ нечаяннаго выстрѣла оны пронесется мимо вперед и не повредитъ охотнику.

**Пильщики бревенъ.** Верхній пильщикъ отъ тяжести пилы подверженъ *усталости*, а нижній подъ козлами — отъ сыплющихся ему въ ротъ,

ноздри и глаза онилокъ подвергается *краснотѣ рта, носдрей, глазъ и безпрестанному миганію*. Кроме того по причинѣ производства работъ стоймя, они страдаютъ и тѣми болѣзнями, которымъ подвержены кузнецы и проч. (см. кузнецы).

Чтобы не слишкомъ утомлять силы и глаза, пильщики должны оставлять по временамъ свою работу, а въ случаѣ красноты и воспаления глазъ надо промывать ихъ водою. Относительно прочихъ болѣзней правила тѣ же, какія показаны для рабочихъ стоймя (см. кузнецы).

**Полотеры.** 1) Отъ намазыванія пола масляною краскою, по причинѣ ея испаренія, полотеры страдаютъ *головною боллю, тошнотою и коликою*. 2) Натираніе половъ щеткою и лощеніе ихъ подвергаетъ ихъ усталости въ рукахъ и ногахъ. 3) Отъ усилій при этой работѣ они страдаютъ *грыжею, горбатостю, аневризмомъ, женщины обильнымъ, периодическимъ очищеніемъ и выпаденіемъ матки*.

Полотеры не должны оставаться долго въ комнатахъ послѣ покрытія пола краской, и отворять окна тамъ, гдѣ они работаютъ; по окончаніи работы, имъ должно мыть лицо и руки; для нихъ полезны: баня, ношеніе грыжеваго бандажа; питье можетъ служить имъ водка, въ умѣренномъ количествѣ, и пиво.

**Портные.** Будучи не вѣрны на слово по пословицѣ: «лгать, какъ портной», и похотливы въ страстяхъ, въ пьянствѣ и дракѣ первые герои, въ чемъ проводятъ воскресный день и понедѣльникъ, который посвящается ими для полосканья рта, они имѣютъ тѣло одутловатое, слабое, вялое, сухое, ноги тонкія, цвѣтъ лица нѣсколько желтоватый. 1) По причинѣ безпрестаннаго сидѣнія на верстахъ со сложенными крестообразно ногами, причемъ тѣло сторбливается впередъ и въ упражненіи находятся однѣ руки, и особенно правая, бываютъ подвержены: *воспаленію желудка, затору на низѣ, геморю, страданію почекъ, хроническому катарру мочевого пузыря и заваламъ внутренностей, тошнотѣ, коликѣ, воспаленію печени, легочной чахоткѣ, грудной водянкѣ, кровохарканію, аневризму сердца и большихъ сосудовъ, чрезленному нервному ревматизму, хромотѣ и похотливости*. 2) Отъ иглы—*поколамъ* подъ ноготь и *ногтодѣ*. 3) По причинѣ тонкой ихъ работы, нерѣдко даже въ продолженіе ночи при свѣчкахъ, подвержены *слабости зрѣнія*; работая 4) предъ открытымъ окномъ подвергаются *боли въ ухахъ, зубахъ, насморку и боли глазъ*. Иногда сверхъ того *чесоточной сыпи*.

Портные должны прогуливаться на чистомъ воздухѣ каждый вечеръ, когда занятіе позволяетъ имъ это, тереть ноги фланелью, не ѣсть пици неудобоваримой, избѣгать лишняго употребленія спиртныхъ напитковъ. Относительно геморроидальныхъ страданій, портные должны быть осторожны, когда у нихъ бываетъ истеченіе изъ задняго прохода, потому что, если отдѣленіе геморроидальной крови перестанетъ вдругъ, то можетъ угрожать жизни опасность. Это спасительное кровотеченіе избавляетъ портныхъ отъ заваловъ печени и селезенки. Для этого не должно останавливать его, не посовѣтовавшись съ врачомъ. Буханъ въ своемъ со-



чиненіи «Домашній лѣчебникъ» говорить, что положеніе тѣла, въ какомъ работаютъ портные, повидимому, есть болѣе дѣйствіе привычки, нежели необходимости. Можно бы было, прибавляетъ онъ, усесться чело-вѣкамъ десяти, двѣнадцати вокругъ стола, опустить ноги на полъ, или поставить на скамейку. Также удобно было бы работать каждому за особеннымъ столомъ, что лучше, нежели какъ дѣлается теперь, когда рабочіе сидятъ, скрестивши ноги. Ремесло портныхъ вредно здоровью и противно желанію природы, потому что оно болѣе сродно женщинамъ (мечъ и игла, говоритъ д-ръ Никитинъ, не могутъ быть занятіемъ одной и той же руки), или мужчинамъ хромымъ и хворымъ, которые должны вести жизнь подобную женской.

**Плотники и столѣяры.** Не имѣютъ особенныхъ причинъ къ болѣзнямъ, но: 1) по нечаянности подвергаются *значительнымъ раненіямъ* и 2) отъ поднятія тяжестей — *грыжѣ* (плотники).

Отъ пораненій нужна каждому изъ нихъ извѣстная осторожность, особенно плотникамъ, которые должны поднимать тяжести общими силами, съ помощью рычаговъ.

**Прачки, банщицы и рыболовы.** Живя, обыкновенно, въ сырой атмосферѣ и имѣя почти всегда руки и ноги мокрыя въ слѣдствіе ихъ занятій, подвержены остановленію испарины и чрезъ то болѣзнямъ: *катарру легкихъ, колликъ, перемежающейся лихорадкѣ и ревматизму*; а прачки сверхъ того: 1) отъ остроты щелока *ссадинамъ на рукахъ и ноготокъ*; 2) отъ паровъ же щелочныхъ горячаго котла—*смертоподобію*. Эти рабочіе, по приходѣ изъ сырыхъ мѣстъ, должны снимать съ себя мокрое платье и стараться возбудить испарину кожи. Для работы въ мокротѣ гораздо лучше снимать обувь, которая удерживаетъ въ себѣ сырость. *Животная пища* имъ всего лучше, а въ случаѣ недостатка мяса *хрѣнъ, лукъ* и другія пряности. *Умѣренное употребленіе хлѣбнаго вина* возбуждаетъ дѣятельность ихъ сосудовъ и отвращаетъ проищаніе сырости. Прачкамъ совѣтуютъ обыкновенно *отворачиваться отъ щелочныхъ паровъ мѣнять бѣлье тотчасъ*, какъ онѣ бончатъ свою работу, *тереть тѣло*, и часто *мазать руки* не соленымъ коровьимъ *масломъ*, свинымъ и бараньимъ *саломъ*.

**Пѣвцы, чтецы на распѣвъ (диаконы), проповѣдники и другія духовныя лица.** По причинѣ усиленнаго напряженія голоса подвергаются: *охриплости, безгласію, катарру, жабъ, опухоли надгортаннаго хряща, зобу; кровохарканію, легочной и горловой чахоткѣ, аневризму сердца и большихъ кровеносныхъ сосудовъ, грыжѣ, приливу крови въ мозгъ и удару* (апоплексія).

Очень мало средствъ къ предотвращенію болѣзней, поражающихъ пѣвцовъ, чтецовъ и декламаторовъ, находящихъ въ голосѣ способы къ своему существованію. Однако имъ можно совѣтовать кое-что для сохранения своего здоровья. Пѣвцы не должны пить много вина, особенно водки, и не очень предаваться физической любви, которая поражаетъ въ особенности органы голоса. Не должно декламировать непосредствен-

но послѣ сытнаго обѣда, потому что грудобрюшная преграда тогда не можетъ столько растягиваться, сколько нужно для грудной полости. Также не слѣдуетъ пить ничего холоднаго тотчасъ послѣ декламации или пѣнія; должно беречься сквознаго вѣтра, отъ чего можетъ внезапно остановиться испарина и произойти воспалительная болѣзнь, особенно голосныхъ органовъ. Первымъ средствомъ для лѣченія болѣзней, происшедшихъ отъ сильнаго напряженія голоса, служитъ совершенное молчаніе, тепловатая ванна и *грудной чай*. При кровохарканіи и приливѣ крови къ мозгу полезны: *кровоупусканіе* и *раздражающія ножныя ванны*. Но если тягкая болѣзнь угрожаетъ легкимъ, что узнается по малому, сухому кашлю и истощенію тѣла, то надобно совсѣмъ оставить пѣніе или пѣвное чтеніе, и избрать другое занятіе, которое менѣе тягостно для органовъ голоса.

**Расчесывальники шерсти** (при передѣлываніи матрасовъ, когда въ нихъ шерсть, послѣ долгаго употребленія, дѣлается очень жестокою) и **шерстобиты**. Первые по причинѣ выколачиванія палкою на пивомъ шпелю шерсти и расчесыванія ея, запачканной потомъ, испраженіями и мочою, а послѣдніе по причинѣ разбиванія ея на струнѣ, глотаютъ много вредной пыли, причиняющей: *кашель, трудность дыханья, удушье* и *чахотку*; при чемъ расчесывальники шерсти подвергаются сверхъ того и заразительнымъ болѣзнямъ, какъ-то: *гнилой* и *гнилостно-нервной* (тифозной) *горячкѣ*.

Прежде чѣмъ работники примутся расчесывать шерсть изъ подержанныхъ матрасовъ, должно выносить послѣдніе на воздухъ, оставлять ихъ тамъ на нѣсколько дней и наконецъ промывать шерсть. Работники, занимающіеся расческою шерсти, должны, въ случаѣ болѣзненныхъ припадковъ, принимать *рвотное* или *слабительное*, чтобы освободиться отъ поглощенныхъ ими частицъ. Въ предохраненіе же себя отъ вреднаго дѣйствія пыли, рабочіе эти должны укрывать себѣ лицо тонкимъ флеромъ или серпянкою и полоскать ротъ водою съ уксусомъ. Еще можно работникамъ избѣгать пыли отъ шерсти, если они при расческѣ будутъ оборачиваться лицомъ въ сторону и станутъ удерживаться отъ разговоровъ. Кромѣ этого полезно, чтобы они мыли себѣ лицо и руки, когда садятся обѣдать или ужинать. Само собою разумѣется, что баня для нихъ очень полезна. Здѣсь кстати упомянуть о мѣрахъ къ отвращенію заразы вообще, происходящей отъ матрасовъ и перинъ. Не только послѣ умершихъ должно перебивать тюфяки, матрасы и перины, но непремѣнно должно, по употребленіи этихъ вещей въ продолженіе года, передѣлывать ихъ.

**Рубители строеваго лѣса и дровосѣки.** 1) Занимаясь рубленіемъ лѣса строеваго и дровянаго, большею частію въ зимнее и холодное время и въ отдаленности отъ жительства, они много терпятъ отъ стужи и подвергаются *ознобленію, отмороженію* и *замерзанію*. 2) Вспотѣвши за работою сгоряча, имѣя неосторожность пить холодную воду, а еще хуже ѣсть снѣгъ и глотать ледъ для утоленія жажды, отъ этого

нерѣдко страдаютъ: *простуднымъ груднымъ кашлемъ* (катарромъ), *жѣлтою* (воспаленіе зѣва) *безслизіемъ* и другими лихорадочными болѣзнями. 3) По неосторожности при владѣніи топоромъ подвергаются порубамъ и вообще такимъ же болѣзнямъ, какъ и плотники.

Въ предохраненіе отъ этихъ болѣзней этимъ рабочимъ должно советовать запасаться теплою шапкою, шейнымъ платкомъ, теплымъ полушубкомъ подъ суконнымъ армякомъ, теплыми суконными шароварами и онучами, а въ весеннюю сырость поверхъ послѣднихъ, или прямо на ноги, лучше имѣть кожаныя обертки для ногъ. Для утоленія жажды имъ безопаснѣе пить воду съ прибавленіемъ небольшого количества вина, — горѣлки, и пить ее всегда послѣ отдыха, а не прежде. Если случится сгоряча по нетерпѣнію напиться холодной воды или наѣться снѣга, то тотчасъ же послѣ того, ни мало не медля, должно приниматься опять за работу, чтобы тѣло вдругъ не остыло, и пищеварительные органы не охолодѣли. По окончаніи работъ, уѣзжая изъ лѣса, не садиться отъ усталости тотчасъ на возъ, а нужно нѣсколько пройти пѣшкомъ, чтобы неподволь тѣло и члены остыли. При чувствованіи ознобленія въ рукахъ или ногахъ должно согрѣвать ихъ движеніемъ и треніемъ. По пріѣздѣ домой не грѣться тотчасъ у печки или у огня и не ложиться на печь, или теплыя полаты, а нужно напередъ согрѣться тѣлодвиженіемъ или оттереть ознобленные члены снѣгомъ, холодною водою и на сухо вытереть.

Въ случаѣ отмороженія должно поступать такъ, какъ сказано въ лѣченіи этой болѣзни (см. отмороженіе); а съ замерзшимъ должно поступать такъ, какъ сказано въ наставленіи объ оживленіи замерзшихъ (см. это наставленіе). Кроме того предосторожности, предписываемыя плотникамъ, нужно соблюдать и этимъ рабочимъ.

**Рудокобы.** 1) По причинѣ содержащихся въ выкапываемыхъ рудахъ металлическихъ частицъ свинечныхъ, ртутныхъ и др. подвергаются *свинцовой коликѣ*, *трясенію тѣла* и т. п. 2) Отъ спершихся въ рудокопняхъ паровъ и газовъ они еще болѣе бываютъ подвержены *обмороженію* и самой *смерти*, чѣмъ чистодѣлы, чистильщики колодезь, помойныхъ ямъ и могильщиги.

Правила предосторожности для нихъ изложены въ діететическомъ лѣченіи свинцовой колики и трясенія тѣла (см. эти болѣзни) и въ наставленіи объ оживленіи задохшихся отъ газовъ, сверхъ того пѣложены мѣры для поданія врачебной помощи (см. это наставленіе).

**Рыбаки, занимающіеся продажею рыбы.** По причинѣ испортившейся и подвергшейся гніенію рыбы, которая дѣлается оттого вонючею, подвергаются *цынѣ*, *рожѣ*, *лишаймъ*, *воспаленію желудка* и тонкихъ кишечъ.

По этому имъ надобно соблюдать чистоту, особенно лѣтомъ, употреблять растительную пищу и пить воду съ кислымъ (клюквеннымъ, лимоннымъ) сокомъ.

**Рыболовы.** 1) Задержаніе испарины отъ неудобства и затрудненія въ за-

нятіяхъ, отъ вѣтра и непогоды, жестокой зимней холодъ и непомѣрный лѣтній жаръ, неправильный образъ жизни, почная работа, и легкая одежда подвергаютъ рыболововъ *горячкамъ, лихорадкамъ, ревматизмамъ, воспаленію легкаго и его плевры, катарру* и другимъ груднымъ припадкамъ, *сухоткѣ* и *водянкѣ*. 2) Отъ сырости при ловлѣ рыбы въ рѣчныхъ водахъ у рѣчныхъ рыболововъ бывають *язвы на ногахъ* неприятнаго сѣраго вида, легко переходящія въ антоновъ огонь. 3) Отъ сырости при ловлѣ рыбы въ морскихъ водахъ у рыболововъ морскихъ бывають *язвы на ногахъ* сухія, и *пятна синеватыя*. 4) По причинѣ соприкосновенія съ электрическою рыбою, при ловлѣ ея, подвергаются *оньмѣнію рукъ и ногъ*. 5) Морскіе рыболовы ѣдятъ больше, чѣмъ рѣчные рыболовы, между тѣмъ подвержены *запорамъ*. 6) По неосторожности и другимъ причинамъ нерѣдко тѣ и другіе утопають. Сверхъ того рыболовы подвержены и тѣмъ болѣзнямъ, каковымъ подвергаются прачки и банщици. Для избѣжанія болѣзней, происходящихъ отъ сырости, рыболовы должны носить сухое платье и сверху плащъ изъ клеенки, тереть фланелью всё тѣло, а иногда пить воду съ виномъ или водкою. Для лѣченія морскихъ рыболововъ полезны смягчающія, масляныя *промывательныя* и внутрь легкія *слабительныя*. Язвы у нихъ на ногахъ Иппократъ предлагаетъ лѣчить *морскою водою*. Утонувшихъ рыболововъ, если они не остаются долго въ водѣ, по вынутіи изъ нея, для приведенія къ жизни, надо покрывать и постепенно приближать къ огню, водить подъ носомъ зажженною спичкою, или давать имъ нюхать нашатырный спиртъ, щекотать губы и ноздри перомъ или другимъ какимъ либо легкимъ тѣломъ, вдыхать воздухъ въ легкія посредствомъ маленькой трубочки; къ подошвамъ должно класть горячіе кирпичи; обложить тѣло мѣшбамъ, наполненными горячею золою, или гладить всё тѣло горячимъ утюгомъ; дѣлать тренія сухою щеткою, теплою фланелью или голою рукою. Если утонувшій поправляется и можетъ глотать, то надобно по временамъ давать ему ложкою хорошее вино или водку. Если у него лицо одутловатое, синее, то при этомъ встаетъ *кровопусканіе*; полезны также *промывательныя* изъ соли и уксуса; *рвотное* надо давать, если языкъ покрытъ нечистотою (еще см. прачки и банщици).

Садовники, огородники и сѣятели риса. Садовники по причинѣ безпрестаннаго пребыванія въ сырыхъ садахъ, огородники по причинѣ обработыванія болотныхъ низкихъ мѣстъ, а сѣятели риса отъ хоженія большую часть времени года въ стоячей водѣ, подвергаются: 1) *коликѣ, ревматизму, сухоткѣ и водянкѣ*; 2) *перемежающейся лихорадкѣ и оньмѣнію ногъ*; 3) *отеку и завалу внутренностей*.

Почти нѣтъ средствъ къ отвращенію припадковъ, которыми страдаютъ эти люди, но можно совѣтовать имъ защищаться противъ мокроты сухою одеждою, треніемъ всего тѣла фланелью, употреблять пищу болѣе питательную, пить хлѣбное вино, бѣлкое пиво, что предохраняетъ ихъ отъ вліянія болотной міазмы (повѣтрія).

Сапожники и башмачники. 1) Сидячее согбенное положеніе бы-

насть причину, что они подвергаются хроническимъ болѣзнямъ груди и живота, *кровохарканію, аневризму сердца, скирру и желудка*. 2) Упирание башмакомъ или колодкою въ животъ производитъ у нихъ *плоскость и вдавленіе груди*. 3) Всегдашнее давленіе этой части бынасть причиной ихъ *болѣзней печени и желудка, воспаленія его и маволовъ печени, также запоровъ на низъ*. 4) Отвратительный запахъ кожи, употребляемой на сапоги и башмаги, производитъ у нихъ *точноту*. 5) Отъ остроты шила они подвергаются *уколамъ пальцевъ, пототодъ и мозолямъ на рукахъ*.

Эти ремесленники, имѣя плоскую вдавленную грудь, лицо, большею частію, блѣдное и желтое, бываютъ унылы духомъ. Въ отвращеніе, сколько можно, болѣзней, происходящихъ отъ положенія, въ какомъ они работаютъ, должно совѣтовать имъ прогуливаться вечеромъ, употреблять теплое питье и ѣздить верхомъ, или въ тряскомъ экипажѣ, что составляетъ самое лучшее средство къ разрѣшенію заваловъ. Частое мытье рукъ, лица и всего тѣла мыльною водою и частая смѣна бѣлья очень полезны для нихъ. Мозоли на рукахъ у сапожниковъ составляютъ небольшое зло, но, укрѣпившись, они препятствуютъ движенію пальцевъ, почему полезно поутру и вечеромъ парить руки въ продолженіе нѣкотораго времени во взварѣ проскурняка.

**Сукновальщики.** 1) По причинѣ обязанности своей работать въ мѣстахъ холодныхъ и сырыхъ, отъ остановленія испарины, они страдаютъ: *катарромъ, грудными припадками, ревматизмомъ, зубною и головою боллю*. 2) Отъ непрерывнаго напряженія ногъ и натуги, кромѣ того, подвергаются: *язвамъ* на ногахъ и *аневризму*.

Они должны соблюдать опрятность, носить сухое платье и употреблять всѣ необходимыя средства къ поддержанію испарины, задерживающей безпрестанно при ихъ занятіяхъ.

**Сырники, дѣлающіе и продающіе сыръ.** Сыръ свѣжій, влажный не опасенъ, но сыръ сухой, перебродившій и щелочный, покрытый запlesenнвшею корой, отдѣляя гнилость и аммоніачные пары, вреденъ и причиняетъ болѣзни: *хроническую болъ глазъ и жабу, также болъ въ горлѣ, потерю аппетита*.

Фабриканты и сырные продавцы обязаны соблюдать величайшую чистоту около себя и въ лавкахъ и употреблять *кислое питье*.

**Сѣятели, мѣрятели, молотильщики и вѣятели зерноваго хлѣба, также крупеники или круподеры.** 1) Отъ мельчайшихъ частицъ разной пыли, во время сѣянія, мѣрянія, молотбы и вѣянія зерноваго хлѣба, подвергаются: *сухому, толмительному кашлю съ краснотою глазъ и слезотеченіемъ*. 2) По причинѣ вредныхъ испареній отъ сложеннаго въ гучу и хранящагося въ запертомъ мѣстѣ, не освѣжаемомъ воздухомъ, при неосторожности, поражаются *смертоподобіемъ и самою смертію*.

Поселяне во время этихъ работъ должны укрываться отъ пыли. Очень благоразумно дѣлають, если при этомъ обыкновенно закрываютъ себѣ носъ и ротъ платкомъ, чтобы не глотать пыли, носящейся вокругъ

нихъ. Но кромѣ того подобно часто мыть ротъ и глаза свѣжею водою и стряхивать платье, также часто ходить въ баню и смывать пылъ, насышную на тѣло и запирающую поры кожи. *Эмульсія дынныхъ зеренъ, сморотка и взваръ алтѣйнаго корня* очень полезны для утишенія кашля. Во избѣжаніе того, что вредныя испаренія въ запертомъ, не освѣжаемомъ воздухѣ мѣстѣ, отъ зерноваго хлѣба, могутъ убить на мѣстѣ того, кто по неосторожности пойдетъ въ закрѣмъ, не давши выхода этому убійственному пару, вездѣ у насъ въ Россіи построены магазины провоздушиваемые. Въ частныхъ случаяхъ каждому хозяину дома совѣтовать въ отвращеніе закваски зерноваго хлѣба выкладывать его, провѣивать и оставлять на нѣсколько дней на солнцѣ. Это предохраняетъ и зерновой хлѣбъ отъ спорыньи и закваски, и сохраняетъ здоровье жителей.

**Свѣчники, или салотопы.** 1) Имѣя лицо блѣдное, одутловатое, въ слѣдствіе жирныхъ зловонныхъ частицъ, всасывающихся въ тѣло, подвергаются: *шуму и боли въ голову, желчнымъ гнилымъ горячкамъ, тошнотѣ, рвотѣ, головокруженію, удушью, разстройству желудка*, а женщины, дѣлающія свѣчи, сверхъ того, *истерикъ*. 2) Дѣйствіе при этомъ угольныхъ паровъ можетъ причинить *смертоподобіе* (обмираніе): Свѣчники, или салотопы, должны беречься, чтобы жиръ не воспламенился, потому что отъ этого часто происходятъ большіе пожары. Въ мастерской должно обновлять воздухъ чаще свѣжимъ, особенно это нужно въ комнатахъ со сводами для выпущенія угольныхъ паровъ. При лѣченіи свѣчниковъ необходимо удерживаться отъ назначенія кровопусканія, или назначать его съ большею осмотрительностью, чтобы не увеличить слабости и не причинить убытка силъ, уже безъ того истощенныхъ самымъ родомъ ихъ занятій. Для нихъ полезны свѣжіе соки *трилистника, дикаго цикорія и горькія наливки*. Свѣчники должны соблюдать величайшую опрятность, особенно лѣтомъ; мастерскія ихъ должно часто мыть. Пища этихъ мастеровыхъ должна состоять изъ *овощей, питье кислое, съ укусомъ, съ клюквеннымъ или лимоннымъ сокомъ*.

**Скороходы.** 1) Напряженіе силъ при трудной скорой ходьбѣ и бѣганьѣ подвергаетъ скороходовъ: *грыжѣ, кровавому мочетеченію, удушью, кровохарканію, заваламъ печени, особенно селезенки*. 2) Остановленіе испарины отъ холода въ вѣтреную, дождливую погоду, особенно легкою одеждою послѣ разгоряченія тѣла, подвергаетъ ихъ *острымъ больнымъ, воспаленію легкихъ и подреберной плесви*.

Скороходы могутъ предохранить себя отъ грыжи ношеніемъ грыжевой повязки. А прочія болѣзни, такъ какъ онѣ усиливаются отъ погрѣшностей въ діетѣ, то для поправленія ихъ силъ они должны употреблять пищу влажающую, а не сухую, тереть тѣло масломъ и ходить въ баню. *Кровопусканіе*, дѣлаемое по временамъ, можетъ предохранить сосуды отъ разрыва и предупреждаетъ кровохарканіе, но когда оно у нихъ начинается, то нужно пускать кровь, потому что ни одинъ органъ у скороходовъ не уступаетъ и не раздражается болѣе чѣмъ легкія; что касается до заваловъ внутренностей, особенно селезенки, то, кромѣ разводящихъ лѣ-

карствъ, нужно совѣтовать скороходамъ умѣренныя прогулки, что замѣняютъ врачебныя средства.

**Скорняки, одбѣяльщики, вязальщики, шерстобиты, придильщики хлопчатой бумаги.** По причинѣ малѣйшихъ частицъ, безпрестанно входящихъ въ дыхательное горло и его вѣтви, они имѣютъ глаза гнойные и слезливые, подвержены *кашлю, удушью и легочной чахоткѣ*.

Въ предохраненіе себя отъ вреднаго дѣйствія этихъ частицъ, помянутые работники должны покрывать себѣ лицо мокрою губкою, привязывая ее съ помощью тесемки. Для унятія раздраженія въ дыхательномъ горлѣ полезны: взваръ ячменныхъ сѣмянъ, алтейнаго корня и молока.

**Скотники и скотницы** (занимающіеся содержаніемъ скота, какъ-то: коровъ, козъ, овецъ, барановъ, ослицъ) и **пастухи** (пасущіе стада). Отъ вреднаго и отвратительнаго запаха навозной ямы, находящейся въ смежности ихъ жилищъ, и гнилыхъ паровъ, распространяющихся по хлѣву, скотники и скотницы подвержены *злокачественнымъ сыпямъ*. Пастухи же, отъ избытка чувствъ, развиваемыхъ природою, при совмѣстной ихъ бѣдности и строгости къ нимъ со стороны мірскаго общества за пропажу, похищеніе и другаго рода недосмотръ ихъ, подвергаются *меланхолии, ипохондріи и самоубійству*.

Скотники и скотницы должны быть опрятны, часто мыть лицо и руки, особенно въ случаѣ повальныхъ болѣзней они должны себѣ мыть руки соленою водою, или разведеннымъ уксусомъ и за всѣмъ тѣмъ осторожно пригасаться къ скоту. При этомъ, главное, надобно стараться, чтобы вблизи людскихъ жилищъ не было навозныхъ ямъ. Пастуховъ, въ случаѣ напавшей на нихъ задумчивости, нужно тотчасъ замѣнять другими людьми, а ихъ употреблять на другія работы въ артеляхъ, т. е. въ сообществѣ съ другими. Въ случаѣ же упущеній въ работѣ, не взыскивать съ нихъ строго, но мѣрами благоразумія и кротости предотвращать эти упущенія на будущее время, и по возможности удалять причину и поводъ къ нимъ. Касательно же мѣръ предосторожности, въ случаѣ появленія чумы рогатаго скота, пастухи должны соблюдать особыя по этому предмету правила.

**Торговцы и торговки.** 1) Отъ крика и болтовни на открытомъ воздухѣ при ношеніи и продажѣ разныхъ мелочныхъ товаровъ по улицамъ, особенно послѣднія, т. е. торговки, страдаютъ: *катарромъ* (охрипость голоса, насморкъ и кашель) и *ревматизмомъ* (ломота въ рукахъ и ногахъ), оканчивающимися нерѣдко *горловою чахоткой*. 2) Послѣднія же, т. е. торговки, сверхъ того, зимою на рынкѣ, грѣясь обыкновенно надъ жаровнею съ раскаленными угольями, страдаютъ *упорными бляхами*.

Эти болѣзни можно отчасти отвратить умѣренностію въ образѣ жизни, т. е. когда торговцы не будутъ употреблять слишкомъ много спиртныхъ напитковъ и станутъ тепло одѣваться. Торговцамъ надо совѣтовать, чтобы онѣ не ставили жаровни подъ себя и не грѣлись на угольяхъ;

гораздо лучше было бы имъ носить исподнее платье, т. е. папалоны, но безъ разрѣза. Что касается до охриплости голоса, то едва ли ктонибудь можетъ увѣрить торговкоу, что излишняя болтовня и сильный крикъ вредятъ голосу и дѣлаютъ охриплость.

**Точильщики.** 1) Отъ напряженія зрѣнія при натачиваніи особенно мелкихъ вещей на точилѣ, имѣютъ *слабое зрѣніе, глаза красные, воспаленные* 2) Отъ вертящагося безпрестанно точильнаго камня и послѣ работы чувствуютъ *головокруженіе*, верченіе колеса представляется имъ и послѣ работы. 3) Отъ излишняго усилія, требующагося при дѣланіи ими мелкихъ вещей, происходятъ: *судорожное трясеніе тѣла* и нѣкотораго рода *оченьмигня*.

Во время точенія вещей особенно мелкихъ, они не должины слишкомъ долго и пристально смотрѣть на нихъ, но чаще отводить глаза на другіе предметы, дѣлая это попеременно и какъ можно чаще; они могутъ предотвращать или облегчать напряженіе зрѣнія и чрезъ то менѣ подвергаться болѣзнямъ, происходящимъ отъ этого. Примачиваніе глазъ холодною водою во время и послѣ работы для нихъ полезно; въ онѣмѣніи же и трясеніи судорожномъ, помогаютъ слабительныя и противосудорожныя средства, растираніе голою рукою, либо варшпою.

**Ткачи и ткачихи.** 1) Работая въ затруднительномъ сидячемъ положеніи, при безпрестанномъ напряженіи всѣхъ членовъ тѣла, особенно при самомъ мучительномъ потрясеніи предсердія отъ приближенія къ нему бердѣ, бывають блѣдны, едутловаты, вялы, расположены къ любовнымъ наслажденіямъ (у ткачихъ это мастерство способствуетъ мѣсячному очищенію) и подвержены *отвердѣнію печени, селезенки, водяной болѣзни, геморю, удушью, трепетанію сердца, слабости нервовъ*. 2) По причинѣ сырости ткацкихъ мастерскихъ нижняго этажа, смѣшанной съ масляными частицами, страдаютъ *ревматическими болями, четырехъ дневными лихораджами, опухольями шеи, лица и цынгою*.

Прогулка на свободномъ воздухѣ, сухія тренія всего тѣла, питательная пища очень полезны для нихъ. Романини не совѣтуетъ имъ бросать кровь, развѣ съ большою осторожностію; потеря крови наводитъ на нихъ большую слабость. Всего здоровѣе для этихъ людей, еслибы они работали въ сухихъ мастерскихъ и въ высокомъ помѣщеніи.

**Трубочисты** (занимающиеся чисткою трубъ). Хотя отъ сажи ничего не терпятъ и наслаждаются добрымъ здоровьемъ и отличною бѣлизною зубовъ, которая (сажа) сверхъ того предохраняетъ ихъ отъ наложныхъ сыпей, особенно отъ чесотки; но: 1) Опускаясь сквозъ узкую трубу, задерживаются въ ней головою и въ этомъ положеніи иногда погибають, прежде чѣмъ можно имъ подать пособіе. 2) Отъ горячей трубы, въ которую иные лезять, претерпѣвають *ожоги и обмирають* (смертоподобіе).

1) Во избѣжаніе ущемленія головы совѣтовать опускаться сверху трубы веревку, чтобы трубочистъ крѣпко держался за нее рукою, которая



должна быть по верхъ головы; тогда можно, въ случаѣ опасности, вытащить его. 2) Въ горячую трубу имъ нужно остерегаться лезть. Чтобы сажа не разлеталась въ трубѣ, должно закрывать её не тряпками, чего далеко недостаточно, но старыми рогожами. Частое умываніе лица и всего тѣла и вышоласкиваніе рта водою, разведенною уксуомъ, для нихъ очень полезны.

**Тряпичники.** 1) По причинѣ непріятнаго запаха и пыли при сортировкѣ тряпья, подвержены: *кашлю, трудному дыханію, тошнотѣ и головокруженію.* 2) Отъ лежанія или спанья на кучѣ ветоши, будучи неопрятны, нетрезвы, обжорливы и одѣты въ лохмотья, изъѣденныя червями, подвергаются: *чесоткѣ и гнилой горлячкѣ.*

Приэтомъ, главное, нужно чтобы собраное тряпье складывалось въ сараѣ, и сортировка его дѣлалась на открытомъ воздухѣ. Не излишне часто мыть лицо и тѣло мыльною водою. Но ходить въ баню, смѣнять бѣлье и вести трезвую жизнь для тряпичниковъ всего полезнѣе. Въ случаѣ болѣзни совѣтуютъ давать тряпичникамъ укрѣпляющія, возбуждающія лѣкарства, противящіяся дѣйствию вредныхъ частицъ, проникающихъ въ ихъ тѣло.

**Угольщики** (занимающіеся приготовленіемъ и продажей угля). Отъ непогоды и спанья на землѣ во время работы на открытомъ воздухѣ въ лѣсу бываютъ подвержены: *катаррамъ и ревматизму.* Въ предотвращеніе болѣзней совѣтуютъ угольщикамъ хорошенько накрываться и спать въ покояхъ. Чадъ древесный на воздухѣ имъ не вредитъ, а угольная пыль-того, кто мѣряетъ и возитъ уголь, сверхъ того предохраняетъ отъ чесотки и другихъ накожныхъ сыпей.

**Фабричные,** (работающіе сидя, торгоши, сидящіе въ лавкахъ и прилавкахъ, Пряжи, мотальщицы и всѣ женщины и мастеровые, ведущие сидячую жизнь). Вообще отъ сидячей жизни дѣлается перевѣсъ пасочной системы надъ мышцами, нервами и кровеносными сосудами: отъ этого происходятъ *блѣдность лица, золотуха, англійская болѣзнь, засореніе желтъзъ, цынга и сухотка, нервные припадки, лишай, чесотка* и другія *сыпи, страданіе почекъ, геморой, бѣли и неправильное мѣсячное кровоочищеніе.*

Очень трудно предупреждать и лѣчить эти болѣзни, потому что мастеровые такъ привыкаютъ къ сидячей жизни, что не любятъ и даже боятся тѣлодвиженія. Впрочемъ должно совѣтовать имъ: 1) Чтобы они держались, стоя или сидя, на сколько позволяютъ занятія, въ прямомъ положеніи, перемѣняли бы его почаще, и прогуливались на свѣжемъ воздухѣ во время отдыха, вмѣсто того, чтобы ходить въ питейные дома и трактиры, или забавляться какою либо игрою въ сидячемъ положеніи, 2) Соблюдать опрятность, мыть руки и лицо нѣсколько разъ и ходить по временамъ въ баню. 3) Работать въ саду, копать землю, сажать деревья, полоть въ часы досуга. Этотъ совѣтъ могутъ исполнять мастеровые въ селеніяхъ и малыхъ городахъ. Садовая работа оказываетъ благотворныя дѣйствія на здоровье, тамъ, гдѣ нѣтъ садовъ, и работники

не могут доставлять себѣ этой выгоды, должны дѣлать больше движенія въ праздничные дни. Пища мастеровыхъ, ведущихъ сидячую жизнь, должна быть здоровая. Мясо свиное и всѣ тяжелыя питательныя вещества нейдутъ для нихъ. Никогда не должно тотчасъ, вставши отъ стола, приниматься за работу, иначе пищевареніе разстроится и легко послѣдуетъ воспаленіе желудка и кишокъ. Въ отвращеніе болѣзней, угрожающихъ мастеровымъ, ведущимъ сидячую жизнь, совѣтовать принимать слабительныя весною и осенью. Когда же они слягутъ въ постель, то нужно обращать вниманіе на части ихъ тѣла, которыя больше бывають заняты при работѣ и на которыя легко дѣлается отложеніе болѣзни. Сидячія работы должны быть единственно удѣломъ женщинъ, которыя вопреки порядку, занимаются въ полѣ работами гораздо труднѣйшими. Женскій полъ лучше переноситъ сидячія работы, которымъ онъ, повидимому, назначенъ.

**Хожатые за больными.** По причинѣ нездороваго воздуха, наполненнаго животными испареніями, отдѣляющимися отъ испраженій, мочи и проч. и по причинѣ особой слабости, отъ обязанности нерѣдко проводить ночи безъ сна, эти люди подвергаются: *болѣзнямъ желудка и горячкамъ, переходящимъ* иногда въ *инлию*. Кромѣ того они могутъ заражаться отъ больныхъ чесоточныхъ, оспенныхъ, коревыхъ, скарлатинныхъ, тифозныхъ и др., чрезъ что подвергаются: *чесоткѣ, остѣ, корѣ, скарлатинѣ, тифу* и др.

При входѣ за больными совѣтовать хожатымъ воздухъ въ ихъ покояхъ почаще обновлять зимою и лѣтомъ, отворяя форточки или двери, или очищать окуриваніемъ, испраженія, мочу и проч. тотчасъ выносить; для поддержанія силъ имѣть, хоть короткій, но частый отдыхъ, духъ свой ободрять вѣрою въ то, что ихъ поступки угодны Богу. Въ предохраненіе отъ заразительности должно совѣтовать хожатымъ, чтобы они не вдыхали воздухъ отъ больныхъ, удерживали, по возможности дыханіе, когда приближаются или наклоняются къ ихъ кровати, или къ нимъ самимъ, не глотали слюны, не оставляли въ палатахъ грязнаго бѣлья у судна съ испраженіями, смотрѣли, чтобы въ комнатахъ было умѣренно тепло (излишній жаръ содѣйствуетъ развитію заразы), по возможности чаще перемѣняли бѣлье и платье, которое должно быть преимущественно холстинное, или бумажное, мыли чаще лицо и руки свѣжею водою съ мыломъ, выходили по временамъ изъ комнаты на чистый воздухъ, не ѣли и не пили въ палатѣ больныхъ, употребляли пищу удобоваримую и пили за столомъ нѣсколько вина. Обыкновеннымъ питьемъ должны служить сыворотка, вода съ уксусомъ или кислымъ (клюквеннымъ, брусничнымъ, лимоннымъ) сокомъ.

**Хлѣбники, или пекари хлѣба.** Имѣя лицо блѣдное, одутловатое, они вообще слабы здоровьемъ, чаще подвергаются болѣзнямъ, чѣмъ прочіе рабочіе по причинѣ утомительной работы и неправильнаго образа жизни, такъ какъ они днемъ спятъ, а ночью работаютъ, живутъ до 40—50 лѣтъ. 1) По причинѣ мучныхъ частицъ, носящихся вокругъ нихъ въ

видѣ облака, имѣють: *кашель, насморкъ, глазовоспаленіе*. 2) Отъ усиленія, съ какимъ мѣсятъ тѣсто, получаютъ: *болѣзни сердца, одутло-матость и болю рукъ, тучность тѣла*. 3) Отъ непрерывнаго стоянія у нихъ дѣлаются *опухолы венъ и язвы на ногахъ*. 4) Отъ печнаго жара, который сушить ихъ, у пекарей рождается *жажда*. 5) Отъ простуды, но привычкѣ пить холодное питье и выходить даже зимою въ одномъ передникѣ, подвергаются *ревматизму, насморку, ломоть, воспаленію легкихъ и злокачественнымъ лихорадкамъ*. 6) Отъ обычая съ утра пить водку, иногда по штофу, происходятъ у нихъ: *воспаленіе желудка, запой, нерѣдко посягательство на самоубійство*. 7) По причинѣ ихъ неопрятности, распутства, къ которому они очень склонны, подвержены бывають, сверхъ того, *сифилитической болѣзни; отрубееобразнымъ лишаямъ и чесоткѣ*.

1) Въ отвращеніе отъ вреднаго вліянія мучной пыли хлѣбники, обыкновенно, повязываютъ себѣ лицо платкомъ, но, не смотря на это, мука проникаетъ сквозъ платокъ. Лучше было бы, если бы эти работники чаще мыли себѣ лицо теплою водою, полоскали ротъ водою, разведенною укусомъ, и пили кислотоватое питье. Не излишне также принимать имъ время отъ времени слабительныя, или даже рвотное во время затрудненія у нихъ дыханія. Рвотное избавляло иногда хлѣбниковъ отъ смерти. 2) Всѣ болѣзни отъ простуды лѣчатся у нихъ пѣтомъ, который возбуждается, если больной остается въ жаркой комнатѣ и пьетъ чай изъ цвѣтовъ бузины. Когда эти средства не помогаютъ, то иногда надо дѣлать кровопусканіе. По непростительному обычаю хлѣбники иногда ставятъ горячіе уголья въ погребѣ на случай нужды; но отъ этого дѣлается чадъ, который задѣшаетъ того, кто пойдетъ за угольями. Во многихъ мѣстахъ поставляется за правило гасить уголья въ большихъ закрытыхъ сосудахъ, сдѣланныхъ изъ жести.

Злокачественныя лихорадки излѣчиваются у нихъ трудно.

**Чесальщики и продавцы пеньки и льна.** 1) По причинѣ вредныхъ и даже заразительныхъ испареній пеньки и льна, во время мочки ихъ, они подвергають и себя и другихъ, не подалеку живущихъ, *перемежающимся лихорадкамъ, сухоткѣ и золотухѣ*. 2) Отъ острой пыли изъ пеньки, особенно льна, перебираемаго и расчесываемаго, проникающей въ дыхательные пути, страдаютъ: *кашлемъ, удушьемъ и даже частоткою* (блѣдность и слабость). 3) По причинѣ ядовитаго и вреднаго запаха, отдѣляющагося изъ пеньки, нерѣдко чувствуютъ *головокруженіе, оглушеніе* и родъ охмѣленія.

Мочильщики и чесальщики льна и пеньки, въ предохраненіе себя отъ смертельныхъ испареній и пыли, отдѣляющихся изъ этихъ веществъ, должны заниматься этимъ дѣломъ на открытомъ воздухѣ, при вѣтрѣ, обратившись къ нему спиною, часто мыть себѣ лицо и полоскать ротъ укусомъ, разведеннымъ водою; употреблять молого, наливку алтейнаго, фіалковаго и цикорійнаго корня, также очищенный сокъ этихъ растений. Если они чувствуютъ тошноту, боль головы, особенно сухость кожи и

красноту языка, не имѣють аппетита, то должны принять рвотное или слабительное. Промысливающіе этимъ веществомъ, должны быть сверхъ того трезвы, умѣренны, безъ всякихъ излишествъ; въ противномъ случаѣ, они начинаютъ часто кашлять и со дня на день слабѣють; когда по вечерамъ они чувствуютъ жгучій жаръ и сухость, также боль въ груди и удушье, угрожающее легочною чахоткою, то должны оставить этотъ промыселъ.

**Чистодѣлы** (занимающіеся чистою отхожихъ мѣсть). По причинѣ всасыванія ихъ кожею, дыханія и глотанія зловредныхъ гнилыхъ испареній (газовъ), спертыхъ въ мѣстахъ, не обновляемыхъ воздухомъ, подвержены: *воспаленію глазъ, насморку съ болью во лбу, воспаленіямъ желудка, кишекъ и антонову огню въ кишкахъ, смертоподобію* и самой смерти.

Средства къ предохраненію себя: 1) Опрятность. Чаще мыть руки, лицо и все тѣло мыльною водою съ уксусомъ, перемѣнять бѣлье и платье. 2) Куреніе уксусомъ, можжевельникомъ, ароматными травами, богородскою, душицею, полынью и т. п., разными постилками, соломою, сѣною трухою и смолами. 3) Чистить отхожія мѣста зимою въ сухую погоду. 4) Отворять нужники за 12 часовъ до чистки ихъ. 5) Не приближать огонь (свѣчку) къ отверстию, въ отвращеніе воспаленія и вспышки паровъ. 6) Запереть все стульчаки нужниковъ. 7) Въ отхожемъ мѣстѣ (ямѣ) или на краю его ставить на таганѣ жаровню съ горящими угольями для улетучиванія газовъ. 8) Разбивая отвердѣвшія вещества, должно отворачивать отъ нихъ голову. 9) Не прежде опускаться въ яму, какъ увѣрившись напередъ, что свѣча можетъ горѣть во всей глубинѣ ея. 10) Опускаться въ яму на веревкѣ, которую другіе двое внѣ ямы должны вѣрѣжно держать. Вычерпывая ведромъ и вливая испражненія въ бочки, должно голову отворачивать въ сторону. 12) Почувствовавъ дурноту, тотчасъ оставлять работу, пока она не пройдетъ. Лѣченіе смертоподобія: 1) Перенести скорѣе смертоподобнаго съ мѣста, раздѣть и обмыть его холодною водою и уксусомъ. Дать ему нѣсколько ложекъ деревяннаго масла. Если желудокъ больного начнетъ подниматься, то дать ему стаканъ водки; отъ этого произойдетъ рвота и поносъ; и человекъ бываетъ спасенъ, но если этого не будетъ, то щекотать въ горлѣ перомъ. Въ крайнемъ случаѣ допустить открытъ кровь, приложить горчичники и мушки къ ногамъ и дать рвотное изъ рвотнаго камня.

**Чистильщики колодезь и помойныхъ ямъ.** 1) При работахъ въ мѣстахъ низкихъ и сырыхъ, попеременно переходя отъ жара къ холоду и отъ сухости къ сырости, задерживаютъ испарину и подвергаются: *ревматизму, колликъ и мокротнымъ груднымъ припадкамъ.* 2) Отъ вредныхъ испареній и накопленія газовъ, которые бываютъ гораздо вреднѣе, если колодцы доселѣ были заперты, не смотря на то, что вода хороша для питья. Наболѣе вредны колодцы, когда въ нихъ застаивается грязная вода, потому что она отдѣляетъ газы, гибельное зловоніе которыхъ бываетъ смертельно для опускающихся въ нихъ. За-

мѣчено также, что послѣ грозы, колодцы преизобилуютъ вредными гнилыми газами. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ бываютъ подвержены *судорожамъ* и *смертоподобію*. Эти работники, большею частію, имѣютъ слабое тѣлосложеніе по причинѣ худой пищи и бѣдности; лицо у нихъ блѣдное. Едва достигнувъ 40—50 лѣтняго возраста, они принуждены оставлять вмѣстѣ съ жизнію и свое занятіе.

**Правила:** 1) Предъ тѣмъ, какъ опускаться въ колодезь для чистки или починки его, должно напередъ узнать, каковъ тамъ воздухъ. Для этого надо въ колодезь до воды опустить фонарь со свѣчкой; если огонь не гаснетъ, то фонарь вытащить и, привязавъ тяжесть на веревку, надо мѣшать воду до дна колодца и опять опустить туда фонарь съ огнемъ; если при этомъ второмъ опытѣ огонь не гаснетъ, то работники могутъ начать свое дѣло, покрывая себѣ однако лицо. Въ противномъ случаѣ не должно опускаться въ колодезь, изъ опасенія подвергнуться смертоподобію. 2) Лѣченіе въ первомъ случаѣ должно состоять въ восстановленіи испарины кожи сухимъ треніемъ и ваннами изъ ароматическихъ травъ, припаркою изъ сѣнной трухи, банею. Въ случаѣ кровопусканія, приставленіе пиявокъ имѣетъ преимущество вообще предъ кровопусканіемъ изъ вены. Слабительныя должны быть легкія, чтобы не изнурить больного, который и безъ того очень слабъ.

**Шелкодѣлатели** (люди, занимающіеся разведеніемъ шелковичныхъ червей и приготовленіемъ шелка въ южной европейской части россіи).

По причинѣ порчи воздуха отъ большаго количества насѣкомыхъ въ одномъ покоѣ, отъ ихъ испражнений, отъ постилки изъ древесныхъ листьевъ, отъ мочки когонъ и по причинѣ примѣся къ воздуху пыли, отдѣляющейея при расческѣ когонъ (которыя для приготовленія изъ нихъ сырца, бывъ вымочены въ кипяткѣ въ видѣ тѣста, высушиваются на солнцѣ и содержатъ частицы мертвыхъ червей), проникающей въ легкія, подвергаются: *сухому кашлю, затруднительному дыханію, различнымъ хроническимъ болѣзнямъ груди и чахоткѣ*.

**Предосторожности:** 1) частое обновленіе воздуха въ покояхъ, гдѣ содержатся шелковичные черви и вымачиваются когоны и поправление порчи его посредствомъ куренія соляною кислотою. 2) Чаше перемѣнять листья или постилку для шелковичныхъ червей. 3) Размывать когоны на открытомъ мѣстѣ, доступномъ воздуху, или въ покоѣ, снабженномъ трубами для прохождения свѣжаго воздуха. Діета должна быть молочная. Всего лучше употреблять въ пищу молоко. При лѣченіи употреблять наливку просвиры (malva) фіалки, цикорея, или очищенные растительные соки, а въ случаѣ опасности болѣзни совѣтовать больнымъ оставлять свои занятія.

**Швеи, вышивальщицы, кружевницы, штопальщицы, булочники, булочницы и чулочницы.** 1) По причинѣ сидѣнія, согнувшись, за своими работами, какъ и портные, подвергаются: *хроническому страданію груди, особенно легочной чахоткѣ, разстройству пищеваженія, заваламъ внутренностей, геморрою, боли почекъ, хроническому ка-*

*тартру мочевого пузыря, наученію живота (вѣтрамъ), принадлежатъ нервнымъ, неправильному очищенію и бѣлямъ.* 2) По причинѣ напряженія зрѣнія вечеромъ при тускломъ свѣтѣ лампы, гдѣ свѣтильня мала, бываютъ подвержены: *слабости зрѣнія и истощивости глазъ.*

Эти женщины должны иногда прогуливаться, прогулка излѣчиваетъ ихъ отъ заваловъ, умножаетъ, или поддерживаетъ естественную теплоту, производитъ испарину и предотвращаетъ болѣзни кожи. Надобно также совѣтовать имъ оставлять занятія свои на время, дать на нѣсколько времени отдыхъ рукамъ и отвести глаза отъ работы; въ противномъ случаѣ онѣ въ послѣдствіи должны будутъ вести жизнь бѣдственную. По временамъ имъ надо давать *слабительное* изъ сабура или ревеня; кровопусканіе для нихъ не такъ полезно, какъ слабительныя, что извѣстно изъ опыта. Послѣ кровопусканія онѣ впадаютъ въ слабость, кровь ихъ безъ того уже тоща и жидка, и притомъ же онѣ убѣждены, что кровопусканіе ослабляетъ зрѣніе, что однако имѣетъ нѣкоторое основаніе. Нарывной пластырь, приложенный на руки, на ноги, также полезенъ для нихъ; чрезъ это отдѣляются изъ тѣла нечистые соки.

## РОСПИСАНІЕ

**ПОСЕЛЯНЪ ПО ИХЪ РАЗНОКЛИМАТНОМУ МѢСТОПРЕБЫВАНІЮ ВЪ РОССИИ, СЪ ПОКАЗАНІЕМЪ КЛИМАТИЧЕСКИХЪ ПРИЧИНЪ, ПО КОТОРЫМЪ ОНИ ПОДВЕРГАЮТСЯ РАЗНЫМЪ БОЛѢЗНЯМЪ, И МѢРЪ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОТИВУ ОНЫХЪ НЪ СОХРАНЕНІЮ ЗДОРОВЬЯ.**

**Самоѣды, остяки, чукчи и другіе кочующіе инородцы,** живя въ пустынныхъ мѣстахъ холоднаго климата сѣверной полосы и питаясь, кромѣ оленей, рыбами, перелетными лебедями и гусями, прилетающими туда на время линянія въ несмѣтномъ множествѣ, и гнѣздящимися на тундряныхъ болотахъ, въ слѣдствіе суровости зимы и вѣчныхъ тумановъ лѣтомъ, подвержены *цынготной болѣзни*, противъ которой, какъ дѣйствительнѣйшее лѣкарство, природа производитъ для нихъ *ложечную траву*.

**Завологодцы.** Занимая сѣверную холодную мѣстность Россіи, они вообще малорослы, блѣдны и бѣлокуры, по недостаточному вліянію на нихъ солнечнаго свѣта; щедушны, слабосильны, съ ограниченными умственными способностями, подвержены *воспаленію глазъ*, разнымъ *накожнымъ сыпямъ*, *желудочнымъ* и *слизистымъ горячкамъ*, *мокротному кашлю*, *водяной болѣзни* и особенно *цынготъ*.

Правила для сбереженія здоровья въ холодномъ климатѣ и въ холодное время состоятъ: 1) въ защищеніи себя отъ вреднаго вліянія вѣшняго воздуха; 2) въ усиленномъ развитіи внутренней теплоты и 3) въ ограниченіи выхода ея къ наружи, — *посредствомъ одежды, пищи, на-*

*питковъ, движенія и покоя, сна и жилища.* Одѣяніе и обувь должны быть достаточно теплы и сухи. Пища должна быть плотно-питательная, твердая, горячительная и болѣе животная, нежели растительная. *Водяные напитки* вообще мало употребительны зимой въ холодъ, такъ какъ въ это время мы не чувствуемъ особенной жажды, особенно холодная вода; но горячій чай, выпитый предъ выходомъ на воздухъ, открывая поры въ кожѣ и выводя теплоту изъ тѣла, сильно располагаетъ къ простудѣ и даже къ ознобленію. Вредъ, происходящій отъ выведенія внутренней теплоты и отъ раскрытія поръ тѣла, особенно оказывается надъ купцами-сидѣльцами которые, напившись чая до пота, сидятъ цѣлый день въ бездѣйствіи. Теперь это замѣтно и на рабочемъ народѣ, который, напившись чая, отправляется работать на открытомъ воздухѣ. Спиртные напитки, не смотря на сильное развитіе внутренней теплоты, которое они производятъ въ нашемъ тѣлѣ, въ холодное время болѣе вредны, нежели полезны. Только внутренняя теплота, развиваемая въ тѣлѣ всегда однообразно, равномерно и безъ особеннаго напряженія тепло-творныхъ органовъ, вѣрно защищаетъ отъ внѣшняго холода, а такая теплота производится питаніемъ и движеніемъ тѣла, и для того нужно поставить правиломъ: въ зимнее время пить вино не предъ выходомъ на холодъ, а по возвращеніи со стужи въ теплое мѣсто. Въ холодное время на ходу мы скорѣе и лучше нагрѣваемся, чѣмъ у печки. Ходить или бѣгать нужно до легкой усталости, до появленія жара въ лицѣ, рукахъ и ногахъ и до чувства теплоты въ кожѣ. Но тотъ, кто на морозѣ остается въ бездѣйствіи, не смотря на сытый желудокъ и теплое одѣяніе, не избѣжитъ вреднаго дѣйствія холода. Ночной сонъ, благопріятствуя питанію, много способствуетъ къ укрѣпленію тѣлесныхъ силъ и развитію внутренней теплоты. Въ зимнее время и въ холодныхъ странахъ, по долготѣ и темнотѣ ночей, слѣдуетъ спать гораздо долѣе, чѣмъ лѣтомъ и въ жаркомъ климатѣ. Устройство жилищъ, употребляемое въ Россіи, вообще приваровлено къ нашему холодному климату и зимѣ; только курныя избы не годятся. Онѣ хотя и скоро нагрѣваются, но за то скоро и остываютъ, топленіе съ отворенною дверью совершенно остужаетъ ихъ, дымъ же ихъ очень вредитъ глазамъ.

**Южные закавказцы, грузины, крымцы и астраханцы.** Они живутъ въ самыхъ жаркихъ мѣстахъ Россіи. По вредному дѣйствію на нихъ климата имѣютъ цвѣтъ блѣдный, желтый, впалое или одутловатое лицо, желтые, тусклые, вялые глаза, горечь и нечистоту во рту, потерю аппетита, расстройство пищеваренія отекомъ ногъ и проч. (Все это, обыкновенно, бываетъ видимо на сѣверныхъ поселенцахъ въ южныхъ краяхъ Россіи, прожившихъ тутъ по крайней мѣрѣ хотя одно лѣто). Они занемогаютъ часто и жестоко опасными *лихорадками и желчными горячками, кровавымъ поносомъ, воспаленіемъ печени и глазъ, солнечнымъ пострѣломъ, проказою* и ихъ послѣдствіями, *завалами внутренностей, водяною болѣзнію, слабостію умственныхъ способностей, тупостію*

*чувствъ, потерю разсудка* и др. Причины этому слѣдующія: жаркая теплота, перемѣна температуры и болотныя земныя испаренія.

Эти особенности жаркаго климата на туземца, свыкшагося съ ними, дѣйствуютъ слабо, но на пришельца сильно и убійственно. Пришельцы, въ первые два года своего переселенія въ жаркій климатъ, подвергаются жестокимъ и опаснымъ климатнымъ болѣзнямъ: но по прошествіи этого времени, климатъ теряетъ свое вредное вліяніе и на пришельца, по немногу привыкающаго къ особенностямъ страны. По этому, для соблюденія постепенности, совѣтуютъ *изъ жаркой страны переселиться въ холодную весною, а изъ холодной въ жаркую — осенью*: въ первомъ случаѣ весна и во второмъ осень будутъ для насъ приготовительнымъ временемъ привыкнуть, хотя нѣсколько, къ разностямъ климатовъ. При томъ діета и образъ жизни въ жаркихъ климатахъ и въ жаркое лѣтнее время имѣютъ важное вліяніе какъ на самое здоровье, такъ и на болѣзни и ихъ окончаніе. Простой народъ жаркихъ странъ и пришельцы изъ холоднаго въ жаркій поясъ, не воздержные въ діетѣ, особенно съ неумѣренностію употребляющіе вино, подверженные зною днемъ, а ночью сырому холоду, легко заболѣваютъ тяжкими болѣзнями; но люди богатые, наблюдающіе осторожность въ пищѣ, напиткахъ и не подвергающіеся крайностямъ температуры днемъ и ночью, удобно привыкаютъ и къ жаркому климату, не разстроивая своего здоровья. Пришельцамъ въ жаркія страны, желающимъ избѣгнуть вреднаго дѣйствія на нихъ климата, совѣтуемъ соображаться въ образъ жизни съ туземцами.

Все это приводитъ къ тому заключенію, что для сбереженія здоровья въ жаркомъ климатѣ и въ жаркое время нужно: 1) защищать себя отъ вѣшняго зноя, ночнаго сыраго холода и болотныхъ испареній соотвѣтственнымъ тому одѣяніемъ; 2) ограничивать развитіе внутренней теплоты свойственнымъ тому пищею и питьемъ, и 3) выводить изъ тѣла излишнюю теплоту приличнымъ образомъ жизни.

**Мало-россіяне, ново-россіяне, бессарабцы и кавказцы.** обитая въ южной Россіи, начинающейся на половинѣ Черниговской губерніи и простирающейся до южныхъ границъ нашей имперіи, т. е. отъ 50° до 38° сѣверн. шир., и соотвѣтственно тому къ востоку и западу, почитаются жителями теплаго климата Россіи, въ медико-топографическомъ ея отношеніи. *Прибрежные и сосѣдніе жители рѣкъ: Дуная, Днѣпра, Самары, Дона* и проч., съ наступленіемъ весны и до поздней осени, *подвергаются лихорадкамъ, которыя,* по упорности своей и по множеству одержимыхъ ими людей, справедливо почитаются мѣстными болѣзнями и *извѣстны* подъ *именемъ днѣпровскихъ, дунайскихъ, самарскихъ лихорадокъ* и т. п. Кроме того, южному краю Россіи *свойственны простые и кровавые поносы, разныя сыпи (наипаче чесотка и крымская проказа), желчныя горячки, завалы* внутренностей и *чума*. Лихорадки свирѣпствуютъ здѣсь почти  $\frac{3}{4}$  года весною и лѣтомъ, одно — и трехдневныя, а осенью четверодневныя, и появляются въ различныхъ измѣненіяхъ, принимаютъ различныя формы другихъ болѣзней, легко об-



манываютъ больного и неопытнаго врача своимъ скрытымъ видомъ, дѣлаются упорными и причиняютъ завалы внутренностей, водяную болѣзнь, цынгу и проч. Безъ преувеличенія можно сказать, что  $\frac{3}{4}$  больныхъ въ Мало — и Новороссіи весною и лѣтомъ, не смотря на наружную разность ихъ болѣзней, въ сущности страдаютъ лихорадками, которыя наипаче происходятъ отъ земныхъ и болотныхъ, вредныхъ испареній и отъ обыкновенія жителей спать ночью на голой землѣ, въ полѣ, на лугахъ, во время обработыванія земли и сѣнокосовъ. Простые и кровавые поносы причиняются мутною, горько соленою водою, остановленіемъ испаринны въ кожѣ въ ночное сыро-холодное время, и неумѣреннымъ употребленіемъ незрѣлыхъ плодовъ и овощей. Чума есть заносная болѣзнь изъ Турціи. первоначально же, къ счастью, въ Россіи она нигдѣ не замѣчена по происхожденію. Эти жители должны *остерегаться* отъ сырости и земныхъ болотныхъ *испареній*, особенно вечеромъ по закатѣ солнца, ночью и поутру до солнечнаго восхода. Главнѣйшія для того средства слѣдующія: не селиться въ низменныхъ мѣстахъ; если же это необходимо, то искусственно возвысить грунтъ земли, гдѣ намѣрены построить жилище; домъ укрѣплять на низкихъ, толстыхъ сваяхъ, такихъ, какія дѣлаются въ русскихъ избахъ: жить въ верхней части дома; окошки комнатъ располагать на востокъ и сѣверъ; затворять предъ закатомъ солнца и протапливать почаще комнаты, растворяя лѣтомъ трубы; выходя вечеромъ на воздухъ, нужно одѣваться теплѣе въ шерстяное или мѣховое платье; носить бумажное или шелковое бѣлье, фланелевую фуфайку; не садиться и не спать на голой землѣ, особенно не ложиться животомъ на землю, а лучше всего на какойнибудь подмоеткѣ, или на толстомъ слоѣ соломы, сухаго камыша, кукурузы и проч., укрываться войлокомъ, тулупомъ, одѣвать на ночь суконное исподнее платье и суконный набрюшникъ; во всю ночь поддерживать костеръ съ огнемъ, вокругъ котораго работники, кочующіе въ полѣ, могутъ ложиться спать такъ, чтобы ноги каждаго изъ нихъ были обращены къ огню, который есть надежнѣйшее средство для осушенія ближайшаго воздуха и уничтоженія вредныхъ испареній, защищать голову отъ прямыхъ солнечныхъ лучей и животъ отъ сырости; для этого имѣть непременно приличную *шапку* и *брюшной поясъ*. Относительно одежды съ пользою для здоровья можно слѣдовать черкесамъ, татарамъ, грузинамъ и персіянамъ; всѣ они и лѣтомъ носятъ мѣховыя шапки, или чалмы изъ шерстяныхъ или бумажныхъ большихъ платковъ, и увиваютъ животъ широкими поясами.

**Россіяне средней части Россіи, какъ-то: бѣлоруссы, литовцы, великороссы, черемисы, чуваша, вотяки, пермяки и сибиряки.** Живя въ среднемъ пространствѣ Россіи, они почитаются обитателями въ умѣренномъ ея климатѣ. Въ прибалтійскихъ губерніяхъ хотя погода бываетъ непостоянная, дождливая, туманная и сырая, но, по кремнистому и песчаному грунту земли, воздухъ не напитанъ вредными земными испареніями, отъ того болѣзни продолжаются болѣе *простудныя, желудочныя, лихорадки, кашель, ревматизмъ, воспаленія, острия сыти, цынги.*

Бѣлоруссы и литовцы, по скудости своего хлѣбопашества, на песчаномъ грунтѣ земли, по множеству болотъ и обширности лѣсовъ, люди малорослые, худые, неопытные, подвержены *сыпльмъ*, особенно *колтуцу*, *лихорадкамъ* и *цынть*.

Великороссія же, занимающая восточную часть умѣренной полосы Россіи, отличается возвышеннымъ мѣстоположеніемъ, скотоводствомъ, хлѣбопашествомъ, благотвореніемъ воздуха, правильностію время года и хорошею здоровою водою. Оттого, по песчано-глинистой и черноземной почвѣ, по отдаленности морей, по множеству рѣкъ, рѣдкости болотъ и люди подвергаются обыкновеннымъ болѣзнямъ, зависящимъ отъ перемѣны температуры и отъ время года. Все это должно отнести и къ юго-западной части Сибири, которая, здоровостію климата и обиліемъ жизненныхъ произведеній, превосходить и великороссійскія губерніи.

### Правила о попеченіи и хожденіи за роженицами и родильницами \*).

Здѣсь нужно сказать о простой помощи при родахъ, состоящей въ наблюденіи дѣйствій природы, въ преподаніи роженицѣ извѣстныхъ правилъ для облегченія родовъ, въ уничтоженіи и уменьшеніи постороннихъ болѣй, причиняемыхъ сжатіями матки, въ надлежащемъ направленіи усилій роженицы и въ предотвращеніе вреда, который она можетъ причинить себѣ по невѣдѣнію и неопытности. За отсутствіемъ врача акушера, ученой повивальной бабки, нужно знать слѣдующій ходъ родовъ роженицъ, и правила о попеченіи и хожденіи за ними.

1) При появленіи настоящихъ родовыхъ болѣй (потугъ), зависящихъ отъ сжатій матки, возвращающихся въ извѣстные промежутки времени, между которыми роженица наслаждается спокойствіемъ, —отдыхаетъ и даже засыпаетъ, младенецъ подается къ наружи въ надлежащемъ направленіи и роды происходятъ правильно. Въ это время нужно стараться только о томъ, чтобы *температура комнаты* роженицы была *умѣренная*; чтобы роженица ничѣмъ не была обезпокоиваема, съ кротостію и убѣжденіемъ уговаривать ее умѣрять свои крики и жалобы, которымъ она предается, въ обманчивой надеждѣ, что это облегчитъ ее, между тѣмъ какъ именно эти пронзительныя вскрикиванія отнимаютъ у роженицы силы, очень въ это время необходимыя для нея. Обыкновеніе въ простонародѣ помѣщать роженицъ въ потопленной банѣ очень вредно и неудобно для нихъ. 2) Во время первыхъ родовыхъ потугъ роженица остается въ произвольномъ положеніи; только ей ставится промывательное, для предупрежденія рѣзы въ животѣ, и по мѣрѣ того,

\*) Въ общемъ народномъ понятіи подъ словомъ «роженница» разумѣется и родильница, между тѣмъ, какъ по наукѣ роженицею называется та беременная женщина, которая ждетъ родить и рождаетъ; а родильницею называется разрѣшившаяся отъ бремени роженица, въ первое время послѣ родовъ.

какъ родовые потуги усиливаются, и младенецъ подается къ переди и къ низу матки, когда бабка можетъ ощупываніемъ распознать мягкую расширенную маточную шейку, чрезъ отверстіе которой начинаетъ выходить мѣшокъ съ дѣтскою жидкостью, а во время потугъ и въ самомъ предматочникѣ глубоко ощупывается возвышеніе, — роженицѣ нужно дать *положеніе*, самое благоприятное для окончанія родовъ: на узкой, *отвсюду доступной кровати*, съ множествомъ подушекъ для поддержанія головы, и съ 2—3 простынями, изъ которыхъ одиѣ складываются вдвое во всю ея длину; на краю постели помѣщается задняя и нижняя часть туловища роженицы, такъ что ея тазъ остается совершенно свободнымъ, а ноги находятся въ полусогбенномъ и раздвинутомъ положеніи и упираются къ низу о неподвижную точку кровати: съ каждой стороны кровати стоящая помощница поддерживаетъ роженицу и подаетъ ей полотенце, за которое она укрѣпляется руками во время родовыхъ потугъ. 3) По мѣрѣ того какъ младенецъ подается къ наружи, мѣшокъ съ дѣтскими водами выступаетъ явственнѣе. Иногда не нужно торопиться разрывать его пальцами или инструментомъ, а лучше всего предоставить натурѣ, потому что этотъ мѣшокъ, на подобіе клина, непримѣтно расширяетъ шейку и маточный каналъ, защищаетъ головку младенца отъ тренія и прижатія, и чѣмъ позже онъ лопається, тѣмъ скорѣе оканчиваются роды. Но если по истеченіи водъ, отъ разрыва мѣшка, роды останавливаются, не смотря на сильныя родовыя потуги, если въ маточной шейкѣ замѣчается жесткость и упругость, то нужно посадить роженицу въ теплую ванну съ отрубями и дѣтородныя части помазать деревяннымъ масломъ, если же роженица полнокровна, рождаетъ въ первый разъ, и притомъ уже въ зрѣломъ возрастѣ, или долго была бездѣтною, то кровопусканіе въ такомъ случаѣ будетъ полезно, но не иначе, какъ съ разрѣшенія врача. 4) По разрывѣ дѣтскаго мѣшка отъ сильныхъ потугъ и по истеченіи водъ, для предотвращенія разрыва промежности, одна изъ помощницъ всею *ладонью руки* крѣпко должна *поддерживать* выдающуюся головку дитяти, нажимая ее отъ зада къ переди, особенно во время родовыхъ потугъ, подъ конецъ всегда сильныхъ и мучительныхъ, кромѣ того при этомъ роженицѣ нужно дать *горизонтальное положеніе* на спинѣ и для того вынуть лишнія подушки изъ верхней части ея туловища раздвинуть бедра и немного ноги въ колѣнахъ. 5) При выхожденіи младенца, бабка одною рукою поддерживаетъ его головку, а другою плечики и задницу и кладетъ его между бедръ роженицы поперечно на постели, у самыхъ дѣтородныхъ частей матери, лицомъ къ верху, не напругая и не прижимая пуповины. Въ это время, нужно *отдѣлять* его *отъ послѣда*, чрезъ перевязываніе, и дѣлать потомъ разрѣзъ пуповины не прежде, какъ *когда біеніе* въ послѣдней совершенно прекратится. 6) По рожденіи младенца нужно осмотрѣть роженицу, особенно ея животъ, подкрѣпить ее чашкою чая изъ ромашки, мелиссы и пр. и *ожидать выхода* послѣда или дѣтскаго *мѣста*, котораго отдѣленіе отъ матки означаютъ послѣ-родовыя

боли, сопровождаемая кровотечениемъ. Исследование дѣтородныхъ частей роженицы покажетъ положеніе послѣда, и если онъ находится въ маточномъ отверстіи, то его смѣло можно удалить, въ противномъ случаѣ отъ затворенія дѣтскимъ послѣдомъ маточнаго отверстія легко можетъ произойти внутреннее кровотеченіе. Выходящій послѣдъ извлекается за пуповину, обвитую около перстовъ, изъ которыхъ указательный и средній давятъ къ задѣ и къ низу, и дѣтское мѣсто, охваченное руками, кладется въ тазъ. При медленномъ же отдѣленіи послѣда, не нужно ускорять его выхода притягиваніемъ къ себѣ пуповины, но надо спокойно ожидать произвольнаго его отдѣленія, послѣ котораго роженица, обмытая, одѣтая въ чистое, вмѣсто замараннаго, бѣлье, помѣщается на собственной кровати и получаетъ названіе родильницы, у которой появляющаяся иногда дрожь уничтожается чашкою теплаго чая съ сахаромъ. 7) Многія женщины во время родовъ подвергаются обмороку, приписываемому слабости, и потому бабки стараются поддерживать роженицу пищею, хорошимъ виномъ; но это предположеніе неправильно; въ это время желудокъ почти ничего не можетъ варить; напротивъ того, нужно утолить жажду и освѣжить роженицу пріятнымъ кислымъ питьемъ, даваемымъ часто, но по немногу. 8) Наши простыя родильницы — крестьянки, по совѣту своихъ бабокъ повитухъ, сейчасъ послѣ родовъ, обыкновенно, отправляются въ баню съ младенцемъ. Это обыкновеніе опасно и вредно для родильницы и ея дитяти, особенно въ зимнее время; *родильницъ*, и то безъ ребенка, можно позволить *вымыться въ банѣ* не прежде, какъ спустя девять дней послѣ родовъ. 9) По окончаніи родовъ, родильница, изнемогая отъ родовыхъ потугъ, сильнѣйшихъ напряженій тѣла и потери крови, чувствуетъ неизъяснимо пріятное спокойствіе и засыпаетъ крѣпительнымъ сномъ, который возстановляетъ силы и успокоиваетъ ея тѣло. 10) Послѣ нѣсколькихъ часовъ сна или успокоенія, невозмущаемаго посѣщеніями, *вторично обмываютъ* мягчительнымъ теплымъ отваромъ какъ бедра, такъ особенно дѣтородныя части родильницы, слишкомъ растянутыя, ослабленныя, иногда порванныя, и *повязываютъ* ей животъ свернутою вдвое салфеткою или брюшнымъ поясомъ, который бы слегка сжималъ его. Настоящее молоко у родильницы отдѣляется на 2—5 день послѣ родовъ. Сильное налитіе имъ грудныхъ сосудовъ сопровождается дрожью или ознобомъ, жаромъ и обильнымъ потомъ, безъ особеннаго разстройства общаго здоровья. Это состояніе родильницы называется *молочною лихорадкою*, которая въ рѣдкихъ случаяхъ соединяется съ растройствомъ желудка и воспаленіемъ. Аппетитъ и испраженія низомъ возвращаются около 3—4 дня послѣ родовъ, и родильница приходитъ въ прежнее свое состояніе не прежде 8—9 дня. Все это время она не должна оставлять своей постели; вставая ранѣе, она можетъ получить кровотеченіе или выпаденіе матки. Родильница здоровая и крѣпкая почти не имѣетъ надобности въ наставленіи во время кормленія дитяти грудью: недостатокъ ея свѣдѣній пополнить мать

природа и ея материнское чувство. Но мать нѣжная, слабосильная, должна соблюдать нѣкоторыя предосторожности и помнить, что ея молоко имѣетъ самое сильное вліяніе на младенца, что состояніе ея духа и тѣла, пища, питье, воздухъ, движеніе, занятіе и пр. дѣйствуютъ на ея молоко, красоту и свѣжесть тѣла.

### Правила о попеченіи и хожденіи за новорожденными.

Послѣ трудныхъ и продолжительныхъ родовъ, младенецъ выходитъ на свѣтъ, большею, частію *блѣдный*, съ закрытыми глазами, безъ крика и дыханія; тутъ не должно торопиться отрѣзываніемъ пуповины, а нужно оставить младенца подлѣ матери, покрыть его теплыми, сухими и мягкими полотенцами, слегка потереть его грудь, послѣ чего начинается дыханіе; перевязавъ пуповину въ двухъ мѣстахъ, со стороны матери и младенца, перерѣзываютъ еѣ между узлами нитки ножомъ или ножницами. *Полнокровный младенецъ*, послѣ трудныхъ родовъ, напротивъ имѣетъ глаза красные и неподвижные, лицо припухлое и налитое кровію, покровы черепа темнокрасные, шейныя вены вздутыя, безъ признаковъ жизни. Въ этомъ случаѣ нужно скорѣе перерѣзать пуповину \*). Въ томъ и другомъ случаѣ, т. е. при рожденіи младенца мнимо-умершимъ (смертоподобнымъ) отъ слабости и полнокровія, безопаснѣе пригласить къ роженцѣ и младенцу врача, когда онъ есть по близости. Когда же его нѣтъ, то повитуха должна, перевязавъ пуповину плотно, но не крѣпко, очистить носъ и ротъ отъ слизи перышкомъ, либо ветошечкою, смоченными виномъ, поглаживать грудь и животикъ, погачать руками на воздухъ, вспрыснуть водою, укрывъ все тѣло пеленками сухими, мягкими и теплыми. По обнаруженіи дыханія и крика, тѣло обмыть отъ слизи, намазать свѣжимъ масломъ, либо яичнымъ желткомъ, положить въ теплой темноватой комнатѣ. Бабка должна осмотрѣть тѣло младенца, нѣтъ ли на немъ чего либо не натурального: опухоли, ушиба, вывиха, перелома кости, зараженія натурального отверстія и т. п. При этомъ осмотрѣ голаго ребенка нужно защищать его отъ простуды. Черезъ нѣсколько часовъ по рожденіи, младенецъ обыкновенно мочится; если же этого не послѣдовало, то для предупрежденія рѣзы въ животѣ, безпокойства и даже судорогъ, нужно способствовать испражненію кала и мочи треніемъ всего тѣла; и особенно живота.

Колыбель новорожденного должна состоять изъ довольно глубокаго ящика, изъ котораго бы младенецъ не могъ вывалиться, а постелька изъ матраца, набитаго соломой или лошадинымъ волосомъ и простеганнаго, съ небольшою довольно твердою головною подушечкою. Шерстью, перомъ или пухомъ набитыя подушки слишкомъ вдавливаются, быва-

\*) Пуповина перерѣзывается на 3—4 дюйма отъ пупка и изъ пупочнаго ея конца слегка выжимается кровь.

ють причиною искривленія членовъ, разгорячаютъ малютку и долго удерживаютъ сырость; эти предметы должно почаще перемѣнять, держа ихъ въ чистотѣ и сухости; а будучи хорошо подобраны и слабо набиты въ подушкѣ, они бывають мягки, упруги и представляютъ довольно ровную плоскость. Должно приучать младенца засыпать безъ качанія; качаніе въ люлькѣ, особенно висячей (зыбокѣ), какъ то дѣлають наши крестьянки, разгорячаетъ младенца, приводитъ его въ оглушеніе и забывчивость и, при неосторожности, дитя можетъ вывалиться изъ зыбки. Въ первые 3—4 мѣсяца малюткѣ нужно дѣлать ежедневны ванны; 5—6-ти мѣсячнаго младенца нужно купать чрезъ день, а 9—12 мѣсячнаго 2—3 раза въ недѣлю. Купать дитя нужно предъ кормленіемъ. Ванна рѣже подаютъ поводъ къ простудѣ, чѣмъ купаніе. Температура воды, сначала довольно теплая, потомъ постепенно уменьшается до теплоты воздуха. Зимой ванна должна быть теплѣе, чѣмъ лѣтомъ. Сидѣніе въ ваннѣ въ началѣ ограничивается 5—6 минутами, а потомъ продолжается до 15—30 минутъ. Ванночку можно соединять съ обмываніемъ. Ванны очень хорошо оживляютъ и укрѣпляютъ тѣло младенца.

Одежда, прогулка и ношеніе груднаго младенца на рукахъ имѣютъ вліяніе на его здоровье. Одежда должна быть просторная и соотвѣтствующая времени года. Содержаніе головки въ теплѣ вредно. Прогулка въ хорошую погоду очень полезна: младенецъ живо выражаетъ свою радость на солнышкѣ и свѣжемъ воздухѣ и потомъ засыпаетъ глубокимъ, крѣпительнымъ сномъ. Въ лѣтнее хорошее время, младенца можно посадить на землю. Ношеніе и качаніе груднаго младенца на рукахъ требуетъ особенной ловкости и навыка, дабы его не изуродовать. Гораздо лучше носить его въ первые четыре мѣсяца спеленаннаго и на матрасикѣ: этимъ предотвращается искривленіе спинки и ножекъ. До тѣхъ поръ дитя носить на рукахъ въ лежачемъ положеніи, пока оно не будетъ въ состояніи держать головку прямо. Больныхъ же дѣтей, носить на рукахъ какъ можно рѣже.

Кормленіе новорожденнаго собственнымъ молокомъ есть священнѣйшая и важнѣйшая обязанность матери. Самое высокое назначеніе женщины, быть матерью въ полномъ смыслѣ этого слова, т. е. родить и вскормить своего младенца. Но мать не можетъ кормить своего младенца: если она страдаетъ любострастною, или пакожною болѣзнію, если она расположена къ наслѣдственной чахоткѣ, ломотѣ, золотухѣ, падучей болѣзни, или если она слабаго и нѣжнаго тѣлосложенія, слишкомъ стара (за 40 лѣтъ), страдаетъ горячкою, воспаленіемъ и т. п., если она по своему положенію въ свѣтѣ не можетъ, или не хочетъ вести правильнаго рода жизни, необходимаго при кормленіи младенца грудью. Впрочемъ для большей вѣрности всякая мать, сомнѣвающаяся на счетъ своей способности самой кормить своего младенца, должна посоветоваться о томъ прежде съ опытнымъ врачомъ. Нарывы, отвердѣнія, скирръ и ракъ груди, очень большой, или очень малый и вжатый сосокъ груди также препятствуютъ матери самой кормить дитя свое. По

этому *кормленіе* новорожденныхъ бываетъ *материнскимъ молокомъ* и *безъ него*. Въ послѣднемъ случаѣ оно бываетъ искусственное и *посредствомъ* посторонней женщины *кормилицы*. Первое молоко дѣйствуетъ на младенца благотворнѣе всѣхъ слабительныхъ сироповъ. Въ первые дни по роженіи, когда достаточно испражненъ первородный калъ, младенца нужно прикладывать къ груди очень рѣдко; для него нужнѣе спокойствіе и сонъ, чѣмъ пища; младенецъ днемъ долженъ сосать грудь матери чрезъ 3—4 часа, а ночью 2—3 раза. Мать должна кормить дитя грудью при хорошемъ расположеніи духа и спокойствіи, послѣ же гнѣва, испуга, неумѣренной радости, послѣ сильнаго тѣлеснаго движенія, или простуды, не должно сейчасъ прикладывать дитя къ груди. Младенца не будить отъ сна для кормленія грудью и не усыплять его у груди; то и другое вредно для его желудка. Послѣ всякаго сосанія груди, нужно очищать ротъ дитяти. По прошествіи 8—10 мѣсяцевъ, или, точнѣе, по выхожденіи переднихъ зубовъ, нужно постепенно *отучать* дитя отъ груди и въ такой же мѣрѣ приучать его къ другой пищѣ.

На искусственное кормленіе рѣшаются только въ крайности въ простомъ быту поселянъ бѣдныя матери, а достаточныя по недостатку кормилицы, потому что оно соединено съ большими затрудненіями, и дѣти при немъ вообще растутъ плохо, оттого что грудное молоко не можетъ вполнѣ замѣнить никакая другая пища, и сверхъ того, при самомъ лучшемъ и порядочномъ искусственномъ кормленіи, здоровье и жизнь дитяти подвергаются, такъ сказать, ежеминутно крайней опасности. При искусственномъ кормленіи должно поступать слѣдующимъ образомъ: чтобъ замѣнить послѣродовое грудное молоко, имѣющее послабляющее свойство и содѣйствующее испражненію кишечныхъ нечистотъ, совѣтовать въ первые дни, вмѣсто коровьяго молока, впускать ребенку въ ротикъ ложечками только тепловатую сладкую сыворотку, и повторять это каждые три часа до тѣхъ поръ, пока перестанутъ идти черноватая испражненія низомъ, а покажутся желтоватая. Потомъ начать кормить его цѣльнымъ коровьимъ молокомъ, составляющимъ первый удой. Если же нельзя имѣть парнаго молока, то сдѣлать смѣсь изъ подогрѣтаго снятаго коровьяго молока и легкаго чая изъ волотскаго укропа или перевареной воды, взявъ того или другаго по равной части съ молокомъ. Для постепеннаго увеличенія потомъ питательности этой смѣси брать съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе молока и менѣе упомянутаго чая, или воды. 3) Для кормленія дитяти коровьимъ молокомъ употреблять сперва чайныя ложечки, а потомъ приготовляемые для этого рожки, къ которымъ прикрѣпляется коровій сосокъ, который, непременно послѣ каждаго раза, какъ пососетъ дитя, должно вычищать и выполаскивать въ чистой водѣ; иначе питье, вливаемое въ нечистый рожекъ, будетъ скоро киснуть и портиться. 4) Чрезъ двѣ недѣли употреблять молоко цѣльное; вмѣсто цѣльнаго молока, употреблять по временамъ снятоѣ, а если очень слабить, то мѣшать цѣльное молоко съ отваромъ рисовыхъ, или перловыхъ крупъ. 5) Послѣ пяти мѣсяцевъ

при молокѣ можно давать болѣе питательную пищу, попеременно съ молокомъ. 6) Чѣмъ долѣе оставлять дитя, кормимое искусственною пищею, на одной жидкой пищѣ, тѣмъ лучше и легче для него, и тѣмъ безопаснѣе оно отъ болѣзней, свойственныхъ дѣтямъ, кормимымъ искусственною пищею. Жидкая пища вообще споснѣе для желудка дѣтей и скорѣе переваривается. 7) По прошествіи семи мѣсяцевъ, когда дитя видимо станетъ скучать одною жидкою пищею, слѣдуетъ начать употреблять и густую. Вообще вскорѣ послѣ того, какъ стануть кормить дитя молочною кашкою, начинать уже по немногу приучать его и къ мясному супу. 8) Подъ конецъ года, можно мало по малу употреблять уже мясныя яства и преимущественно для такихъ дѣтей, которые очень слабы, подвержены разнымъ страданіямъ, особенно поносу, и у которыхъ зубы прорѣзываются тяжело. Но не давать имъ пищи холодной, а всегда тепловатой, какъ материнское молоко. Пищу для дѣтей неравненно лучше готовить въ муравленныхъ горшечкахъ, чѣмъ въ мѣдныхъ кастрюлькахъ. Но если уже употребляются для этого кастрюльки, то смотрѣть строго, чтобы онѣ были всегда хорошо вылужены, и, какъ скоро будутъ опорожнены отъ пищи, тотчасъ же вычищаемы. Не оставлять пищи въ кастрюлькѣ, даже и на самое малое время, но тотчасъ, по свареніи, выкладывать ее на блюдечки или въ горшечки, иначе она можетъ сдѣлаться ядовитою. Даже въ чашкахъ и горшечкахъ не оставлять надолго въ тепломъ мѣстѣ пищи слизистой, мучнистой, молочной, а надежнѣе для всякаго раза дѣлать вновь свѣжую пищу, для ночи же готовить ее съ вечера.

При выборѣ кормилицы, главное, нужно смотрѣть на то, чтобы она была совершенно здорова и чтобы періодъ ея родовъ, сколько можно, ближе подходилъ ко времени рожденія младенца, котораго она должна кормить своимъ молокомъ. Вообще деревенскія женщины предпочитаются городскимъ, первородившія многорождавшимъ, молодыя старымъ, тихія, кроткія и робкія дерзкимъ и смѣлымъ, низкія и плотныя — великорослымъ и толстымъ, живыя и веселыя — лѣнливымъ, неповоротливымъ, темнорусыя свѣтло и черно-русые. Кромѣ того мать, при выборѣ кормилицы, должна обратить вниманіе, чтобы она была моложе 20 и не старѣе 30 лѣтъ, хорошо сложена и совершенно здорова, имѣла бѣлую и чистую (безъ сыпей) кожу, плотное тѣло, живые глаза, румяныя губы, не испорченные, полные числомъ и бѣлые зубы, красныя десны и языкъ, приятно пахучее или безъ особеннаго запаха дыханіе, хорошій аппетитъ и дѣятельное пищевареніе, тихій (безъ храпѣнія) и чуткій сонъ. Мать и отецъ, принимая кормилицу, должны забыть неравенство своего капитала или рода и говорить съ нею дружески: этимъ они у нравственно хорошей женщины очень много выигрываютъ въ пользу своего дитяти. *Молоко* у хорошей кормилицы имѣетъ собственный, едва примѣтно сладковатый вкусъ, голубовато-бѣлый цвѣтъ, безъ особеннаго запаха, умѣренную густоту, удобно растворяется въ водѣ и образуетъ въ ней легкое облачко; его капля съ ногтя схо-



дить медленно и не очень прилипаетъ; отстоявшееся отдѣляетъ не много сливокъ. Это испытаніе молока кормилицы должно производить нѣсколько разъ и въ разное время, потому что различная пища имѣетъ большое вліяніе на качество молока. Кроме того, при испытаніи кормилицы, нужно смотрѣть на собственнаго ея младенца, котораго здоровье есть лучшее доказательство здоровья его матери и годности ея въ кормилицы. Во все время кормленія грудью новорожденнаго, кормилица должна соблюдать чистоту и порядокъ, имѣть тихій и чуткій сонъ, охотно заниматься своимъ дѣломъ, любить своего питомца и заботиться о немъ, быть послушною, услужливою, веселою, довольною, несварливою съ другими людьми.

### Объ оспопрививаніи.

Оспопрививаніе есть одна изъ легчайшихъ операцій, и состоитъ во внесеніи подъ кожу человѣка матеріи коровьей предохранительной оспы, чрезъ что въ тѣлѣ человѣка происходитъ прививная, легкая оспа, уничтожающая въ немъ расположеніе заразиться натуральною, опасною оспою.

Успѣхъ оспопрививанія зависитъ отъ доброты матеріи коровьей предохранительной оспы, отъ прочности прививки и отъ воспріимчивости дѣтей.

Коровья оспенная матерія получается отъ дойныхъ коровъ, у которыхъ она появляется на вымѣ въ особенныхъ оспенныхъ пузырькахъ; а предохранительная — отъ людей, которымъ хорошо была привита коровья оспа, снятая въ опредѣленное время.

Вѣрные признаки хорошей коровьей оспы: 1) оспенная сыпь появляется на вымѣ у дойной коровы; 2) она представляетъ круглые, а чаще неровные, плоскіе, даже впалые пузырьки, проникающіе глубоко въ вымя; 3) эти пузырьки бывають по срединѣ сине-зеленоваты, мягки, а по окружности синекрасноваты, тверды и рожистовоспалены; 4) они принимаютъ видъ чирьевъ, заражаютъ оспою женщину, которая доитъ корову; 5) сама корова притомъ нѣсколько дней хвораетъ и получаетъ лихорадку — жажду, жаръ, потерю позыва на ѣду и жвачку.

Лучшее время для собиранія матеріи коровьей оспы есть то, когда у оспенной коровы пройдетъ лихорадка, и она начнетъ ѣсть кормъ, т. е. между 6—9 днемъ по появленіи пузырьковъ; матерія берется изъ цѣльныхъ, прозрачныхъ пузырьковъ посредствомъ ланцета, или прививной иглы, и помѣщается между двухъ стеклышекъ, въ стеклянныя трубочки или же ею намачиваются ниточки; собранная такимъ образомъ матерія высушивается и хранится въ холодномъ и темномъ мѣстѣ. Собирая матерію на стеклышки, нужно между ними класть кружокъ бумаги, для того, чтобы стеклышки не касались другъ друга и не растирали бы матеріи.

Оспу прививають во всякомъ возрастѣ и во всякое время года; оспо-

бенно, когда нужно предохранить дѣтей отъ натуральной оспы, то можно прививать ее дѣтямъ чрезъ недѣлю отъ рожденія, но если послѣдняя нигдѣ не свирѣпствуетъ и прививаніе оспы предоставляется нашему произволу, то гораздо лучше прививать оспу дѣтямъ послѣ первой половины перваго года, и притомъ весною или лѣтомъ.

Оспу прививаютъ обыкновенно на верхней и передней части плеча подъ толстою плечевою (дельтовидною) мышцею. Матерія, способная для прививанія, берется отъ коровы изъ ея оспеннаго прыща, или у привитаго дитяти, изъ его еще прозрачнаго прыща, т. е. между 8 и 9 днемъ отъ прививанія. Если прививаемъ свѣжую оспенную матерію, то дитя съ зрѣлымъ оспеннымъ прыщомъ, и то дитя, которому хотимъ привить оспу, держится на колѣняхъ женщиною, сидящими съ лѣвой и съ правой стороны оспопрививателя, который прививною иглою, или маленькимъ ланцетомъ, проникаетъ въ зрѣлый оспенный прыщъ, съ краю его, и кончикомъ ланцета захватываетъ немного прозрачной матеріи: потомъ своею лѣвою рукою онъ беретъ ручку дитяти, которому намѣренъ привить оспу, немного напрягаетъ подъ нею кожу подъ головкою плеча, и вонзаетъ ланцетъ или иглу косвенно подъ кожицу, проникая не болѣе, какъ на линію, послѣ этого онъ поднимаетъ ручку дитяти и движетъ ее взадъ и впередъ, прижимаетъ немного ланцетъ большимъ пальцемъ своей лѣвой руки, и извлекаетъ инструментъ, какъ бы стирая съ него прививную матерію; такимъ образомъ дѣлаются по три прививки на обѣихъ рукахъ дитяти. Показывающуюся кровь не должно вытирать, но обождать, пока она сама не засохнетъ. Если для прививанія употребляется сухая оспенная матерія, то ее нужно на стеклышкѣ прежде овлажить чистою водою, потомъ взять ее на кончикъ ланцета и поступать далѣе, какъ съ свѣжею матерію. Привитое мѣсто покрывается компрессомъ и слегка повязывается бинтомъ.

Если оспенная матерія была настоящая и привита удачно, т. е. проникла въ тѣло дитяти чрезъ его всасывающіе сосуды, то прививная (предохранительная) оспа бываетъ настоящая. Въ противномъ же случаѣ или совсѣмъ не привьется, или будетъ ложная. Та и другая, равно какъ и прививной вариолоидъ описаны въ 1-й части. Если по прошествіи 5—9 дней прививанье окажется не удавшимся, то его можно повторить. Когда по прошествіи 10-ти лѣтъ послѣ прививанія, появится опасная натуральная оспа, и есть сомнѣніе въ успѣшной предохранительности перваго прививанія, то его также можно повторить; если первое прививаніе было успѣшно, то второе не удастся; но во всякомъ случаѣ вторичное оспопрививаніе бываетъ безвредно, и успокоиваетъ родителей на счетъ безопасности ихъ дѣтей отъ натуральной оспы (см. предохранительная оспа).

## НАСТАВЛЕНІЕ

### ОБЪ ОЖИВЛЕНІИ МНИМОУМЕРШИХЪ ВЪ РАЗНЫХЪ СКОРОПОСТИЖНЫХЪ СЛУЧАЯХЪ ОБМИРАНІЯ (СМЕРТОПОДОБІЯ).

Такъ какъ обмираніе или смертоподобіе есть высшая степень обморока, о которомъ изложено въ этой части лѣчебника въ числѣ первыхъ болѣзней, то здѣсь подлежатъ разсмотрѣнію только тѣ виды высшей степени обмиранія, въ которомъ тѣло только обмершаго человѣка нельзя отличить отъ дѣйствительнаго не загнившаго еще трупа, которое встрѣчается въ разныхъ скоропостижныхъ случаяхъ отъ вѣшнихъ вліяній, какъ то: утопленія, задушенія, замерзанія, пораженія молніею, разныхъ газовъ и паровъ, давленія и случая отравленія; слѣдовательно сюда принадлежатъ: *утопленники, давленники, замерзшіе, пораженные молніею, задохшіеся* отъ вредныхъ паровъ и газовъ, *давленные и отравленные.*

### Утопленники.

Обмираніе (смертоподобіе) отъ утопленія есть самое частое. Утонувшій и вынутый человѣкъ походитъ на трупъ, руки и ноги, особенно въ пальцахъ окостенѣвшіе, глаза выпучены, либо закрыты, лицо красное багровое, языкъ припухшій, иногда виситъ изъ рта, нѣтъ слѣдовъ ни дыханія, ни кровообращенія, но грудь и животъ какъ бы возвышенны. Не смотря однако на всѣ эти признаки смерти, утопленники нерѣдко бываютъ оживляемы.

Утопшіе умираютъ отъ задушенія, по причинѣ недостатка воздуха. хотя вода у нихъ и попадаетъ въ желудокъ и въ гортань, а изъ нея и въ легкія, однако не она бываетъ причиною смерти, а недостатокъ атмосфернаго воздуха. Но утопленники умираютъ и отъ удара, если человѣкъ, бросившійся въ воду, былъ пьянъ, волнуемъ сильными страстями, если вода очень холодна и паденіе въ воду послѣдовало головою внизъ съ высокаго мѣста, либо, сидя на краю судна, подвергшись головокруженію, свалился оттого въ воду. Но этотъ ударъ (пострѣлъ), по оживленіи утопшаго, не оставляетъ послѣ себя никакихъ послѣдствій (паралича), замѣчаемыхъ послѣ обыкновеннаго пострѣла \*).

\*) Въ подтвержденіе этого, былъ не давно у меня одинъ случай. Ночью 11-го на 12-е число мая 1866 года, съ борту парохода братьевъ Каменскихъ, недалеко отъ Казанской Бакалдинской пристани, упалъ въ Волгу пассажиръ, повѣренный Красноярскаго 1-й гильдіи купца. Пока пароходъ остановился, пока матросы на лодкѣ нашли его въ водѣ, прошло съ часъ времени. Съ животрепещущимъ участіемъ Пермскаго губернатора Ш., ѣхавшаго также на пароходѣ, мы оживили окочевѣвшій трупъ утопленника въ теченіе 4-хъ часовъ нашей неотступной дѣятельности; а сдѣлавное мною ему за непмѣнимъ дацета, перочиннымъ ножичкомъ кровопусканіе видимо ускорило врачебную помощь. Первое слово оживленнаго Ок—ва было,

Утонувшій тѣмъ вѣрнѣе возвращается къ жизни, чѣмъ скорѣе онъ былъ вытаскень изъ воды и чѣмъ ранѣе предпринимаются способы его оживленія — чрезъ  $\frac{1}{2}$  часа; иногда однако оживляли утопшихъ, находившихся подъ водою нѣсколько часовъ и даже сутки. Но людей слабыхъ, страждущихъ удущемъ, чахоточныхъ, волнуемыхъ страстями, расположенныхъ къ удару, съ полнымъ желудкомъ, беременныхъ женщинъ, рѣдко удается оживлять, хотя бы они находились и нѣсколько минутъ подъ водою. Если утонувшій предъ тѣмъ былъ ушибень въ голову и пр., то его оживить уже трудно. Грубые приемы во время вытаскиванія утопленнаго изъ воды, качаніе его на бочкѣ съ понижею головою къ груди или закатившеюся къ спинѣ, также могутъ сдѣлать тщетными всѣ попытки оживленія.

Утопленника, находящагося въ водѣ, нужно прежде вынуть изъ нея. Въ чистой свѣтлой и не глубокой водѣ отыскать его не трудно: въ глубокой, мутной, тинистой рѣкѣ, искусные пловцы и водолазы могутъ отыскать утопленника; но когда ихъ нѣтъ, то для этого можно употребить длинный шестъ съ развилчатымъ на концѣ полугружіемъ въ видѣ кухоннаго ухвата; рыболовный сакъ въ деревняхъ есть вездѣ и можетъ наскоро быть для этого хорошимъ орудіемъ.

Прежде извлеченнаго изъ воды утопленника откачивали на бочкѣ, на простынѣ и пр., въ томъ предположеніи, чтобы изъ него вылить воду; но этотъ приемъ вреденъ и бесполезенъ, потому что онъ не выливаетъ воды изъ груди утопшаго и отнимаетъ драгоценное время для употребленія другихъ средствъ. Гораздо безопаснѣе извлеченнаго изъ воды утопленника положивъ на правый бокъ и поддерживая рукою, приложенною ко лбу, голову его, приводить все тѣло въ движеніе. Это способствуетъ къ его оживленію и въ это время нужно поскорѣе раздѣть до нага, вытереть сухими теплыми суконками и покрыть теплыми одѣялами; сначала нужно осмотрѣть и очистить ротъ и носъ отъ слизи, тины, песку, пѣны и пр., потомъ на простыняхъ или носилкахъ или на покойной повозкѣ, на которыхъ голову его держать выше прочаго тѣла, перенести его въ ближайшій теплый домъ, гдѣ и положить на постели или на соломѣ на лѣвый бокъ, покрыть слегка теплыми шерстяными одѣялами, и по мѣрѣ того, какъ эти покрывала охлаждаются, замѣнять ихъ новыми, теплыми; въ ясную и теплую погоду опыты оживленія утопшаго можно дѣлать на берегу рѣки. Послѣ раздѣванія и осушенія тѣла тотчасъ производить вдуваніе воздуха. Если челюсти судорожно сомкнуты, то въ нихъ втирается теплое масло, камфорная мазь, къ щекамъ прикладываются грѣлки, а между тѣмъ воздухъ вдувается чрезъ ноздрю 20—30 разъ сряду, либо ртомъ здороваго и широкогрудаго человѣка, либо трубочкою изъ тростника, писчаго пера,

---

что сѣвши на бортъ парохода, съ нимъ сдѣлалось головокруженіе и онъ болѣе ничего не помнитъ, значить, у него былъ ударъ, отъ котораго онъ спасень безъ вредныхъ послѣдствій.

изъ свернутой березовой коры и пр. Воздухъ вдвуть сильно, но прерывисто, какъ бы поддѣлываясь подъ настоящее дыханіе и не слишкомъ расширять легкія. По разжатіи челюстей для вдвванія въ легкія чистаго атмосфернаго воздуха, врачи выдумали множество различныхъ вдввательныхъ трубокъ, но ихъ можно замѣнить обыкновеннымъ небольшимъ *раздввательнымъ мѣхомъ*, который въ деревняхъ, кузницахъ и въ домахъ для раздвванія углей въ трубѣ самовара найдется всегда; трубку мѣха, обернутую мокрою холстиною, кладутъ въ ротъ обмершаго, плотно къ ней прижимаютъ губы его, закрываютъ ноздри, и потомъ повторительно дѣйствуютъ раздввательнымъ мѣхомъ. Но вдввать воздухъ мѣхомъ нужно не сильно и не долго, чтобы вмѣсто пользы не причинить вреда; особенно если будутъ замѣнены движенія сердца, то прекратить вдвваніе воздуха и употребить возбуждающія средства. Опыты показали, что вдвваніе воздуха чрезъ носъ бываетъ успѣшнѣе, нежели чрезъ ротъ, вѣроятно потому, что ноздри составляютъ настоящій проходъ для воздуха и при обыкновенномъ дыханіи.

Во время вдвванія воздуха и послѣ онаго, нужно прибѣгнуть къ *трениямъ тѣла* при вышеупомянутой предосторожности: сначала нужно грѣпко и долго тереть подошвы щетками, потомъ теплыми субонгами и голою рукою ляжки, плечи, животъ, ложечку спинну; никогда не должно тереть груди; не снимать одѣяль, особенно съ живота; наконецъ тереть лицо, руки, ноги разными теплыми спиртами, камфорнымъ, муравейнымъ, перечною настойкою, горчичною наливкою, хреновою водкою, нашатырнымъ спиртомъ, растворомъ золы или поваренной соли въ теплой водѣ и послѣ обмывать ихъ водою.

Постепенное согрѣваніе утопленника есть важнѣйшее средство для его оживленія; для этого утопшаго, лежащаго на постели или соломѣ, покрывъ теплыми одѣялами, не обвертывая однако его шеи, согрѣвать *теплыми киртичами*, завернутыми въ холстину или сукно, *бутылками* и *кувшинками* съ *горячею водою*, длинными и узкими мѣшками съ горячею золою и теплымъ сухимъ мелкимъ пескомъ, солодомъ, отрубями, сѣнною трухою и смѣнять ихъ новыми, теплыми, по мѣрѣ того, какъ прежнія простываютъ; всѣ эти грѣлки кладутся къ ногамъ, рукамъ, подъ мышками, водить ими вдоль спины, но не класть ихъ на грудь, которую можно покрывать *пузырями*, до половины наполненными горячею водою, теплыми шубами, въ жаркое ясное время подвергать утопленника дѣйствию солнечной теплоты, посадить его въ теплую ванну, отъ 28 до 30° Реом., и сначала тѣмъ ниже, чѣмъ холоднѣе вода и время года; съ утопленниками, бывшими подъ льдомъ, нужно поступать, какъ съ замерзшими.

Раздражающіе клистиры назначаются послѣ тренія, сначала ставятся слабые, потомъ сильнѣйшіе; они должны проникать высоко въ кишечный каналъ; для этого клистирная костяная или каучуковая трубка должна быть довольно длинна, вводить ее глубоко въ прямую кишку, клистирную жидкость впрыскивать стремительно, при чемъ бедра приподнять, а туловище

укрѣпить. Вливъ въ кишку утопленника клистирную жидкость, нужно слегка растереть животъ; количество клистирной жидкости должно быть около  $1\frac{1}{2}$ —2 стакановъ. Клистирная жидкость готовится изъ мягчительныхъ, слизистыхъ отваровъ — ячмой, овсяной крупы, листьевъ рожы, проскурняка, изъ молока, изъ настоя александрійскаго листа съ поваренною или англійскою солью, съ уксуомъ, простымъ и винограднымъ виномъ, съ камфорнымъ масломъ, горчицею и проч. (№ 95) тутъ же можно употребить; 1) раздраженіе глотки, которое удобнѣе производить перомъ, намазаннымъ масломъ и вводимымъ глубоко въ ротъ до самаго пищевого канала, и при которомъ нужно слегка ударять обмершаго по спинѣ, тереть его ложечку и держать въ сидячемъ положеніи, наклонивъ голову впередъ, что дѣлается не для произведенія рвоты, появленіе которой однако всегда благопріятно, а для возбужденія жизненности въ этихъ органахъ; 2) нюхательныя и чихательныя средства. Для этого употребляется щекотаніе ноздрей перомъ, держаніе подъ носомъ сильно пахучихъ средствъ: дымящагося пера, спирта нашатырнаго и оленьяго рога, крѣпкаго уксуса, гофманскихъ капель; втираніе эфировъ и спиртовъ въ виски, бедра, животъ, накапливаніе ихъ на ложечку, прикладываніе свѣжихъ листовъ, покрываніе утопленника солодомъ, лошадинымъ навозомъ, также можно класть въ ротъ его острия вещества, впускать гофманскія капли.

Кровоусканіе назначается только тогда, когда утопленникъ полнокровень, молодъ и по тѣлосложенію своему расположенъ къ кровавому удару (пострѣлу), когда утонувшій предъ тѣмъ былъ пьянъ, объѣлся, сильно огорчился, ушибся; равнымъ образомъ кровоусканіе бываетъ нужно, когда по возвращеніи утопленника къ жизни, онъ дышетъ трудно, тоскливо и съ перемежкою, когда лицо у него синее, жилы напряжены кровью, когда онъ самъ находится въ безчувственности, бредитъ и жалуется на колотье въ груди; въ такихъ случаяхъ умѣренное кровоусканіе скорѣе оживляетъ утопленника и отвращаетъ воспаленіе легкихъ. Но у людей нѣжныхъ, худыхъ, блѣдныхъ, наружность тѣла которыхъ совершенно противоположна вышеописанной, кровоусканіе можетъ быть вредно, и потому нужно, чтобы оно производилось по совѣту врача и въ его присутствіи. Кровь пускать лучше ланцетомъ, нежели шнеперомъ. Мѣсто, гдѣ предполагаютъ пустить кровь, нужно прежде крѣпко растереть теплою суконкою; крови выпускать разомъ нужно не болѣе фунта; если, по разрѣзѣ вены, кровь не потечетъ, то продолжать треніе руки или ноги, парить ихъ горячею мокрою губкою, а ладони и подошвы тереть щеткою, шевелить пальцами и не накладывать бинта на раночку вены до тѣхъ поръ, пока остается хотя слабая надежда къ оживленію утопшаго, потому что при совмѣстномъ употребленіи другихъ возбуждающихъ средствъ, иногда кровь послѣ показывается изъ раночки, но въ случаѣ сажанія утопшаго въ ванну нужно перевязать ему раночку.

Какъ скоро начинаютъ показываться первые *признаки возвращаю-*

*щейся жизни*, какъ-то: слабое движеніе около глазъ и вѣкъ, легкія судороги на шеѣ и около рта, мягкость кожи, гнѣбость суставовъ, румянецъ, теплота, біеніе жилъ, дыханіе, кашель, отхаркиваніе мокроты, вздохи, урчаніе въ животѣ, частое вздрагиваніе, въ такомъ случаѣ нужно сверхъ того вливать въ ротъ пріемы гофманскихъ капель съ водою, давать нюхать острыя пахучія вещества. А если оживленный видимо можетъ глотать, то давать еще теплый чай изъ мелиссы, бузины, малины, съ виномъ, спиртомъ, но не принуждать его къ тому насильно.

Опыты оживленія нужно продолжать 6—8 часовъ, причемъ въ употребленіи всѣхъ этихъ оживляющихъ средствъ нужно соблюдать: 1) извѣстный порядокъ, въ какомъ они показаны, начиная съ легковозбуждающихъ и постепенно переходя къ сильнѣйшимъ; 2) не торопиться и не быть медленну въ дѣйствіи тѣмъ и другимъ средствомъ, потому что торопливостію и употребленіемъ вдругъ многихъ средствъ можно также погасить послѣднюю искру жизни, какъ медленностію и продолжительнымъ употребленіемъ одного и того же средства; 3) употребляя одно средство, нужно имѣть другое уже въ готовности; 4) по временамъ обмершаго нужно оставлять на нѣсколько минутъ въ покоѣ и наблюдать не покажутся ли хотя слабые признаки жизни изъ вышеописанныхъ; и 5) употребивъ всѣ способы оживленія безуспѣшно, можно начать ихъ снова и вообще нужно быть настойчивымъ въ своей цѣли и терпѣливымъ въ дѣйствіи. Наконецъ, когда вся надежда къ оживленію исчезнетъ, то нужно утопшаго положить въ теплой комнатѣ, въ нагрѣтой постели, покрыть его теплыми одѣялами, приставить къ нему надлежащій надзоръ, и не прежде позволить похоронить, какъ при появленіи признаковъ трупнаго гніенія.

## Повѣшенные, задушенные.

Повѣшенные и задушенные имѣютъ вздутое синее лицо, выпученные глаза, иногда кровавую пѣну у рта, распухшій, высунувшійся изъ рта, языкъ и пр.; подбрюшныя вены головы и шеи сильно напряжены, у повѣшенныхъ находится на шеѣ краснобагровая полоса и очень часто напряженъ дѣтородный удъ. Повѣшеніе и удавленіе производятъ ударъ (пострѣлъ) въ мозгъ и легкіхъ, т. е. въ обоихъ органахъ накопленіе крови, которое и прекращаетъ ихъ дѣйствіе. Вообще повѣшенные умираютъ отъ пострѣла въ мозгъ по воспрепятствованному веревкою непстеченію крови отъ головы къ груди, а удушенные — отъ пострѣла въ легкіхъ, задавляемыхъ, при недостаткѣ воздуха, немѣрнымъ множествомъ черной крови; но у тѣхъ и у другихъ начальная причина есть прекращенное дыханіе.

Повѣшенные и задушенные рѣдко оживаютъ, хотя имѣется много примѣровъ, что повѣсившіеся самоубійцы и преступники опять приходили въ память. Во Флоренціи повѣшенные такъ часто оживали, что этотъ родъ казни правительство принуждено было отмѣнить. Старики,

повѣшенные и задушенные, рѣдко оживаютъ. Чѣмъ толще, шире и мягче веревка, чѣмъ слабѣе петля, тѣмъ болѣе надежды къ оживленію.

При спасеніи повѣшенныхъ, прежде всего нужно, снмая повѣшеннаго одной рукой, чтобы тѣло не упало на землю и не ушиблось, поддерживать его, а другою разрѣзать петлю; но для этого требуется много силы, и потому лучше скорѣе призвать на помощь другаго человѣка, который обхватываетъ обѣими руками тѣло повѣшеннаго, между тѣмъ какъ первый разрѣзываетъ петлю. Потомъ повѣшеннаго и задушеннаго нужно совѣмъ раздѣть и перенести въ мѣсто, приличное для оживленія, которое бы имѣло свѣжій, чистый, прохладный воздухъ; лѣтомъ лучше всего оживлять повѣшенныхъ и удушенныхъ подъ открытымъ небомъ.

Если повѣшенный или задушенный показываетъ еще признаки жизни и тихо дышетъ, тепель, въ лицѣ его замѣчаются легкія судороги, то онъ оживаетъ скоро, когда, при возвышенномъ положеніи головы, ему на лицо и ложечку прыскаютъ холодную воду, навѣваютъ на него холодный воздухъ, или кладутъ на вѣтрѣ, щекотаютъ въ носу и во рту перышкомъ, омоченнымъ въ масло, даютъ нюхать нашатырный спиртъ, истертый лукъ, хрѣнъ, мѣсто около гортани слегка жмутъ и трутъ уксусомъ, спиртомъ, водою.

Во время растираній, и даже тотчасъ по снятіи съ петли, повѣшенному или задушенному очень часто нужно пустить кровь, и это тѣмъ необходимо, чѣмъ краснѣе и вздутѣе лицо и напряженнѣе вены; остановившюся въ теченіи кровь нужно подгонять къ отверстию вены треніемъ тѣла въ направленіи къ сердцу; кромѣ того, нужно ставить пиявицы за ушами, кровесосныя банки (рожки) на тѣмени, затылкѣ, шеѣ; искривленные сжатые хрящи дыхательнаго горла нужно выправить перстами.

Вдуніе воздуха здѣсь чрезвычайно важно, потому что смерть происходитъ именно чрезъ отнятіе его; оно производится точно также, какъ показано для утопшихъ. Если притомъ животъ стянуть и поджать, то нужно давить и тереть грудь и животъ снизу вверхъ и обратно, для того, чтобы привести въ движеніе грудобрюшную преграду; но если животъ вспученъ, напряженъ и великъ, то должно его тереть и давить, отъ лобка къ груди, спину вверхъ посредствомъ широкаго полотенца, свернутой простыни, куска кожи и пр. Согрѣваніе не такъ важно, какъ для утопленниковъ, а потому и самую теплоту употреблять въ меньшей степени, по тому же однако примѣру, какъ для послѣднихъ.

За то здѣсь очень полезны смягчительныя и раздражающіе клистиры съ солью, уксусомъ, (№ 95); ноги ставить по колѣна въ теплую воду съ золою, горчицею, грѣть ихъ грѣлками, тереть щетками, какъ и утопленниковъ (см. утопшіе), къ остриженной головѣ прикладывать холодныя примочки изъ 10-ти частей селитры, 14-ти частей нашатыря, 16-ти частей поваренной соли и 80-ти частей воды, обмывать голову холодною водою, испытать простую теплую ванну и съ золою; для повѣшенныхъ иногда употребляли съ пользою земляную ванну, какъ для пораженныхъ молніею (см. убитые молніею).



Когда оживленные могут глотать, то нужно давать имъ чай изъ мелиссы, ромашки, бузины съ виномъ, уксуомъ, лимономъ. Очень часто послѣ оживленія остается оцѣпенѣлость въ тѣлѣ, головокруженіе, сонливость; здѣсь нужно *пособіе* или *советы врача*, а между тѣмъ держать голову по выше въ постели, прикладывать къ ней холодныя примочки, пустить кровь, прохладать въ постели воздухъ, ставить мягчительныя клистиры изъ овсянаго отвара съ масломъ, давать слабительныя, кислое питье. Сжатое на шеѣ петлею мѣсто нужно лѣчить какъ ушибъ (см. эту болѣзнь). Опыты оживленія нужно производить при возвышенномъ положеніи головы обмершаго, и даже держать его въ сидячемъ положеніи \*).

## Замерзшіе.

Отъ продолжительнаго вліянія сильнаго холода кожа дѣлается блѣдною и нечувствительною, появляется тоска, усталость, тягость въ головѣ, непреодолимая сонливость, безчувствіе и оцѣпенѣніе всего тѣла, которое дѣлается блѣднымъ, безкровнымъ, подобнымъ воску, холоднымъ и твердымъ какъ ледъ. Это доказываетъ, что сильный холодъ сжимаетъ тѣло, прогоняетъ кровь ко внутреннимъ частямъ, особенно къ мозгу и сердцу, что здѣсь смерть слѣдуетъ также отъ задушенія и удара (пострѣль); но такъ какъ все это происходитъ тихо и постепенно, то легкія и мозгъ не претерпѣваютъ здѣсь такихъ быстрыхъ и насильственныхъ перемѣнъ, какъ при утопленіи, удавленіи и др., а потому спасеніе замерзшихъ удастся, чаще, потому что замерзшее тѣло не подвергается гніенію; а какъ достоверно нельзя узнавать, сколько времени замерзшій находится въ такомъ состояніи, то всегда и надъ всякимъ замерзшимъ нужно производить опыты оживленія.

При перевозкѣ и раздѣваніи замерзшаго, нужно соблюдать величайшую осторожность, иначе, по хрупкости тѣла, легко можно отломить часть носа, губъ, пальцы; всего лучше перевозить его тихо, на саяхъ, устланыхъ снѣгомъ, сѣномъ, соломой.

Согрѣваніе есть важнѣйшее средство для оживленія замерзшихъ, и должно быть производимо *сколько возможно постепенно*. Посему замерзшаго нужно перенести въ нетопленное мѣсто, не подверженное однако холодному сквозному вѣтру, и здѣсь, для оживленія его, употреблять снѣгъ, который, въ отношеніи къ теплотѣ замершаго, можно почитать теплымъ средствомъ. Постепенное таяніе снѣга лучше всего исподоволь нагрѣваетъ тѣло замерзшаго. Пользу снѣга въ этомъ случаѣ знаетъ всякій русскій простолюдинъ. Дикіе канадцы замерзшаго на охотѣ человека зарываютъ въ снѣгъ, дѣлая надъ нимъ родъ шалаша изъ снѣга, и спокойно ожидаютъ его оживленія до слѣдующаго утра.

\*) При нихъ и при употребленіи всѣхъ этихъ оживляющихъ средствъ нужно соблюдать то же, что показано въ послѣдней статьѣ объ утопшихъ.

Для этого замерзшаго, раздѣтаго, кладутъ на снѣжную постель, покрываютъ его всего, кромѣ рта и носа, снѣгомъ же, который прижимаютъ довольно плотно къ тѣлу, но временамъ прибавляютъ новаго и ожидаютъ, пока члены не сдѣлаются подвижнѣе, а тѣло теплѣе (теплота при томъ опредѣляется термометромъ). При недостаткѣ снѣга, тѣло замерзшаго покрывается простынями, омоченными въ холодной водѣ, смѣшанной съ льдомъ; эти простыни, по мѣрѣ того, какъ онѣ нагрѣваются, замѣняются новыми или обливаются свѣже-холодною водою; либо положить тѣло въ корыто и обливать его холодною со льдомъ водою, но такъ, чтобы вода не попала въ ротъ и носъ, и чтобы ледъ не ушибалъ и не давилъ замерзшаго.

Если при этомъ восстанавливается подвижность членовъ, что происходитъ въ снѣгу чрезъ часъ, а въ водѣ со льдомъ тогда, когда ледяная кора, образовавшаяся около всего тѣла, начнетъ таять, то тѣло слегка обтираютъ холодными полотенцами, переносятъ его въ холодную комнату и кладутъ въ негрѣтую постель, гдѣ и начинаютъ его тереть фланелью, постепенно согрѣваемую. Потомъ начинаютъ вдвухъ и притомъ мѣхомъ, а не ртомъ, для того, чтобы вдвухъ холодный, а не теплый воздухъ (о вдвухъ воздуха мѣхомъ см. въ оживленіи утопшихъ). У человѣка не слишкомъ замерзшаго, но еще дышущаго, вдвухъ воздуха не нужно; но согрѣвать его нужно точно также, какъ и совсемъ замерзшаго, иначе у него члены жестоко воспаляются и помертвѣваютъ.

Комнату, постель и вещи, употребляемыя для тренія, начинаютъ согрѣвать не скоро, постепенно и умѣренно; потомъ можно накапывать воду на ложечку, ставить клистиры, сначала холодные, ставить ноги въ теплую воду, раздражать глотку перышкомъ, класть на языкъ кусочекъ лимона, тертый хрѣнь, держать подъ носомъ нашатырный спиртъ, примачивать ложечку водою съ уксусомъ и вообще поступать какъ съ утопшимъ, съ тою разницею, что здѣсь нужна меньшая степень теплоты.

Крѣпко сомгнутыя челюсти нужно сначала растирать снѣгомъ или льдомъ, потомъ холодною водою, камфорнымъ спиртомъ; если замерзшій можетъ глотать, то нужно пить его теплымъ чаемъ изъ Melissa, бузины; къ членамъ, совершенно согрѣвшимся, пригладывать суконки, намоченныя въ тепломъ винѣ или водкѣ съ водою. Въ это время, особенно у молодыхъ полнокровныхъ людей, развивается сильнѣйшее волненіе въ крови, которое иногда производитъ горячку, воспаления, требующія врачебнаго пособія, кровопусканій, прохладнаго питья, холодныхъ примочекъ и пр. Иногда, по оживленіи замерзшаго, нѣкоторыя части его тѣла остаются негибкими и безчувственными; здѣсь нужно оттирать ихъ снѣгомъ, холодною водою, камфорнымъ спиртомъ, водою и согрѣвать съ великою осторожностію. Не смотря однако на все это, такія части нерѣдко воспаляются, покрываются пузырями и помертвѣваютъ; тутъ также необходимо пособіе врача и хирурга.

## Убитые молнією.

Признаки, по различію степени удара и пораженныхъ молнією частей, бываютъ различны. Чаше замѣчаются на груди, спинѣ, рукахъ красныя извилистыя полоски, иногда обожженные какъ бы раскаленнымъ желѣзомъ и покрытыя темными пузырьками; теченіе крови изъ ушей, изліяніе ея подъ кожей; рѣдко замѣчаются разрывы большихъ сосудовъ, спиннаго мозга, барабанной перепонки, переломы костей и пр.; послѣднее случается, когда пораженный молнією имѣлъ на себѣ тѣсное платье, и струя молніи раздѣлилась на многія вѣтви. Если пораженный молнією не тотчасъ умираетъ, то на лицѣ, въ рукахъ или ногахъ замѣчается параличъ; глаза красны, слезливы, неподвижны, лицо красное, вздутое, изо-рта и носа иногда течетъ кровь: чувствованіе и самосвѣдѣніе преобразуются; дыханіе трудное, пульсъ почти непримѣтный, иногда появляются судороги въ глазахъ, во рту, въ глоткѣ. Послѣ оживленія остается трясеніе тѣла, боль, опухоль, онѣмѣніе ногъ, большая чувствительность къ воздушному электричеству, и оттого безпокойство предъ грозюю.

Если на мѣстѣ спльнаго удара грома будетъ найдено мертвое тѣло съ вышеописанными признаками, или поврежденія на его одеждѣ, близкихъ стѣнахъ комнатъ, деревьяхъ; если въ карманѣ убитаго деньги расплавились, около трупа замѣчается чесночный или сѣрный запахъ, то можно съ вѣроятностію заключить, что покойникъ убитъ громомъ. Мы не знаемъ навѣрно, какъ ударъ молніи причиняетъ смерть; но правдоподобно то, что она убиваетъ своимъ спльнымъ пораженіемъ нервовъ и мышцъ, истощеніемъ раздражительности и чувствительности въ нихъ и мышцахъ, онѣмѣніемъ органовъ дыханія и кровообращенія.

Изъ всѣхъ родовъ обмираній, пораженные молнією напрѣже оживаютъ, и то тогда, когда у нихъ находится еще самосвѣдѣніе, дыханіе и кровообращеніе. Иногда послѣ удара грома излѣчивались прежнія застарѣлыя болѣзни, какъ послѣ электризма или гальванизма. Ударъ грома въ голову и въ стоячаго человѣка опаснѣе, чѣмъ въ бокъ сидячаго. Въ домахъ громъ болѣе оглушаетъ, а на открытомъ мѣстѣ убиваетъ до смерти.

Строенія и поля предохраняются отъ ударовъ молніи *громовыми отводами*, которые въ деревняхъ можно дѣлать изъ длинныхъ шестовъ, обвязываемыхъ прямою сухою соломю; деревья, копъ верхушки выше деревенскихъ избъ, растущія около послѣднихъ, также предохраняютъ ихъ отъ молніи. Кромѣ того, предъ наступленіемъ грозы, находясь на открытомъ мѣстѣ, не должно искать убѣжища около возвышенныхъ предметовъ, не останавливаться на горѣ, подъ деревьями, особенно высокими и гнилыми, не ѣхать ни верхомъ, ни въ повозкѣ, не остановиться, сѣсть на землѣ у дороги и подальше отъ воды. Находясь дома, нужно быть подалѣе отъ печей, стѣнъ, особенно тѣхъ, въ которыя молнія

уже однажды ударяла, въ большой высокой залѣ оставаться кромѣ того подалѣе отъ люстръ, зеркалъ, стѣнныхъ часовъ, отъ всякихъ металлическихъ вещей; избѣгать сквознаго вѣтра, затворять двери и окна, быть въ бумажномъ, шелковомъ либо шерстяномъ платьѣ безъ металлическихъ пуговицъ, не лежать на желѣзной кровати и пр. Тоже нужно наблюдать, когда гроза застанетъ народъ въ церкви, въ сходной избѣ и другомъ публичномъ мѣстѣ; оставаться на срединѣ улицы, не приближаясь къ строениямъ.

Спасеніе пораженныхъ молніею состоитъ въ возбужденіи ихъ пораженной раздражительности и чувствительности нервовъ. Для этого земляная ванна одобряется такъ же, какъ для замерзшихъ снѣжная. Въ 6—8 шагахъ отъ того мѣста, гдѣ ударилъ громъ, вырываютъ яму, кладутъ въ нее, либо ставятъ стоймя оглушеннаго, совершенно голаго, съ возвышенною головою, покрываютъ его всего, кромѣ лица, сырою землею, положивъ между зубами палочку для содержанія рта открытымъ, и оставляютъ въ такомъ положеніи нѣсколько часовъ, пока не покажутся признаки жизни; при этомъ по временамъ вдвываютъ обмершему воздухъ, впрыскиваютъ лицо спиртомъ, холодною водою. Замѣчено, что люди и животные, оглушенные первымъ ударомъ грома, приходили отъ втораго удара въ чувство и оживали. Оживленные послѣ пораженія молніею бываютъ очень слабы, сонливы, чувствуютъ головокруженіе, шумъ въ ушахъ, бредятъ; у нихъ часто остается параличъ въ рукахъ, ногахъ, лицѣ и проч., и требуютъ пособія или совѣта врача.

### Задохшіеся отъ вредныхъ паровъ и газовъ.

Признаки, замѣчаемые у людей, обмершихъ отъ вредныхъ паровъ и газовъ, по разности качества послѣднихъ и степени ихъ вредности, равно по личнымъ особенностямъ задыхающихся людей, бываютъ различны. При слабомъ и медленномъ дѣйствіи вредныхъ паровъ и газовъ происходитъ тоска, круженіе, чувство напряженія и тупая боль въ головѣ, искры предъ глазами, тягость въ груди и оцѣпенѣніе тѣла. При сильномъ и быстромъ дѣйствіи паровъ и газовъ, человекъ вдругъ получаетъ стѣсненіе въ груди, судороги и падаетъ въ безчувствіи; лицо его темно-багровое, опухшее, губы синія, языкъ припухшій; височныя и шейныя вены надуты отъ крови; рѣдко замѣчается противное, т. е. блѣдное, впалое лицо; трупъ остается долгое время теплымъ и гибкимъ, глаза остаются еще нѣсколько дней послѣ смерти выпученными и свѣтлыми, даже свѣтлѣе, чѣмъ при жизни. Люди, задыхающіеся отъ вредныхъ паровъ и газовъ, умираютъ отъ пострѣла или задушенія, т. е. отъ прилива въ большомъ количествѣ черной крови къ мозгу или къ легкимъ.

Пары и газы, наичаще причиняющіе обмираніе (смертоподобіе), суть слѣдующіе: 1) *Углекислый газъ*, образующійся во множествѣ при броженіи въ погребахъ, въ которыхъ бродитъ и выстаивается вино и пиво,

также при обжиганіи въ печахъ извести, скопляющейся въ пещерахъ, въ подвалахъ старыхъ домовъ, дворцовъ, въ глубокихъ ямахъ, колодцахъ, въ рудоконьяхъ. Онъ дѣйствуетъ вредно не только на кровь по недостатку кислорода, но и на нервы своимъ оглушающимъ качествомъ и производитъ тягость, опьяненіе, чувство стягиванія въ гортани, кислый, жгучій вкусъ на языкѣ, тяжесть головы, помраченіе зрѣнія, судороги, красносное, опухшее лицо, безпамятство и обмираніе, какъ слѣдствіе пострѣла. Воды, сильно напитанныя углекислымъ газомъ, производятъ тяжесть и круженіе головы, помраченіе зрѣнія и опьяненіе. Послѣ смерти, причиняемой этимъ газомъ, кровь бываетъ очень темна, а въ мышцахъ долго остается раздражительность. 2) *Азотъ, удушливый газъ*, отдѣляющійся въ большомъ количествѣ лѣтомъ въ отхожихъ мѣстахъ и вообще при гніеніи животныхъ тѣлъ, также въ мѣстахъ, наполненныхъ людьми и животными, при ихъ дыханіи, какъ напр. въ тюрьмахъ, больницахъ, церквахъ, сходбищныхъ избахъ и т. п., гдѣ воздухъ долго не возобновляется и гдѣ азотъ, будучи легче воздуха, въ запертыхъ мѣстахъ наполняетъ ихъ верхніе слои. Точно также вредитъ атмосферный воздухъ въ комнатахъ, когда изъ него бываетъ поглощенъ другими веществами кислородный газъ, какъ это случается въ комнатахъ, наполненныхъ растениями и покрытыхъ скипидарнымъ лакомъ, сильно поглощающимъ кислородъ. Чистый азотъ, безъ примѣси угольного газа, производитъ только обмираніе, и потому люди и животныя, обмершія отъ него, скоро приходятъ въ чувство, когда ихъ заблаговременно вынесутъ на свѣжій воздухъ. Но онъ рѣдко бываетъ чистый, и обыкновенно находится въ соединеніи съ угольнымъ, сѣрно-водороднымъ амміачнымъ газами; въ такомъ смѣшеніи онъ бываетъ именно въ отхожихъ мѣстахъ, навозныхъ ямахъ, могилахъ; по этому чистодѣлы, чистильщики колодцевъ и помойныхъ ямъ, могильщики и рудокопы наичаще бываютъ подвержены этого рода обмиранію или смертоподобію (см. объ этихъ рабочихъ людяхъ въ описаніи поселянъ по ихъ быту и званію). 3) *Газы*, отдѣляющіеся при горѣніи — *углекислый и углеродный*, суть измѣненный углекислый, дѣйствуя подобно послѣднему, въ легкой степени, составляютъ то, что называется *чадъ* и причиняютъ *угаръ* (см. болѣзнь угаръ). Подобно угольнымъ газамъ дѣйствуютъ: спиртные напитки, въ излишествѣ испитые, одуряющія растенія (бѣлена, красавица, опій, зеленая конопля, макъ, дурманъ, куколь и т. п.) и подмѣшенное ими пиво. 4) *Водородный газъ*, въ сильной степени его дѣйствія, тоже одуряетъ, но въ легкой степени, и чистый, подобно вину умѣренно испитому, онъ возбуждаетъ бодрость въ тѣлѣ, веселость, говорливость, чувство благосостоянія. Если водородный газъ содержитъ части сѣры или фосфора, какъ то бываетъ въ копяхъ каменнаго угля, колодцахъ, погребахъ, ямахъ, отхожихъ мѣстахъ и въ строеніяхъ, бывшихъ долго запертыми, то онъ получаетъ вонючій запахъ гнилыхъ яицъ или чеснока, и тогда, даже въ маломъ количествѣ, дѣйствуетъ какъ одуряющій ядъ, и если не убиваетъ мгно-

венно, то производитъ сильное изнеможеніе тѣла, обморокъ и смерть. Присутствіе сѣроводороднаго газа въ ямѣ и пр., лучше всего можно узнать чрезъ то, что кусокъ пропускной бумаги, омоченный въ растворъ свинца и повѣшенный въ гнилой ямѣ, чернѣетъ. Ожившіе послѣ обмиранія отъ этого газа очель медленно выздоравливаютъ. Многія благовонныя растенія, отличающіяся своимъ пронзительнымъ, тяжелымъ запахомъ, также приводятъ въ опьяненіе, безчувствіе и обмираніе: спящіе между кипами свѣжаго чая, шафрана, люди, кочующіе на свѣжемъ ароматномъ сѣнѣ, въ коноплѣ, во время ея цвѣтенія, страстныя любительницы благовонныхъ цвѣтовъ: гвоздики, туберозы, ландышей, бобовъ, горошка, лилій, содержація ихъ во время цвѣтенія въ своихъ спальняхъ, нерѣдко бываютъ находимы поутру въ безчувственномъ состояніи и обмираніи.

Прим. Всѣ эти пары и газы, причиняя обмираніе людей, находятся въ различномъ смѣшеніи между собою, и почти никогда не встрѣчаются въ чистомъ состояніи.

Обмираніе въ этихъ случаяхъ, происшедшее въ ямѣ, погребѣ, отхожемъ мѣстѣ, тѣмъ опасно, что попавшихъ туда обмершихъ трудно оттуда вытащить и подать имъ заблаговременно помощь, и что такое извлеченіе ихъ иногда сопряжено съ опасностію и даже невозможностію для самихъ спасителей. Эта потеря времени тѣмъ невозвратнѣе, чѣмъ неспособнѣе къ дыханію воздухъ, въ которомъ находится обмершій.

Предосторожности въ отвращеніе обмиранія въ рудокопныхъ ямахъ состоятъ въ томъ, что работники, день или болѣе не бывшіе въ ямахъ, поутру, вступая въ нихъ, должны прежде удостовѣриться въ хорошемъ качествѣ ямнаго воздуха. Въ рудокопняхъ особенно накапливается водородный и азотный газы. Если зажженный факель, впущенный въ яму на веревкѣ по блоку, будетъ горѣть свѣтлымъ, обыкновеннымъ пламенемъ, то можно заключить, что въ ямѣ находится хорошей атмосферный воздухъ; но если пламя факела тускнѣетъ или совсѣмъ гаснетъ, либо же производитъ вспышку, то нужно очистить рудокопню отъ вредныхъ газовъ, накуривъ ее хлоридными парами. Для заженія водороднаго газа одинъ работникъ, одѣтый въ мокрое холстинное платье, укрѣпивъ на концѣ длиннаго шеста горящую свѣчу, спускается въ яму, ложится на брюхо и зажигаетъ воздухъ, послѣ вспышки проходитъ вся опасность, и въ яму могутъ входить прочіе работники. Если въ какой либо части ямы газъ отдѣляется со свистомъ въ видѣ паутины, или бѣлыхъ нитей, то работникъ старается рукою захватить такую паутину прежде, нежели она загорится. Если для отвода скопившейся въ ямѣ воды устроены каналы, то, во время открытія послѣднихъ, работники должны удалиться изъ ямы и не прежде въ нее входить, какъ по надлежащемъ удостовѣреніи въ здоровости воздуха, поступившаго на мѣсто бывшей въ ямѣ воды. Для возобновленія воздуха въ ямѣ нужно увеличить въ ней число продушинъ, умножить сообщеніе между собою подземныхъ ходовъ, замазать щели, изъ которыхъ отдѣляются газы, уда-

лить стоячія воды. Предохранительныя мѣры во время чищенія отхожихъ мѣстъ, погребовъ, колодцевъ, помойныхъ ямъ, рытья могилъ, приведены въ статьяхъ описанія поселянъ по ихъ быту и званію о чистодѣлахъ, чистильщикахъ колодцевъ и помойныхъ ямъ, могильщикахъ и т. п. (см. объ нихъ особо въ этой части). Сюда же принадлежатъ: холостые выстрѣлы изъ ружья или пистолетовъ въ испорченный воздухъ, бросаніе въ ямы пучковъ хвороста или соломы, раздуваніе воздуха въ ямахъ посредствомъ пожарныхъ трубъ и кузнечнаго мѣха, вливаніе въ яму свѣжей воды, раствора негашенной извести, которая поглощаетъ углекислый газъ и пр. Предохраненіе отъ обмиранія отъ угара показано въ діететическомъ лѣченіи угара (см. угаръ). Предохраненіе отъ вреднаго дѣйствія растеній явствуетъ само по себѣ. Для предохраненія отъ вредныхъ паровъ и газовъ людей, старающихся подать скорую помощь погибающимъ, предложены разныя средства, которыя однако всѣ бесполезны, если пары и газы такъ сильны, что гаснетъ въ нихъ свѣча. Опускаясь въ такія мѣста, для спасенія задохшагося, нужно къ рукѣ привязывать веревку, конецъ которой держать человѣкъ, находящійся внѣ ямы; помощію этой веревки спускающійся въ яму даетъ знать о вредности ея воздуха, при чемъ находящіеся надъ ямою люди въ ту же минуту вытягиваютъ его за веревку, привязанную вокругъ его тѣла. Такимъ же образомъ крестьяне опускаются въ колодцы либо за оторвавшеюся бадьею, либо за чѣмъ либо другимъ. Спускающійся въ яму держитъ передъ ртомъ хлопчатую бумагу, намоченную въ нашатырномъ спиртѣ, когда въ ямѣ предполагаются кислыя пары, угольный газъ; — или же фланель, намоченную въ уксусѣ, когда въ ямѣ тнилыя пары, сѣрный водородный газъ; этими жидкостями можно опрыскивать платье, покрыть себя платками, намоченными простою водою, либо уксусомъ.

Способы и средства къ оживленію задохшихся отъ паровъ и газовъ: Если обмершій, извлеченный изъ ямы, еще не совсѣмъ оцѣпенѣлъ, то онъ скоро приходитъ въ чувство, когда его посадятъ или поставятъ на ноги, подымутъ голову вверху, перенесутъ его на свѣжій прохладный воздухъ, дадутъ ему немного холодной воды съ уксусомъ, чаю изъ мелиссы, sprыснутъ лицо и грудь, обольютъ голову холодною водою, станутъ дуть въ лицо раздувательнымъ мѣхомъ. Эти же средства помогаютъ и тѣмъ, которые начинаютъ чувствовать дѣйствіе на нихъ угольнаго чада, растительныхъ испареній. Если пары происходятъ отъ минеральныхъ кислотъ, то нужно полуобмершаго заставить вдыхать и принимать по каплямъ нашатырный спиртъ (2—5 капель на рюмку воды), поить его виннымъ спиртомъ съ молокомъ.

Задохшагося, безъ всякихъ признаковъ жизни, раздѣть, положить на свѣжемъ, открытомъ и прохладномъ воздухѣ, съ возвышенною головою и грудью, облить его холодною водою, не попадая однако ею ни въ ротъ, ни въ носъ; примачивать голову и обмывать безпрестанно лицо и грудь чистою холодною водою, держать его въ сидячемъ положеніи, а

голову прямо; лицо, грудь и ложечку повторительно издали съ силою опрыскивать водою съ уксусомъ и даже помощію сифона; къ груди, ложечкѣ, крыльцамъ прикладывать холодныя примочки, даже со льдомъ; по временамъ тереть тѣло суконками, класть его на нѣсколько минутъ въ теплую постель и опять примачивать и опрыскивать холодною водою.

Если человѣкъ задохся отъ паровъ бродящаго пива или вина, въ погребѣ, то ему нужно вдвухъ въ носъ и ротъ тѣмъ же способомъ, какой показанъ при оживленіи утопленниковъ; при вдуваніи воздуха, предъ ртомъ задохшагося надо держать тряпку, намоченную въ нашатырномъ спиртѣ; а если задушеніе произведено вонючимъ газомъ отхожихъ мѣсть, то употреблять холодную воду, лимонный сокъ, чаще водить подъ носомъ зажженныя сѣрныя спички, намачивать губы и языкъ спиртомъ или уксусомъ, и обмывать ими лицо. Кровоусушаніе назначается только при синевѣ и припухлости лица; потомъ приступаютъ постепенно къ тренію ногъ, бедръ, плечъ, груди щетками съ холодною водою или уксусомъ, хлориною кислотою, къ чихательнымъ средствамъ; ставятъ повторительно клистиры изъ холодной воды съ уксусомъ, щекочать носъ и глотку перышкомъ, смоченнымъ въ нашатырномъ спиртѣ или уксусѣ, смотря по свойству газовъ, причинившихъ обмираніе. Нужно помнить, что *спрыскиваніе и обмываніе* холодною водою суть *главныя пособія* для оживленія этихъ несчастныхъ; всѣ же другія оживляющія средства требуютъ большой осторожности и могутъ погасить и послѣднюю искру жизни, а потому ихъ можно употреблять только по совѣту врача.

Никогда не давать рвотныхъ во время продолжающагося оживленія, но произвольно происшедшую рвоту поддерживать, щекоча во рту и глоткѣ перышкомъ, омоченнымъ въ масло. Но рвотное можно дать по совѣту врача, когда, послѣ удачнаго и совершеннаго оживленія, ощущавшійся имѣеть тошноту и тяжесть въ желудкѣ. Человѣка ожившаго, свободно дышущаго и говорящаго, вытираютъ до суха, кладутъ въ согрѣтую постель, гдѣ, подъ одѣялами, трутъ его сухою фланелью, суконками, окуриваютъ можжевелникомъ, даютъ ему пить воду съ уксусомъ. При жестокой боли головы, при сильномъ неправильномъ біеніи сердца, при склонности ко сну, нужно по совѣту врача, пустить немного крови, тереть крѣпкимъ уксусомъ около сердца, тутъ же прикладывать ароматныя мѣшечки, намоченныя уксусомъ. Задохшимся отъ угольнаго газа, извергавшимъ рвотою черную жидкость, поступающую потомъ и въ кишки, дать слабительное или поставить клистирь, пока испражненія низомъ не потеряютъ чернаго цвѣта и вонючаго запаха.

Послѣ задушенія отъ острыхъ минеральныхъ паровъ, оживленному нужно давать много и долго слизистаго, маслянаго питья и исать пособія собственно врачебнаго (у врача). Опыты оживленія нужно продолжать по крайней мѣрѣ 6 часовъ неослабно, а при неудачѣ трупу хоронить не прежде появленія въ немъ признаковъ гнилости.



Оживленіе обмершихъ отъ сильнаго жара, духоты и спершагося воздуха при многолюдномъ стеченіи въ церкви, на сходкѣ и т. п., отъ быстрого и неожиданнаго дѣйствія сильныхъ страстей, въ сущности производится также, какъ и задохшихся въ парахъ и ямахъ. Главнѣйшія для этого средства — свѣжій, прохладный, чистый воздухъ, свободное отъ одежды положеніе груди и шеи, опрыскиваніе холодною водою, навѣваніе вѣтра, тренія висковъ, груди, нюханіе нашатырнаго спирта, уксуснаго эфира и пр. Обмираніе отъ пьянства нерѣдко предотвращается самою натурою, которая извергаетъ рвотою излишне выпитую водку и чрезъ то уменьшаетъ довольное число опившихся. Опившагося до безчувственности должно также приводить въ чувство, какъ и угорѣвшаго (см. ударъ). Ему полезны свѣжій воздухъ, облитіе головы и лица холодною водою, теплая вода съ масломъ коровьимъ до произведенія рвоты, рвотное, и потомъ кислое питье, огуречный разсолъ.

## Задавленные.

Люди часто *задавливаются* землею, камнемъ, бревнами, экипажами, спящіе въ палаусахъ между большихъ грудъ сложенной шерсти, сею послѣднею; еще чаще неосторожная мать, кормилица или нянька задавливаютъ, *засыпаютъ* дѣтей въ постели. Во всѣхъ этихъ случаяхъ смерть послѣдуетъ отъ задушенія, по причинѣ какъ сотрясенія мозга, такъ и дѣйствительнаго поврежденія тѣла.

Задавленныхъ тогда только можно почитать невозвратно погибшими, когда на ихъ тѣлѣ находятся важныя, смертельныя органическія поврежденія: разбитъ черепъ, раздавлена грудь, переломлена спина, или когда тѣло младенца совершенно раздавлено, голова его сильно стиснута, кровь течетъ изо рта и носа. Во всѣхъ другихъ случаяхъ съ задавленными должно поступать, какъ и съ задохшимися, а именно: раздѣть ихъ какъ можно скорѣе, а дѣтей распеленать, положить на бокъ и слегка тереть грудь въ направленіи къ верху, назначить пустить кровь, когда лицо и шея красны и вспухлы, вдуть воздухъ дитяти, что дѣлаетъ мать, кормилица, нянька, мужчина, своимъ ртомъ; тереть все тѣло рукою, теплою суконкою, обернуть его фланелью, нагуренною можжевелинникомъ, и перемѣнять, когда она остынетъ, ставить блистиры, давать нюхать пахучія средства, сдѣлать тепловатую ванну, положить дитя между двухъ нагихъ человѣкъ, а взрослоаго обернуть въ теплую шкуру свѣже-убитаго животнаго, покрыть его горячими внутренностями, или же обсыпать золою, обернуть теплыми платками, намоченными теплымъ виномъ. Треніе и согрѣваніе нужно продолжать и при возвращеніи жизни, притомъ давать чай изъ мялисы; при сильномъ храпѣнн дитяти, нужно давать ему нѣсколько ложекъ сироу изъ морскаго луку, отчего послѣдуетъ легкая рвота и грудь его очистится отъ мокроты. Для предотвращенія неумышленнаго задушенія дѣ-

тей въ постели, нужно строго запретить матерямъ и кормилицамъ класть дѣтей спать съ собою на постели, а усыплять ихъ отдѣльно въ колыбелькахъ; объ оживленіи обмершихъ поворожденныхъ сказано выше, въ статьѣ о попеченіи и хожденіи за поворожденными дѣтьми.

Прим. Объ оживленіи обмершихъ отъ потери крови сказано при обморокѣ въ кровотеченіяхъ (см. эту болѣзнь). Объ оживленіи обмершихъ отъ упаденія съ высоты, сотрясенія головы, груди, отъ жестокихъ ушибовъ и пр. изложено въ классѣ мѣстныхъ болѣзней (см. ушибъ).

## Отравленные.

Отравленные, по положенію опасности ихъ жизни, равно какъ и по мѣрамъ, необходимымъ для ихъ спасенія, содержатся во многомъ отношеніи противоположно обмершимъ; у послѣднихъ жизнь бываетъ подавлена подъ бременемъ вреднаго вліянія, и все пособіе для нихъ состоитъ въ томъ, чтобы удалить несчастнаго отъ случайной опасности, раздуть еще не совсѣмъ угасшую искру жизни; но у отравленныхъ здоровье и жизнь находятся въ жесточайшей борьбѣ съ ядомъ, въ которой они нерѣдко совсѣмъ изнемогаютъ, и пособіе отравленнымъ имѣетъ главную цѣлю исторгнуть изъ тѣла отравленнаго ядъ, ограничить его разрушительное дѣйствіе на тѣло человѣка, и усилить противодѣйствіе тѣла яду. Слѣдовательно заблаговременное и скорое пособіе отравленнымъ не менѣе важно и необходимо, какъ и оживленіе обмершихъ.

Отравленіе есть появленіе припадковъ, произведенныхъ ядами, въ одной или нѣсколькихъ частяхъ нашего тѣла. По дѣйствію ядовъ отравленіе бываетъ *быстрое* и *медленное*. Быстрое зависитъ отъ большаго количества яда, а медленное составляетъ хроническую болѣзнь и происходитъ отъ одного или многихъ ядовъ, употребленныхъ въ маломъ количествѣ, но въ частыхъ приемахъ. Быстрое и медленное отравленіе можетъ появиться у одного, или вдругъ у многихъ людей. Яды, по ихъ дѣйствію на тѣло наше, оказываются *ѣдкими*, *одуряющими* и *гнилостными*, скоро приводящими живое тѣло въ гніеніе (змѣиный ядъ).

Признаки отравленія многочисленны, но невѣрны, и только при открытіи яда въ тѣлѣ почитаются вѣрнымъ знакомъ отравленія. Быстрое отравленіе бываетъ не одинаково, смотря по роду и количеству употребленнаго яда, который однако сильнѣе дѣйствуетъ на тощій, чѣмъ на полный желудокъ. Но отравленіе, кромѣ рта и желудка, можетъ быть произведено внесеніемъ въ тѣло яда чрезъ задній проходъ, чрезъ одинъ ротъ, носъ, глаза, матку и ея рукавъ, чрезъ изъязвленную кожу послѣ ожога, ознобленія и проч. Припадки отравленія въ послѣднихъ случаяхъ (при укушеніи змѣею) бываютъ даже сильнѣе, чѣмъ при поглощеніи яда ртомъ. Ядъ въ одномъ случаѣ дѣйствуетъ только на части тѣла, находящіяся съ нимъ въ соприкосновеніи, не всасываясь тѣломъ (отравленіе вообще минеральными ядами); въ другихъ случаяхъ онъ не дѣйствуетъ на соприкасающіяся съ нимъ части, но всасывается и

дѣйствуетъ на главные органы тѣла (яды одуряющіе), или же ядъ дѣйствуетъ тѣмъ и другимъ образомъ. Отравленіе чрезъ всасываніе бываетъ болѣе жестоко, когда оно произведено жидкимъ, чѣмъ твердымъ ядомъ, оно бываетъ тѣмъ сильнѣе, появляется тѣмъ скорѣе, чѣмъ многообразнѣе ядъ, и чѣмъ изобильнѣе всасывающими сосудами часть (желудокъ, кишки), на которую онъ дѣйствуетъ прямо; при отравленіи чрезъ всасываніе часть яда можетъ остаться на томъ мѣстѣ, особенно наружномъ, гдѣ онъ былъ приложенъ. Различное время появленія признаковъ отравленія однимъ и тѣмъ же ядомъ зависитъ отъ количества яда. Все то, что есть ядъ для человѣка, дѣйствуетъ ядовито и на собаку, которую по этому ядовѣдцы употребляютъ для опредѣленія ядовъ въ сомнительныхъ случаяхъ, перевязывая ей голову для того, чтобы она не извергала рвотою даннаго ей яда.

Очень можно *подозрѣвать* отравленіе, если у человѣка внезапно появляются слѣдующіе признаки: непріятный, тошноту производящій запахъ, противный, стягивающій приторно-сладкій или горькій вкусъ, жгучій жаръ, жаръ во рту, чувство стягиванія въ глоткѣ, острая боль по всему кишечному каналу, а болѣе въ горлѣ и желудкѣ; эта боль иногда часто перемѣняетъ свое мѣсто и послѣдовательно чувствуется во всѣхъ кишкахъ и даже въ груди; частая отрыжка, тошнота, мучительная рвота слизью, желчью, кровью и разноцвѣтною жидкостью, которая производитъ во рту разное чувство; икота, запоръ на низъ или поносъ съ жиленьемъ и рѣзью; тоска, трудное дыханіе, безпокойный кашель, измѣненіе голоса; сильная жажда, но питье скоро извергается рвотою; по временамъ дрожь, оледенѣлость кожи и членовъ и холодный, вязкій потъ, трудное, рѣдкое мочеиспусканіе, жгучая моча. Въ послѣдствіи измѣняется фizioномія: цвѣтъ лица дѣлается блѣднымъ и посинѣвшимъ, глаза красны, блестящи, либо впалы; потеря зрѣнія и слуха; сильное безпокойство, крикъ, метаніе изъ стороны въ сторону, бредъ, судороги въ лицѣ, судорожный смѣхъ, смыканіе челюстей, страшное искривленіе головы къ спинѣ, безчувствіе, оцѣпенѣніе, сонливость, обморокъ, параличъ ногъ, чрезвычайная слабость, упорное болѣзненное напряженіе дѣтороднаго уда и ударъ. Обыкновенно, если отравленному не будетъ подана скорая помощь, всѣ изложенные признаки постепенно ожесточаются до смерти; въ рѣдкихъ случаяхъ они послабляютъ на короткое время и какъ бы перемежаются. Въ этихъ перемежкахъ тѣло отравленнаго, истомленное отъ дѣйствія яда, собирается съ новыми силами для противодѣйствія своему смертельному врагу; такія перемежки замѣчаются наичаще при отравленіи мышьякомъ. Опасность отравленія зависитъ отъ качества и количества яда и отъ заблаговременнаго, скорого и дѣятельнаго пособія отравленному. Главнѣйшіе виды ядовъ и производимыя ими болѣзненные перемѣны исчислены ниже сего.

Помощь отравленнымъ состоитъ: 1) *въ удаленіи яда изъ тѣла*; 2) *въ уничтоженіи*, притупленіи, ограниченіи его дѣйствія и 3) *въ пре-*

*крайней* послѣдствій отравленія. Для этого всякому отравленному нужно пригласить врача.

1) Отъ заблаговременнаго удаленія яда изъ тѣла зависитъ наибольшее спасеніе отравленнаго. Чѣмъ скорѣе поглощенный ядъ извергается изъ тѣла, чѣмъ еще менѣе онъ произвелъ разрушеній, тѣмъ вѣрнѣе спасеніе отравленнаго. Въ этомъ случаѣ сама натура, или цѣлительная сила природы, т. е. внутренней священный врачъ, указываетъ путь спасенія и производитъ рвоту и сильную жажду, изъ которыхъ первую удаляется, а вторую разжижается ядъ, еще оставшійся въ тѣлѣ. Этому указанію должны слѣдовать и мы при спасеніи отравленныхъ: если мы увѣрены, что человѣкъ отравленъ, но ядъ еще не произвелъ никакого дѣйствія, то нужно въ ту же минуту дать ему *рвотное* изъ бѣлаго купороса (10—15 гранъ, около  $\frac{1}{8}$  золотн.) или изъ рвотнаго корня ипеакагуаны (1—2 драхмы, 1—2 золотн.), возбуждать рвоту теплою водою съ мыломъ, молокомъ, слизистымъ отваромъ льнянаго сѣмени, проскурняка, ячннхъ крупъ и т. п., которыя отравленный пьетъ чрезъ 5—10 минутъ по чашкамъ. Если же рвота произошла, то нужно ее только поддерживать, заставляя отравленнаго пить молоко, воду съ масломъ, ячный отваръ, настой изъ слизистыхъ травъ; но давать еще рвотное при дѣйствительной рвотѣ бесполезно и вредно. При отравленіи острыми ядами: мышьякомъ, сусею, мѣдью, сѣрною селитряною кислотами и проч., рвота сама по себѣ происходитъ очень скоро, и ее нужно только сначала поддерживать, а потомъ даже и унять, потому что она жестоко ослабляетъ отравленнаго, либо означаетъ начавшееся уже воспаленіе желудка или кишекъ. Но при отравленіи одуряющими, усыпительными, притупляющими чувствительность ядами (опіемъ, бѣленою, дурманомъ, красавицею, синильною кислотой), рвота не происходитъ, а ее нужно произвести искусственно сильнымъ приемомъ рвотнаго, который надобно и повторить, если чрезъ 10—20 минутъ не произошла обильная рвота, поддерживая ее теплымъ питьемъ. При неимѣнннхъ рвотныхъ средствъ, рвоту можно возбудить глубоко вложенными въ полость рта пальцами, которыми шевелить и щекотать небную занавѣску и глотку, также перышкомъ, омоченнымъ въ масло и впущеннымъ сколько можно далѣе въ пищеварительное горло, причемъ перышко нужно двигать почаще внизъ и вверхъ. (см. еще лѣченіе въ воспаленіи желудка).

Ядъ попадаетъ въ тѣло, кромѣ рта, чрезъ поверхность тѣла при укушеніи бѣшеными или ядовитыми животными, при ранахъ стрѣлами, намазанными ядомъ; при употребленіи чрезъ кожу, обнаженную отъ кожицы, ядовитыхъ лѣкарствъ, какъ то: листьевъ бѣлены при обвареніи, вытяжки красавицы, дурмана, опія, при такъ называемомъ накожномъ лѣченіи и проч. Здѣсь вся важность врачебной помощи отравленному состоитъ въ томъ, чтобы воспрепятствовать всосанію и прохожденію яда въ кровь. Въ случаѣ укушенія ядовитыми животными, производящаго бѣлую рожу, должно поступать точно такъ, какъ показано

въ лѣченіи этой болѣзни (см. бѣлая рожа), а въ случаѣ укушенія бѣшенными животными, производящаго ядовитыя раны, должно поступать такъ, какъ показано въ этихъ болѣзняхъ (см. раны ядовитыя).

2) Второе главное условіе спасенія отравленныхъ состоитъ въ *разложеніи, уничтоженіи яда, въ притупленіи*, — ограниченіи его дѣйствія. Если не удалось, какъ это очень часто случается, удалить ядъ изъ тѣла, то нужно употреблять средства, о которыхъ извѣстно изъ опыта, что они разлагаютъ, разрушаютъ или притупляютъ его дѣйствіе. Эти средства называются *противуядіями*; они, будучи приняты человекомъ внутрь въ большомъ количествѣ, не причиняютъ ему никакого вреда; при температурѣ, не выше человеческого тѣла (22° Р.), дѣйствуютъ разрушительно на ядъ, и притомъ скоро соединяются съ ядомъ, въ какомъ бы онъ ни былъ смѣшеніи, и отнимаютъ у него все вредныя свойства. Къ сожалѣнію, медицина мало имѣетъ такихъ совершенныхъ противуядій; донынѣ извѣстныя противуядія только разлагаютъ ядъ, а не уничтожаютъ уже произведеннаго имъ дѣйствія отравленія; они употребляются съ пользою при отравленіи ядами, медленно-дѣйствующими (яды постоянныя, острые, почти все минеральныя яды), напротивъ, при отравленіи ядами, быстро дѣйствующими (яды летучіе, проникательныя, животныя яды, змѣиный ядъ, синильная кислота), все такия противуядія весьма ограничены въ своемъ дѣйствіи. Здѣсь помѣщается краткое извлеченіе изъ опытовъ нынѣшнихъ врачей и химиковъ, занимающихся открытіемъ противуядій и средствъ, притупляющихъ вредное дѣйствіе ядовъ.

### 1. Острые минеральныя яды.

1) *Минеральныя кислоты*: сѣрная, или купоросное масло, селитряная, соляная и проч.: жженіе, рвота, поносъ, боль въ животѣ, тоска, трудное дыханіе, воспаленіе, охлажденіе тѣла, судороги, разъѣданіе рта, горла, желудка, кишекъ.

2) *Щелочи подкія и известъ*: дѣйствіе почти такое же, какъ и отъ кислотъ.

3) *Селитра*: рѣзь, рвота, поносъ, воспаленіе въ животѣ.

### Противуядія:

1) Пережженная и углекислая (противъ сѣрной кислоты) магнезія. При недостаткѣ магнезіи, растворъ мыла съ водою, раковыя жерновки, кораллы, жженая бость или пережженный олений рогъ; эти же средства употребляются и въ блистерахъ. Слизистое питье изъ отвара корня просвиры, аравійской, вишневой камеди, ячмыныхъ, овсяныхъ и рисовыхъ крупъ, молоко.

2) Уксусъ, лимонный сокъ; пить много воды; масло, молоко и слизистыя отвары.

3) Вода съ сахаромъ, медомъ, молоко.

**Яды:**

4) *Нашатырь*: рвота, судороги, поносъ.

5) *Ртутные составы, особенно сулема*: жженіе, рвота, рѣзь, поносъ, вонючее дыханіе, слюнотеченіе, воспаленіе, смерть чрезъ 20—30 часовъ.

6) *Мышьяковые составы*: жажда, жженіе, рѣзь, рвота, поносъ, судороги, холодный клейкій потъ, перемежка припадковъ.

7) *Мѣдные составы*: рѣзь, рвота, колика, поносъ, судороги.

8) *Сурмяные составы*, особенно рвотный камень и сурмяное масло: рвота, тоска, поносъ, судороги.

9) *Оловянные, висмутовые, золотые, цинковые составы*: рвота, жажда, рѣзь, поносъ, судороги.

10) *Адскій камень*: жженіе, рвота, поносъ.

11) *Свинцовые составы*: колика, запоръ, параличъ, рвота.

12) *Стрная печенка*: тошнота, отрыжка гнилыми яйцами, рвота, жженіе при испусканіи мочи.

**II. Растительные и животные яды:**

А.) 13) *Острые растительные яды*: анемонъ, или протрѣльная вѣтренница, колоцинтъ, большой или великорослый чистотѣль, молочай, авранъ, волчье лыко или волчничъ, артышъ или казацкій можжевельникъ, скаммонъ, гуммигутъ или желтая камедь, бріонія и проч.: жженіе и сжатіе въ горлѣ и

**Противудія:**

4) Слизистое питье, вода, молоко.

5) Свѣжія яйца, особенно бѣлокъ, распущенный въ водѣ, молоко, желе, студень, свѣжая кровь, растительный клей (аравійская, вишневая камедь), слизистые отвары: ячный, рисовый, овсяный.

6) Вода съ сахаромъ, съ сиропомъ, известковая, простая; слизистые отвары риса, ячменя, льнянаго сѣмени, углекислое желѣзо, молоко; масляныя и жирныя вещи вредны.

7) Яичный бѣлокъ, сахаръ, масло съ водою, молоко.

8) Отваръ чернильныхъ орѣшковъ, хинной, дубовой, ивовой корки.

9) Молоко, вода съ сахаромъ, слизистое питье, жирное масло.

10) Растворъ поваренной соли въ водѣ, молоко.

11) Сѣрноокислый натръ и сѣрноокислая магнезія, горькая, англійская, сибирская соль.

12) Вода съ уксусомъ, лимоннымъ сокомъ, молоко.

**Противудія.**

13) Притупленіе ядовъ обильнымъ, водянистымъ и слизистымъ питьемъ, молоко, деревянное, льняное масло, студень, желе, растительный клей (см. противудія сулемы и кислотъ). Если ядъ проглоченъ недавно, то рвотное изъ 4—6 гранъ рвотнаго камня, раствореннаго въ 4 унціяхъ воды;

**Яды:**

желудѣкъ, острый вкусъ, изжога, рѣзь, рвота, поносъ, запоръ мочи, жажда, боль, воспаленіе, судороги, безпамятство, одервенѣніе членовъ.

14) *Шпанскія мушки*: жженіе, рѣзь, жажда, рвота, кровавый поносъ, задержаніе мочи, болѣзненное напряженіе дѣтороднаго уда.

*Б. Оглушающіе, одуряющіе, наркотическіе яды:*

15) *Синильная кислота и ея составы*: тоска, біеніе сердца, рвота, безчувствіе, судороги, или мгновенная смерть.

16) *Растительныя, одуряющіе яды*: опій, бѣлена, табакъ, буколь, омегъ, красавица, дурманъ, трава-пострѣль, ядовитый салатъ, пасленъ: тягость и боль головы, опьяненіе, сонливость, безчувственность, безсиліе, бредъ, судороги, онѣмѣніе ногъ, рвота, запоръ на низъ, холодный потъ, смерть.

17) *Грибы, какъ остро-оглушающіе яды*: рвота, поносъ, жажда, рѣзь, безпамятство, бредъ, судороги, холодный потъ; эти припадки появляются чрезъ 6—10 часовъ послѣ употребленія въ пищу ядовитыхъ грибовъ.

18) *Ржаные рожки*: ползаніе мурашекъ въ ногахъ и рукахъ, боль въ желудѣкъ, тошнота, рвота, судороги въ пальцахъ, бредъ, безпамятство, задумчивость, страшный голодъ, пятна на кожѣ, помертвѣніе пальцевъ и отпаденіе цѣлыхъ членовъ.

**Противудія:**

рвотное принимается чрезъ 4—6 минутъ по столовой ложкѣ; послѣ рвотнаго жидкости нужно пить сколько можно болѣе.

14) Камфора, слизистое питье, молоко животное и растительное (оршадъ, эмульсія).

15) Рвотное, понюхать хлорновую воду, крѣпкій отваръ кофе, обливаніе головы и спины холодною водою.

16) Сильное рвотное, крѣпкій отваръ кофе, настой чернильныхъ орѣшковъ, вода съ уксусомъ. лимонный сокъ, кремортартаръ. холодныя примочки головы и влоль спины холодною водою. Отравленные этими ядами имѣютъ склонность ко сну, но имъ всячески не должно давать спать, обмывая ихъ часто холодною водою съ уксусомъ, или прысая на нихъ въ лицо: хорошо также выносить ихъ на дождь, вѣтеръ.

17) Рвотное, промывательное изъ александрійскаго листа съ горькою солью, слабительное изъ кастороваго, льнянаго масла, померанцевая вода съ гофманскими каплями; слизистое и водянистое питье, молоко, сыворотка, масло.

18) Рвотное, слабительное, отваръ маковыхъ головокъ, кисрое питье.

## Яды:

19) *Спиртные напитки*: ихъ дѣйствіе извѣстно всякому.

20) Ужаленіе ядовитыми змѣями въ нашихъ странахъ не опасно, по въ жаркихъ климатахъ бываетъ часто смертельно, и чѣмъ жарче страна, тѣмъ ядовитѣе водятся въ ней змѣи: боль и опухоль въ ужаленномъ мѣстѣ, откуда она простирается по всему тѣлу, синева, помертвѣніе, обмороки, рвота, желтуха, судороги, трудное дыханіе, холодный потъ, вонь, гниль, кровотеченіе, смерть.

Укушеніе бѣшеными животными въ послѣдствіи причиняетъ водобоязнь.

21) *Ужаленіе скорпиономъ*: красное пятно, чернѣющее по срединѣ на мѣстѣ укуса, боль, опухоль, пунзырьки, дрожь, лихорадка, рвота, онѣмѣніе, дрожаніе тѣла.

22) *Ужаленіе тарантулою, осой, пчелою, паукомъ, комаромъ*: боль, опухоль, лихорадка, рвота, судороги въ видѣ пляски.

Примѣчан. Во всѣхъ случаяхъ

## Противудія:

19) Рвотное, слабительное, кислое питье, холодныя примочки и обмыванія головы, груди (см. обмираніе), сахарная вода съ миндереровымъ спиртомъ.

20) *Перевязка*, испражненіе изъ раны крови, прижиганіе раны раскаленнымъ желѣзомъ, кипящимъ масломъ, адскимъ камнемъ, ѣдкимъ поташомъ, купороснымъ масломъ; *пртладываніе* вокругъ раны и натираніе укушеннаго члена летучею мазью, внутрь: наливка изъ бузиновыхъ цвѣтовъ съ ѣдкимъ нашатыремъ, хорошее вино, обмываніе раны растворомъ хлориновой соды, положеніе укушеннаго близъ большаго огня, натираніе его смѣсью изъ равныхъ частей лавдана Сиденгамова, ѣдкаго амміака и сѣрнаго эфира; эта жидкость (одна драхма) вливается въ ротъ ужаленнаго, котораго водятъ потомъ по комнатамъ и почаще даютъ сказанную смѣсь.

Послѣ укушенія бѣшеными животными, употребляется также перевязка члена и различное омовеніе и прижиганіе раны (см. ядовитыя раны).

21) Мягчительная припарка къ ранѣ съ нѣсколькими каплями ѣдкаго нашатырнаго спирта, втираніе вокругъ раны жирнаго масла. Перевязка укушеннаго члена тѣмъ нужиѣ, чѣмъ жарче климатъ и время года, гдѣ и когда послѣдовало ужаленіе. Внутрь тоже, что сказано при ужаленіи змѣями.

22) Обмываніе холодною водою и натираніе миндальнымъ, льнянымъ масломъ съ ѣдкимъ нашатырнымъ спиртомъ; внутрь, бузиновый чай съ нѣсколькими каплями этого же спир-



**Яды:**

этого ядовитаго ужаленія опухоль, образуеть бѣлую рожу, лѣченіе которой изложено подробно въ своемъ мѣстѣ (см. рожа бѣлая).

23) Отравленіе животными, употребленными въ пищу.

**Противудія:**

та; извлеченіе жала концомъ иглы, маленькими щипчиками, вырѣзываніе вокругъ раны кожицы или опущеніе на ужащенное мѣсто нѣсколькихъ капель настойки испанскихъ мухъ, послѣ чего, съ поднятіемъ кожицы въ пузырь, выходитъ и жало; обмываніе холодною водою, въ которой распущена поваренная соль, и обмываніе ужащенного мѣста холстиною, намоченною въ этой же водѣ.

23) Рвотное, повторительно-слабительное, клистиры, эфиръ съ сахаромъ, гофманскія капли съ лавданомъ, Сиденгама, питье изъ воды съ уксусомъ, лимоннымъ сокомъ.

Но ко всякому отравленному, гдѣ только можно, надобно въ ту же минуту пригласить врача. Приглашеніе врача бываетъ тѣмъ необходимѣе, когда у отравленнаго замѣчается воспаленіе въ животѣ, безчувствіе, жаръ и т. п.

## Правила, которыя должно наблюдать при появленіи поваральныхъ болѣзней въ предохраненіе здоровья.

До нынѣ извѣстнѣйшія и напчаше свирѣпствующія поваральныя болѣзни, суть: оспа, красуха (скарлатина), коклюшь, крупъ, корь, гриппъ, холера, разныя лихорадки, кровавый поносъ, сибирская язва и чума. Нѣкоторыя изъ нихъ появляются очень часто въ нѣкоторыхъ только мѣстахъ нашего отечества, или медленно проходятъ по всей Европѣ и даже по всему земному шару, и всегда поражаютъ или дѣтей и юношей (первыя пять болѣзней), или безъ различія пола и возраста людей всѣхъ состояній. Предохранительныя мѣры, подлежащія теперь изложенію, должны быть наблюдаемы во время поваральнаго свирѣпствованія этихъ болѣзней. Предосторожности отъ болѣзней, зависящихъ отъ временъ года, климата и особенности страны, изложены выше въ описаніи Россіянъ по ихъ мѣстопробыванію въ разныхъ климатахъ россіи. Не говоря о разныхъ временахъ года, которые соотвѣтствуютъ переменамъ климатическимъ, гдѣ исчислены и самыя болѣзни, слѣдуетъ теперь описать сначала общія мѣры, которыя нужно наблюдать при всякой поваральной болѣзни, а потомъ изложить предосторожности, которыя опытъ показалъ дѣйствительными противъ каждой изъ этихъ болѣзней въ особенности,

по усовершенствованному нашимъ отечественнымъ докторомъ Чаруковскимъ порядку въ его народной медицинѣ. Все искусство предохранить себя отъ свирѣпствующей повальной болѣзни состоитъ въ томъ, чтобы *сохранить тѣло свое во всей его силѣ и крѣпости*, даже, если можно, еще болѣе укрѣпить его, и тѣмъ поставить его въ возможность съ успѣхомъ отражать и противодѣйствовать разнымъ вліяніямъ, незначительнымъ въ другое время, но теперь, при повальной болѣзни, весьма вреднымъ. Всякая невоздержность, какъ насильственный поступокъ съ нашимъ тѣломъ, и во внутренней нашей жизни и во внѣшней, относительно потребностей, его обезсиленіе, или ослабленіе неумѣреннымъ напряженіемъ отъ избытка или недостатка въ повальное время, есть, такъ сказать, ворота, чрезъ которыя врывается повальная болѣзнь, какъ опаснѣйшій врагъ, во дворецъ нашего организма. Мѣры для сохраненія тѣла нашего во всей его силѣ и крѣпости, на отраженіе этого врага, суть: *чистота, трезвость, цѣломудренность и равнодушіе*.

Чистота должна быть наблюдаема относительно *воздуха, жилища, одежды, и нашего тѣла*.

*Воздухъ* испорченный, нечистый всегда вреденъ, но въ повальное время въ особенности, и потому-то всякая повальная болѣзнь особенно свирѣпствуетъ между бѣднымъ, неопытнымъ классомъ людей, какъ говорится, биткомъ набитыхъ въ тѣсныхъ, темныхъ, низкихъ домахъ, тюрьмахъ, лазаретахъ, въ грязныхъ узкихъ, кривыхъ улицахъ, между сельскимъ простымъ народомъ въ крестьянскомъ быту, живущихъ вмѣстѣ съ разными домашними животными. Напротивъ, свѣжій, чистый, свободно движущійся воздухъ, содержащій достаточно кислорода и освѣщаемый солнцемъ, очень полезенъ, возбуждаетъ и освѣжаетъ всѣ тѣлесныя дѣйствія, наичаще мышцы и нервы. Оттого деревенскіе жители, особенно въ возвышенныхъ мѣстахъ, бываютъ крѣпки, сильны, дѣятельны, легко переносятъ тѣлесныя труды, и бываютъ бодры и веселы, не смотря на частыя жертвы повальныхъ болѣзней.

Не менѣе вреденъ воздухъ влажный и сырой, напитанный разными гнилыми, болотными испареніями, отдѣлившимися изъ высыхающихъ лужъ, болотъ, прудовъ, каналовъ. Сырой и теплый вѣтеръ легче всего распространяетъ повальныя болѣзни и разноситъ ихъ заразу. Это вредное дѣйствіе сыраго воздуха, кромѣ содержащихся въ немъ убійственныхъ испареній, зависитъ больше оттого, что онъ быстро останавливаетъ испарину въ кожѣ и легкихъ, и задерживаетъ въ тѣлѣ испражнительныя жидкости.

Для осушенія и очищенія воздуха въ жилыхъ комнатахъ, нужно постоянно поддерживать огонь въ каминахъ, часто топить печки, не затворяя трубъ, и накуривать комнаты, особенно многоядныя, одинъ, два раза въ день епслыми парами изъ уксуса и другихъ средствъ, о которыхъ сказано въ другихъ мѣстахъ. Впрочемъ комнатный воздухъ лучше всего очищать раствореніемъ оконъ, форточекъ, дверей и впусценіемъ въ покой наружнаго свѣжаго воздуха. Чистый, сухой, свѣжій, умѣренно-

теплый воздухъ, избѣганіе частыхъ и быстрыхъ перемѣнъ въ его температурѣ, суть надежнѣйшія мѣры предосторожности отъ повальныхъ болѣзней.

Чистота жилищъ и одежды и чистоплотность также въ высшей степени должны быть наблюдаемы при свирѣпствованіи повальныхъ болѣзней, и потому въ это время нужно жить въ чистыхъ, свѣтлыхъ, умѣренно-теплыхъ покояхъ, носить умѣренно-теплое платье, слабымъ людямъ — фланелевую сорочку на голомъ тѣлѣ, ходить въ баню или теплую ванну, и вообще поддерживать легкую испарину въ кожѣ, прогуливаться пѣшкомъ въ хорошую погоду по улицамъ, въ открытыхъ мѣстахъ, въ полѣ, въ сосновой рошѣ, подалѣе отъ воды и пр.

Трезвость, умѣренность и осторожность въ выборѣ пищи и питья во время повальныхъ болѣзней не менѣе того важны. Пища, подобно воздуху, должна поддерживать наше тѣло въ силѣ и крѣпости и дѣлать его, такъ сказать, неподатливымъ, непобѣдимымъ, стойкимъ противъ эпидеміи. Существенное правило состоитъ въ томъ, чтобы *нѣтъ* только *въ то время, когда мы чувствуемъ голодъ, и столько, сколько желудокъ можетъ переварить безъ напряженія*; слѣдовательно лучше ѣсть нѣсколько менѣе противъ того, сколько мы ѣдимъ въ другое время, и вставать изъ за стола полуголоднымъ. Чѣмъ легковаримѣе пища, тѣмъ менѣе она вредна, даже и при невоздержности, и потому вовсе, если можно, *не употреблять гороха, бобовъ, чечевицы, капусты, свинины, ветчины, колбасъ, сыра*. Вообще *діететическія правила* воздержанія, изложенныя нами въ другомъ мѣстѣ, *должны быть наблюдаемы съ большою строгостію* при повальной болѣзни. Во время эпидеміи, если нѣтъ по близости врача, который бы посоветовалъ, что можно и чего не должно ѣсть, при выборѣ пищи лучше всего слѣдовать внутреннему желанію или отвращенію, какъ самому вѣрному въ этомъ случаѣ указателю со стороны внутренняго нашего священнаго врача, цѣлительной силы природы, о количествѣ и качествѣ полезной для насъ пищи. Если же къ тому будетъ употребляема обыкновенная простая пища, то не будетъ погрѣшности противъ правилъ воздержности, отъ которой изрѣдка можно уклоняться, особенно послѣ продолжительной діеты, начинающей своимъ единообразіемъ тяготить насъ и становиться противною.

Самое лучшее *питье* во время повальныхъ болѣзней есть простая вода, обыкновенной температуры; къ ней можно прибавить кислый сокъ при чувствѣ внутреннаго жара, сильной жаждѣ, въ жаркое время, пить ее съ виномъ, чистое же вино, либо рюмку водки, при замѣтномъ обремененіи желудка пищею, или по сдѣланной издавна привычкѣ къ употребленію этихъ напитковъ. Но возбуждать виномъ или водкою наше тѣло для того, чтобы оно вѣрнѣе противилось дѣйствию эпидеміи — опасно; по прошествіи такого временнаго возбужденія ослабленное тѣло наше тѣмъ легче подвергается повальной болѣзни, которая напаче поражаетъ пьяницъ во время похмѣлья. Воду теплую, чай обыкновенный и изъ потогонныхъ растений — бузиновыхъ и липовыхъ цвѣтовъ, сухихъ ягодъ

малины и проч., можно употреблять, кромѣ привычнаго къ тому времени, только тогда, когда съ вѣроятностію можно полагать, что мы остановили испарину въ кожѣ послѣ обмыванія, пріема ванны, или по выходѣ изъ бани, также когда мы промокли на дождѣ, продрогли на вѣтрѣ, озябли на холодѣ, но и то при эпидеміи холеры, гриппа, кроваваго поноса; напротивъ того, во время повальнаго свирѣпствованія напосной оспы, скарлатины, кори, чумы, теплое питье вредно, потому что потную, мягкую кожу оно располагаетъ къ удобнѣйшему воспріятію заразы. Очень холодное питье при всякой эпидеміи для здоровья больныхъ рѣшительно вредно. Пиво, медъ, сидръ (фруктовый, спиртный квасъ), шипучія воды, квасъ при повальныхъ (эпидемическихъ) болѣзняхъ, особенно сопровождающихся поносомъ или рвотою, нужно употреблять съ большою осторожностію, а еще лучше и совсѣмъ отъ нихъ воздержаться.

Цѣломудренность, какъ сохраненіе тѣла нашего въ силѣ и крѣпости, есть вѣрнѣйшее средство избѣгать повальной болѣзни; потому что ничто такъ не укрѣпляетъ мужичицу, какъ его дѣтородное сѣмя, когда оно всасывается изъ своихъ пузырьковъ и опять возвращается въ кровь: слѣдовательно *редкое удовлетвореніе дѣтородной похоти*, и даже строгая воздержность, при повальныхъ болѣзняхъ столько же необходимы и дѣйствительны, какъ и строгая діета въ пищѣ и питѣ и чистый свѣжій воздухъ. Цѣломудренность въ этомъ отношеніи важнѣе для мужичины, чѣмъ для женщины, потому что удовлетвореніе любовной страсти у перваго соединено съ значительною потерею драгоценнѣйшаго сока дѣтороднаго сѣмени, которое, оставаясь въ тѣлѣ мужичины, сообщаетъ ему силу, крѣпость и бодрость. Есть множество примѣровъ, что сластолюбцы и развратники, во время своихъ жертвоприношеній Венерѣ, занемогали повальными болѣзнями, которыя у нихъ наичаще были смертельны, или оставляли послѣ себя другія неизлѣчимыя болѣзни. Природа строго мститъ за нарушенія ея священныхъ правилъ и злоупотребленіе драгоценныхъ даровъ. А поэтому нужно совѣтовать, во время повальныхъ болѣзней, сколько можно строже воздерживаться отъ удовлетворенія плотской похоти, и твердо помнить, что въ это время каждый изъ насъ и безъ того болѣе или менѣе расположенъ къ господствующей болѣзни.

Развѣдуніе при заботливости о своемъ здоровьѣ во время повальныхъ болѣзней также непремѣнно нужно. Если образъ жизни и давнія привычки въ это время могутъ быть вредны, то совѣтовать измѣнять ихъ не вдругъ, но постепенно; быстрый и крутой поворотъ можетъ быть очень вреденъ. Воздержность наша не должна переходить въ постоянное голоданіе, движеніе — въ усталость и истомленіе, а дѣятельность — въ совершенное бездѣйствіе; во всемъ нужно совѣтовать соблюдать умѣренность — золотую средину. Если образъ жизни не имѣетъ въ себѣ ничего укоризненнаго, порочнаго, явно вреднаго (пьянства, обжорства, распутства и пр.), то не должно измѣнять его и во время эпидеміи, ѣсть, пить, спать, заниматься своими дѣлами по прежнему; но для сна непремѣнно назначать ночное, а для занятій дневное время. Хладнокровіе, безстра-

сти, готовность жить и умереть, есть вѣрнѣйшая защита отъ эпидеміи, которая, легко поражая робкаго и труса, милуетъ смѣлаго и безстрашнаго. Страхъ, приводя въ бездѣйствіе и безсиліе душу и тѣло, лишаетъ ихъ возможности сопротивляться эпидеміи.

Но если страхъ и уныніе, убивая бодрость духа и ослабляя тѣло, накликають, такъ сказать, на робкаго и печальнаго человѣка повальную болѣзнь, то не избавляютъ отъ нея также и *насильственная бодрость* и *принужденная веселость*. Человѣкъ, отъ эпидеміи щущій бодрости въ винѣ, старающійся забыться въ обществѣ развратныхъ женщинъ, за роскошнымъ столомъ, за картами, также не спасается отъ повальной болѣзни, которая падаетъ только внутренно спокойныхъ, бодрыхъ и душевно веселыхъ людей.

Гнѣвъ, какъ и все угнетающія страсти, вредно дѣйствуя на тѣло и душу, располагаетъ къ повальной болѣзни. Очень часто случается видѣть, что разгнѣванный, испугавшійся или иначе встревоженный человѣкъ, вслѣдъ за тѣмъ подвергается болѣзни, которая у него обнаруживается со всею жестокостію и нерѣдко бываетъ смертельна. Это происходитъ отъ того, что тѣло встревоженнаго человѣка бываетъ слабѣе, воспріимчивѣе, и потому на него нападаетъ легче и сильнѣе повальная болѣзнь.

Во время эпидеміи нужно предаваться умѣренно и постоянно привычнымъ умственнымъ и тѣлеснымъ занятіямъ, но не до утомленія, усталости; трудящійся человѣкъ не имѣетъ, такъ сказать, времени обращать вниманія на то, что происходитъ внѣ круга его занятій, на улицѣ, въ другихъ домахъ и въ цѣломъ селѣ и пр.; нужно, такъ сказать, жить болѣе для себя и своего семейства, не дѣлаясь однако для того безчувственнымъ эгоистомъ. Привычныя занятія наши, умственные и тѣлесныя, во время эпидеміи должны быть сопряжены съ движеніемъ, которое превосходно оживляетъ дыханіе, біеніе сердца и артерій, а слѣдовательно обращеніе крови и всѣхъ жидкостей, а эти дѣйствія, въ свою очередь, укрѣпляютъ тѣло, ободряютъ и веселятъ духъ; напротивъ того, работа, требующая сидѣнія, быть можетъ еще въ согбенномъ положеніи, производитъ накопленіе и застой соковъ въ животѣ, груди и головѣ, а эти скопленія ослабляютъ желудокъ, кишки, легкія, сердце, мозгъ и располагаютъ къ свирѣпствующей болѣзни. Дѣятельный образъ жизни имѣетъ важное вліяніе на правильное испареніе въ кожѣ, испражненіе кака и мочи. Во время эпидеміи нужно поставить себѣ правиломъ ежедневно производить легкую испарину, какъ сказано выше, имѣть 1—2 испражненія низомъ и наблюдать за достаточнымъ испражненіемъ мочи: правильность натуральныхъ испражненій выводитъ изъ тѣла испортившіеся соки, возбуждаетъ аппетитъ и укрѣпляетъ тѣло. Пускать кровь и принимать слабительное при появленіи эпидеміи вредно: тѣло, ослабленное кровопусканіемъ, скорѣе занемогаетъ, а слабительное, особенно сильное и принятое безъ надобности, располагаетъ еще болѣе къ извѣстнымъ повальнымъ болѣзнямъ (холерѣ, кровавому поносу). Для очи-

щенія же кишекъ и уменьшенія полнокрівія, умѣренное употребленіе простой, легковаримой пищи, для питья простой воды или съ виномъ, либо кваса, легкаго пива, бываетъ достаточно.

Источники (фонтанели) на тѣлѣ, искусственно произведенные мушкетю, или прижиганіемъ (посредствомъ ѣдкаго поташа, горячаго желѣза или кипячей воды), раны, привычныя язвы, прежде почитавшіяся предохранительнымъ средствомъ отъ поваральныхъ болѣзней, особенно отъ чумы, нынѣ подлежатъ большому сомнѣнію. Они разслабляютъ тѣло, а все то, что разслабляетъ, располагаетъ его и къ поваральной болѣзни; притомъ часть тѣла, обнаженная отъ кожи, легко всасываетъ заразу, и потому въ больницахъ, гдѣ свирѣпствуетъ антоновъ огонь, прежде всего имъ заражаются раненые, также больные, имѣющіе у себя язвы, мокрую чесотку, лишай и проч. Гораздо вѣрнѣе, вмѣсто всѣхъ этихъ средствъ, содержать тѣло въ чистотѣ посредствомъ обмыванія водою съ мыломъ, ваннъ, купанья въ рѣкѣ, растираній суконками съ уксусомъ, водкою, спиртомъ и пр.

Посему вѣрнѣйшее средство, для предохраненія отъ поваральныхъ болѣзней, состоитъ въ томъ, чтобы *сохранить тѣло наше крѣпкимъ, а духъ бодрымъ*, какъ о томъ сказано выше. Обжорство, распутство, невоздержность, неопрятность, страхъ, гнѣвъ, лѣнь, въ логическомъ, нравственномъ и физическомъ смыслѣ, суть ворота для вторженія враждебной силы поваральныхъ болѣзней во дворецъ нашего организма.

Наконецъ нужно сказать нѣсколько словъ о правилахъ, которыя должно наблюдать, какъ предохранительныя мѣры, при поваральныхъ болѣзняхъ, въ особенности безусловно и условно заразительныхъ. *Безусловно*, т. е. всегда, вездѣ и для всѣхъ людей *заразительныя болѣзни* суть: *чума, водобоязнь, чесотка и лобострастная*. Нынѣ лучшее средство для предохраненія отъ этихъ болѣзней состоитъ въ строгомъ отдѣленіи себя отъ всѣхъ постороннихъ людей, въ несообщеніи съ сомнительными больными, т. е. такими, болѣзнь которыхъ для насъ не извѣстна, хотя бы они были наши знакомые и даже родственники, въ неприкосновеніи къ чумнымъ, неизвѣстнымъ вещамъ, и въ очищеніи себя и бывшаго на насъ бѣлья и платья всякій разъ, когда мы выходили изъ дому, имѣли дѣло съ посторонними людьми и прикасались къ сомнительнымъ вещамъ, трупамъ, людямъ. Лучшій способъ очищенія людей состоитъ въ омовеніи ихъ, особенно тѣхъ частей тѣла, которыми они прикасались къ сомнительнымъ вещамъ и людямъ (рукъ, губъ, дѣтородныхъ органовъ) хлориновымъ растворомъ, водою съ мыломъ, уксусомъ, въ приѣмѣ ваннъ, купанья въ проточной или морской водѣ, въ мытьѣ платья и бѣлья въ щелочной, морской, соленой водѣ и въ провѣтриваніи его на чистомъ воздухѣ и открытомъ мѣстѣ, доступномъ вѣтру и солнечному свѣту.

Еще у насъ въ Россіи появляется иногда поваральная заразительная болѣзнь первоначально между скотомъ, а отъ него сообщается и человеку, который ходитъ за такимъ больнымъ скотомъ, и потому необхо-

димо прикасается къ нему. Эта болѣзнь есть *сибирская язва*: она чаще появляется у насъ въ Сибири и зависитъ отъ недостатка корма, хорошаго водопоя. Въ лѣто 1839 года, необыкновенно сухое и жаркое. при всеобщемъ неурожаѣ травъ и засухѣ, сибирская язва появилась во многихъ внутреннихъ и юго-западныхъ губерніяхъ, на скотѣ, и отъ него сообщалась людямъ, у которыхъ она обнаруживалась горячкою и огненными вередями (карбунгуль), которые переходили въ антоновъ огонь и не рѣдко причиняли смерть. Такое же вредное вліяніе на людей замѣчено мною въ 1843 году лѣтомъ и отъ падежа рогатаго скота во время свирѣпствованія между нимъ чумы. Вліяніе это, иногда очень опасное для жизни, является между татарами, которые огневиѣ (карбунгуль), появляющійся у нихъ за ушами по причинѣ сдиранія ими кожъ съ павшаго скота и употребленія въ пищу мяса колотой большой зачумленной скотины, называютъ заушницею (см. оболу-ушница).

Предохраненіе отъ зараженія сибирскою язвою состоитъ въ томъ, чтобы не прикасаться голыми руками къ больной скотинѣ и не брать ничего такого, къ чему она прикасалась. Людей, ходящихъ за такимъ скотомъ, нужно совершенно отдѣлнить и не позволять имъ сообщаться съ другими людьми до тѣхъ поръ, пока не прекратится язва, приказать скотскимъ стражамъ, чтобы послѣ всякаго обхожденія съ больнымъ скотомъ, во время дачи ему воды, корма, они обмывали руки въ соляной водѣ, купались въ рѣкѣ, мыли и провѣтривали свое платье; палый скотъ вывозить въ тѣлѣгахъ, а не тащить по землѣ, далеко въ поле зарывать глубоко въ землю, не сдирая съ него кожи, которую притомъ разрѣзать такъ, чтобы она сдѣлалась негодною ни для какого употребленія: это избавить другихъ крестьянъ отъ соблазна сдирать съ такого скота кожу. Кромѣ того нужно строго смотрѣть за крестьянами, особенно татарами, чтобы они не убивали больной скотины на мясо во время появленія падежа рогатаго скота, отъ чего бы онъ ни происходилъ, изъ опасенія, чтобы она не пала. Къ несчастію эта предосторожность не всегда соблюдается, и бѣдные люди, купившіе дешево говядину отъ больного скота, за дешевую свою погупку расплачиваются дорогою гнилою горячкою, а нерѣдко самою жизнію.

Условно-заразительныя повальныя болѣзни суть такъ называемыя острые сыпи: оспа, красуха (скарлатина) и корь; сюда же относятся судорожный кашель (коклюшъ) и воспаленіе дыхательнаго горла и гортани (группъ, перепончатая жаба). Доселѣ еще не постигнута врачами причина, по которой эти болѣзни появляются повально только между дѣтьми и не совершенно еще возмужалыми юношами обоого пола, и особенно свирѣпствуютъ жестоко весною и осенью, хотя и въ другія времена года совершенно не прекращаются; но по крайней мѣрѣ лѣтомъ и зимою онѣ оказываются рѣже, на меньшемъ числѣ дѣтей и не въ такой сильной степени.

Предохранительныя мѣры противъ этихъ болѣзней очень не удовлетворительны. Онѣ состоятъ въ томъ, чтобы здоровыхъ дѣтей не сооб-

щать съ большими и не подвергать ихъ частой и быстрой перемѣнѣ температуры, при выходѣ изъ теплой комнаты на свѣжій воздухъ, на дворъ, на улицу. Нужно ли для этого содержать здоровыхъ дѣтей безвыходно въ комнатахъ, кутать ихъ на прогулкѣ въ теплое платье, — мы навѣрно не знаемъ, но намъ извѣстно множество примѣровъ, что дѣти, не выходившія нигуда изъ своихъ комнатъ, тепло-содержимыя, и когда во всемъ домѣ не было ни одного больного ребенка, вдругъ за-немогали оспою, корью и пр., между тѣмъ какъ другія дѣти, жившія въ томъ домѣ, гдѣ, въ другихъ его квартирахъ, были больныя дѣти, равно дѣти, часто гулявшія на дворѣ, на улицѣ, и проч., не подвергались свирѣпствующей болѣзни; это зависитъ отъ какой-то готовности, воспримчивости, такъ сказать, жадности дѣтскаго тѣла къ заразѣ, по внутреннему ихъ расположенію одинъ разъ въ жизни, но въ чемъ состоитъ это ихъ внутреннее расположеніе, намъ неизвѣстно.

Предохранительныя мѣры, *въ особенности противъ оспы*, состоятъ въ заблаговременномъ привитіи дѣтямъ коровьей оспы. Малюткамъ нужно непремѣнно прививать предохранительную коровью оспу въ первые два года ихъ жизни, располагая однако такъ, чтобы прививаніе не сталкивалось съ прорѣзываніемъ зубовъ; а такъ какъ послѣднее рѣдко начпнается прежде 6—8 мѣсяцевъ по рожденіи, то оспу нужно прививать или по прошествіи первыхъ 3—6 мѣсяцевъ, или же черезъ два три года. Впрочемъ это правило можно допустить только тогда, когда нѣтъ нигдѣ въ близости натуральной оспы, при появленіи которой коровью оспу нужно прививать какъ можно скорѣе, развѣ дитя будетъ страдать другою какою-либо внутреннею болѣзнію; но наружныя дѣтскія болѣзни, молочная кора на лицѣ, струнья, парши, золотуха, разныя родимыя пятна и проч., не мѣшаютъ привитію оспы, послѣ котораго эти болѣзни и сами проходятъ.

**Примѣч.** Привитіе кори и красухи донынѣ оказывалось безуспѣшнымъ.

Предохранительнымъ средствомъ отъ красухи почитается извѣстное одуряющее растеніе, *красавица* (белладона), которую, при повальномъ свирѣпствованіи красухи, даютъ дѣтямъ, не имѣвшимъ еще этой болѣзни, въ весьма малыхъ, гомеопатическихъ приѣмахъ дециліоннаго раствора въ водѣ или смѣшенія съ сахаромъ 2—3 раза въ недѣлю; или же просто одинъ гранъ вытяжки красавицы растворяютъ въ столовой ложкѣ воды, крѣпко взбалтываютъ жидкость, которую и даютъ дѣтямъ по стольку капель, сколько они имѣютъ отъ роду лѣтъ, и приѣмы эти повторяютъ также два, три раза въ недѣлю. Хотя и нѣтъ достовѣрныхъ примѣровъ, чтобы красавица предохранила дѣтей отъ скарлатины, потому что не появленіе этой болѣзни у дитяти, принимавшаго красавицу, не доказываетъ еще, что это лѣкарство предохранило его отъ скарлатины, но достовѣрно то, что у дѣтей, принимавшихъ белладону, скарлатина оказывается *въ легкой степени*, не бываетъ смертельною и не оставляетъ по себѣ другихъ опасныхъ и продолжительныхъ болѣз-



ней: а уже одно это обстоятельство есть большой выигрышъ противъ такого бича, какъ скарлатина. Белладону же восхваляютъ, какъ предохранительное средство, и противъ перепончатой жабы или круша.

## КРАТКІЯ ПРАВИЛА

### СОБИРАТЬ, ВЫСУШИВАТЬ И ХРАНИТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЯ РАСТЕНІЯ И ЧАСТИ ИХЪ.

Собираніе растений и частей ихъ, нужное для желающихъ имѣть свои аптечки, производится не въ одно время, потому что не въ одно время достигаютъ они своей зрѣлости; по этому оно требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ. 1) *Корни* двухгодовыхъ растений должны быть собираемы осенью перваго года; потому что въ это время въ нихъ менѣе водянистыхъ частей, нежели весною и лѣтомъ. Осенью корни содержатъ выработанные соки, въ которыхъ сосредоточиваются всѣ ихъ лечебныя качества. Корни, собираемые на второй годъ, содержатъ уже много образовавшейся въ нихъ древесины; но таковыя должны быть выбрасываемы, по ихъ негодности для аптечки. 2) Корни многолѣтнихъ растений должны быть собираемы во время юности самаго растенія и въ эпоху, когда оно начинаетъ терять свои листья, исключая *ревень*, котораго корень вырывается на пятый или шестой годъ. 3) Корни противоскорбутныхъ растений, какъ то *ложечной травы*, *хрѣна*, *рѣдьки* и т. п. употребляются свѣжими, такъ какъ въ сокахъ ихъ содержится острое начало и летучее, которое чрезъ высушиваніе теряется. 4) *Распуколки* или почки сосны, березы и пр. собираются весною, когда онѣ покрыты клейкимъ, смолистымъ, ароматическимъ веществомъ, которому приписываютъ дѣйствительныя лечебныя свойства. 5) *Луковицы* осенника (*colchicum*) должны быть собираться осенью во время цвѣтенія. 6) *Стебли* паслена должны собираться осенью во время спаданія листьевъ и притомъ отрѣзываются только тѣ, которыя выросли съ весны. 7) Всѣ *корки* собираются осенью по спаденіи листьевъ, исключая *бүзинной*, которая соскабливается лѣтомъ. 8) *Листы* собираются обыкновенно во время юности растенія и передъ временемъ цвѣтенія его. Позднѣе собранныя бываютъ жестки, деревянисты, не такъ сочны, потому что сокъ ихъ истощается на зрѣлость плода. 9) Въ особенности не должно терять время для собиранія *цвѣт. роз.* Краснѣ розы, должны быть собираемы еще въ почкахъ, потому что въ это только время онѣ содержатъ наиболѣе вяжущихъ началъ. Прочіе цвѣты собираются во время ихъ совершеннаго разцвѣтанія и притомъ въ сухое время. Если они собираются въ дождливое время, то темнѣютъ, чернѣютъ, теряютъ часто свои ароматическія начала и легко портятся. 10) *Плоды* собираются совершенно

зрѣлыми. Тѣ плоды, которыя сочны, обыкновенно употребляются свѣжими для приготовленія сироповъ, консервовъ и другихъ лѣкарственныхъ формъ; напротивъ того, тѣ плоды, которыя назначаются для сбереженія въ зиму, должны быть собираемы не совсемъ дозрѣлыми. 11) *Зерна*, которыя бываютъ или мучнисты, или млечнисты (эмульсивны), или ароматическія, или роговистыя, собираются зрѣлыми и свѣжими, каковыми почитаются, когда мучнистыя зерна тяжелы и легко отдѣляются отъ своей оболочки; мучнистыя зерна полны и отъ сжатія не дѣлаются млечными; ароматическія легко отдѣляются изъ сѣменника своего; а роговистыя удобно отдѣляются отъ мягкости, ихъ заключающей, и имѣютъ свойственный имъ запахъ и цвѣтъ. 12) *Выросты* растительныя, каковы: бѣлая губка и трутъ (*Boletus laricis et ignarius*) и пр. собираются, когда первая будетъ бѣла; легка, ноздревата; а второй упругъ, гибокъ и довольно плотнаго строенія, чтобы не могъ легко раздираться. Сюда принадлежитъ рѣчная губка-бодяга (*spongia fluviatilis*), которую лучше собирать въ концѣ лѣта. Она должна быть бѣлаго, слегка пепельнаго цвѣта.

Высушиваніе собранныхъ растений и ихъ частей необходимо нужно; иначе онѣ легко портятся въ составѣ своемъ. Оно, основываясь на свойствѣ воды, растворяющей растенія, выпариваться въ воздухѣ, производится въ сушильняхъ двоякаго рода: сушильни съ сухимъ воздухомъ и сушильни съ разгоряченнымъ воздухомъ; первыми могутъ быть чердаки, построенные на югъ съ легкими листового желѣза крышами, чрезъ которыя легко проникаетъ солнечная теплота, съ досчатыми стѣнами, имѣющими отверстія, которыя по произволу могутъ быть открываемы и закрываемы для возобновленія воздуха; а для послѣднихъ, т. е. для сушиленъ съ разгоряченнымъ воздухомъ, могутъ служить наши овины различнаго устройства. При этомъ требуется соблюденіе слѣдующихъ правилъ. 1) Если сушится растеніе въ разгоряченномъ воздухѣ, то не должно подвергать его сначала сильному жару; иначе вода, содержащаяся въ немъ, подвергаясь кипяченію, измѣнитъ растворимыя въ немъ начала. Начинать должно съ 20 и 25° Ц, восходя постепенно до 35 и 40°. 2) *Корни, корки, стебли, цвѣты, сѣмяна* и проч. должны высушиваться особо. Корни волокнистыя, каковы цикорія, одуванчиковъ и пр., сперва вымачиваются для отдѣленія отъ нихъ земли; обрѣзывается верхняя ихъ часть, которая жестка, древесиста и почти безсочна; оскабливаются тонкіе корешки; разрѣзываются на куски въ длину на дюймъ, раздѣляются или расщепляются потомъ на три или четыре части. Изъ нѣкоторыхъ вырѣзываютъ сердцевину (*meditulum*) и отбрасываютъ ее, какъ изъ репейника и черно-горня (*synoglossum*); у другихъ вычищаютъ и бросаютъ корковую часть, какъ въ алтейномъ корнѣ. Такимъ образомъ приготовленные корни разстилаются для сушенія или на солнцѣ, или въ сушильняхъ. Мясистыя корни, обмытые отъ приставшей къ нимъ земли, какъ переступень, разрѣзываются тонкими кружками поперечно и раскладываются на рѣшеткахъ сушильни

въ сухимъ воздухѣ, пока они обвянутъ, и потомъ уже переносятся въ разгоряченный воздухъ. Когда они сдѣлаются ломки, то высушивание ихъ оканчивается. Корни луковичные, какъ морской лукъ, по отдѣленіи части, на которой находятся корневыя волокны, и наружнаго слоя чешуекъ, которыя тонки, красны и сухи; слѣдующіе за симъ слои собираются, отдѣляя ихъ отъ бѣловатой середины и раздѣляя ихъ на узкіе куски, которые раскладываютъ на рѣшетѣ и даютъ имъ завянуть, потомъ переносятъ въ сушильню, температуру которой постепенно увеличиваютъ. 3) *Стволы, деревья, корки*, содержа въ себѣ мало воды, легко высушиваются. Должно стараться изрѣзывать ихъ такъ, чтобы они представляли большую поверхность воздуху. Они высушиваются или на солнцѣ, или въ сухомъ, или разгоряченномъ воздухѣ. 4) Высушивание *листоовъ* зависитъ отъ ихъ толстоты и сочности. Толстыя листы мелиссы, мяты и пр. высушиваются въ сухомъ воздухѣ; тѣ, которые толсты и сочны, какъ листья огуречника или огуречной травы, требуютъ, по проявленіи ихъ, сушильни съ разгоряченнымъ воздухомъ, постепенно до 40° Ц., чаще переворачивая ихъ. 5) *Цвѣтныя стебли* пучками высушиваются въ сушильняхъ, какъ напр. васильки, иссопъ и пр. 6) При высушиваніи *цвѣтѣвъ* въ особенности должно стараться, чтобы они не потеряли ни цвѣта, ни запаха своего. Тѣ цвѣты, которыхъ запахъ легко улетучивается и ткань которыхъ слишкомъ растянута растительною водою, какъ въ крестоцвѣтныхъ, почти не могутъ высушиваться; другіе, напротивъ, высушиваются легко на солнцѣ или съ сушильнѣ, какъ напр. цвѣты липовые, бузиновые, ромашковые и т. д. 7) Цвѣты красныхъ розъ и гвоздикъ должны быть отдѣлены отъ ихъ усиковъ, разсыпаны на бумагѣ, разостланной на сухой шерстяной постилкѣ, и скоро высушиваются въ тѣни сушильни. Также высушиваются и цвѣты проскурняка, у которыхъ однако же нечего отрѣзывать. Цвѣты проскурняка чрезъ высушивание теряютъ свой естественный цвѣтъ и получаютъ хорошій синій цвѣтъ. Обыкновенныя розы сохраняютъ по высушиваніи свой запахъ, но теряютъ свой цвѣтъ. По высушиваніи цвѣтѣвъ отсѣиваютъ ихъ для отдѣленія отъ нихъ пыли, стебельковъ и другихъ примѣсей. 8) *Плоды* рѣдко высушиваются. Тѣ, которые нужно высушивать, сушатся или на солнцѣ, или на сушильнѣ, или въ печи, умѣренно разгоряченной, и притомъ сушка эта должна быть производима въ нѣсколько пріемовъ: чрезъ это плодъ остается мягкимъ. 9) *Зерна* мучнистыя сушатся безъ различія. Замѣтно, что разгоряченнымъ воздухомъ высушенная рожь лучше сберегается и въ 30 лѣтъ не теряетъ своей произрастительной силы. Зерна маслянистыя должны быть высушиваемы не въ сушильнѣ, но на солнцѣ. Оставляемая въ своей скорлупѣ, оны долѣе сохраняются безъ прогорклости. Ароматическія зерна высушиваются просто на воздухѣ, но не на солнцѣ, лучи котораго способствуютъ улетучиванію ихъ пахучести. Роговистыя зерна не требуютъ никакой предосторожности.

Сохраненіе сухихъ растений, будутъ ли они высушиваться у

себя на дому при заведеніи аптечки, или получаться сухими отъ матеріалистовъ, во всякомъ случаѣ наблюдается слѣдующее. Вообще вещества твердыя и имѣющія плотную ткань, удобнѣе высушивающіяся, удобнѣе и сберегаются. Поэтому *корни* сарсапарели, торментили, полигали, переступня и т. п. долѣе сохраняются безъ порчи; напротивъ, корни цикорія, девесила портятся скоро, плеснѣютъ. Вещества, содержащія въ составѣ своемъ смолу, каковы: бакаутъ, сассафрасъ, ипекагуана и т. п. могутъ быть сохраняемы очень долгое время. *Ароматическіе листы и травы*, равно и *мхи*, сберегаются очень долгое время; напротивъ, листы шалфея, бѣлены, пролѣски (*mercurialis*) и стѣнницы требуютъ частаго возобновленія въ аптечкѣ. *Цвѣты* должны быть сохраняемы въ сосудахъ наглухо закрытыхъ. Цвѣты ромашки, бузины, бѣлогопытника, розъ легко сохраняются; но не таковы цвѣты жимолости и царскаго скиптра (*uevbasci*), которые спустя нѣсколько мѣсяцевъ теряютъ свою силу. Такіе цвѣты, равно какъ цвѣты проскурняка, фіалки, должны быть содержимы въ весьма сухомъ мѣстѣ, чтобы они всегда легко растирались между пальцами. *Сѣмена* лучше сберегаются въ ихъ околосѣменникѣ. *Плоды* трудно сохраняются; сахарное вещество, содержащееся въ нихъ, привлекаетъ къ нимъ мухъ и другихъ насѣкомыхъ, а влага, въ нихъ заключающаяся, зарождастъ броженіе. Посему должно наблюдать: 1) чтобы сохраняемое вещество было по возможности удалено отъ солнечныхъ лучей, воздуха и влаги: сильный свѣтъ измѣняетъ цвѣтъ, воздухъ уноситъ запахъ, а влага, влѣдряясь въ вещество, смягчитъ его и располагаетъ къ броженію и къ плѣсени; 2) высушенные корни, корки и побѣги сохраняются въ деревянныхъ, сухихъ хорошо закрытыхъ, ящикахъ, цвѣты въ стеклянныхъ банкахъ, покрытыхъ бумагою, ароматическія сѣмена въ сухихъ, хорошо закупоренныхъ бутылкахъ; миндаль, льняное сѣмя и т. п. могутъ быть содержимы въ мѣшкахъ или вулькахъ въ сухомъ, но не въ жаркомъ воздухѣ; 3) растенія отечественныя не должны быть сберегаемы болѣе года, а посему и не должны они быть заготовляемы въ большомъ количествѣ; 4) тѣ растительныя вещества, которые потеряли свой цвѣтъ, или запахъ или повреждены насѣкомымъ, должны быть выбрасываемы.

## СПИСОКЪ

ПРОСТЫХЪ ЛѢКАРСТВЪ, КОТОРЫЯ НУЖНО ИМѢТЬ ВСЕГДА ВЪ ЗАПАСѢ, КОГДА НѢТЬ НИ ВРАЧА, НИ АПТЕКИ \*).

Аммоніаковая камедь . . . . .	Gummi ammoniacum.
Аравійская камедь . . . . .	Gummi arabicum.
Бодяга . . . . .	Spongia fluivatilis.
Бура . . . . .	Borax veneta.
Гофмановы капли . . . . .	Liquor anodynus mineralis Hofmani.
Доверовъ порошокъ † . . . . .	Pulvis Doveri.
Известь негашеная . . . . .	Calx viva.
Камфора . . . . .	Camphora.
Квасцы . . . . .	Alumen.
Кислота виннокаменная . . . . .	Acidum tartaricum.
» сѣрная † . . . . .	» sulphuricum.
Кора волчьего лыка . . . . .	Cortex meserei.
» вязовая . . . . .	» ulmi.
» вятловая . . . . .	» sālīcis fragilis.
» дубовая . . . . .	» quercus.
» ивовая . . . . .	» salicis.
» крушины . . . . .	» rhami franguli.
» огуречная . . . . .	» cucumis sativae.
» ольховая . . . . .	» alni.
» хинная . . . . .	» chinae.
» черемуховая . . . . .	» pruni padi.
Корень аира . . . . .	Radix calami aromatici.
» белладоны † . . . . .	» belladonae.
» валеріаны . . . . .	» valerianae.
» девясила . . . . .	» inulae Helenii.
» дягиля . . . . .	» angelicae.
» жигунца зубнаго . . . . .	» pyrethri.
» завязной . . . . .	» tormentillae.
» истодный . . . . .	» polygalae amarae.
» имбиря . . . . .	» zingiberis.
» конскаго щавеля . . . . .	» rumicis aquatici.
» мыльнянки . . . . .	» saponariae.
» одуванчика . . . . .	» taraxaci.
» осоки . . . . .	» caricis arenariae.
» проскурнячный . . . . .	» althaeae.
» пырейный . . . . .	» graminis.

\*) ЛѢкарства, не дозволенные къ отпуску изъ аптекъ безъ рецептовъ врачей, отмѣнены †. Всѣ же прочія, не означенныя этимъ знакомъ, отпускаются и безъ рецептовъ.

Корень ревенный . . . . .	Radix rhei.
» репейный . . . . .	» bardanae.
» салепный . . . . .	» salep.
» солодковый . . . . .	» liqueritiae.
» хмѣля . . . . .	» humuli lupuli.
» цикорія . . . . .	» cichorii.
» черемичный † . . . . .	» hellebori albi.
» чернобыльника . . . . .	» artemisiae gularis.
» чистотѣля . . . . .	» chelidonii.
» щавеля водяного . . . . .	» lapathi aquatici.
» змѣвика . . . . .	» serpentariae virginianae
Кремортартаръ . . . . .	Cremortartari.
Купоросъ синий † . . . . .	Vitriolum coeruleum.
» зеленый . . . . .	» martis.
» бѣлый † . . . . .	» album.
Листы березы . . . . .	Folia betulae.
» бѣлены † . . . . .	» hyoscyami.
» бугвицы . . . . .	» betonicae.
» зори . . . . .	» leuistici.
» лѣснаго орѣшника . . . . .	» corylli.
» рожи . . . . .	» maluae.
» тологнянки . . . . .	» ursae ursi.
Ляписъ (адскій камень) † . . . . .	Lapis infernalis.
Магнезія углекислая . . . . .	Magnesia carbonica.
Масло деревянное . . . . .	Oleum oliuarum.
» льняное . . . . .	» lini.
» миндальное . . . . .	» amygdalarum.
» влещевинное . . . . .	» ricini.
Мѣль бѣлый . . . . .	Creta alba.
Мятныя капли . . . . .	Essentia menthae.
Нашатырь . . . . .	Murias ammonii.
Опій † . . . . .	Opium purum,
Побѣги калиновые . . . . .	Processus viburni opuli.
Почки березовыя . . . . .	Gemmae betulinae.
Поташъ простой . . . . .	Potassa s. cineres clauellati.
» углекислый . . . . .	Kali carbonicum.
Пластырь милотный . . . . .	Emplastrum melilolli.
Раковины устричныя . . . . .	Conchae s. testae ostreae.
Рвотный камень † . . . . .	Tartarus emeticus.
» корень † . . . . .	Ipecacuanna.
Ртуть . . . . .	Hydrargyrum.
Сабуръ обыкновенный † . . . . .	Aloe soccotrina.
Сахаръ свинцовый . . . . .	Sacharum saturni.
Селитра . . . . .	Nitrum.
Сода углекислая . . . . .	Soda carbonica.

Сокъ солодковый . . . . .	Succus liqueritiae.
Соль глауберова . . . . .	Sal Glauberi.
» горькая . . . . .	» amarum.
Скипидаръ бѣлый . . . . .	Oleum terebintinae.
Спиртъ муравейный . . . . .	Spiritus formicarum.
» камфорный . . . . .	» camphoratus.
» оленьяго рога . . . . .	» cornu coerui.
» нашатырный . . . . .	» salis ammoniaci.
Сѣрный цвѣтъ . . . . .	Flores sulphuris.
Стебли сладкогорькаго паслена . . . . .	Stipites solani dulcamari.
Сѣмя горчицы . . . . .	Semen sinapis.
» жгучей крапивы . . . . .	» urticae urentis.
» укропное . . . . .	» foeniculi.
Трава богородская . . . . .	Herba serpilli.
» божьяго дерева . . . . .	» abrotani.
» глухой крапивы . . . . .	» lamii albi.
» донника . . . . .	» meliloti.
» душицы . . . . .	» origani vulgaris.
» дрозъ красильный . . . . .	» genistae tinctoriae.
» дымянки . . . . .	» fumariae bulbosae.
» ложечная . . . . .	» cochleariae.
» мать-мачиха . . . . .	» tussilaginis farfarae.
» мяты простой . . . . .	» Menthae balsamitae.
» » кудрявой . . . . .	» » crispae.
» » перечной . . . . .	» » piperitae.
» наперсточная . . . . .	» digitalis purpurea.
» папоротника . . . . .	» aspidii filicis.
» подорожника . . . . .	» plantaginis.
» полыни . . . . .	» absinthii.
» проскурняка . . . . .	» altheae.
» чабера . . . . .	» Satureae.
» череды . . . . .	» bidentis tripartitae.
» чернобыльника . . . . .	» artemisiae vulgaris.
» шалфея . . . . .	» salniae officinalis.
Хинная соль . . . . .	Sulphas chinini.
Хинный экстрактъ . . . . .	Extractum chinae.
Хлориновая вода . . . . .	Soda chloreniata.
Цвѣты баранника . . . . .	Flores arnicae.
» бузины . . . . .	» sambuci.
» жабника огненнаго . . . . .	» flammulae.
» красной розы . . . . .	» rosarum rubrarum.
» липовые . . . . .	» tiliae.
» маковые . . . . .	» papaveris.
» розмарина . . . . .	» rosmarini.
» ромашки . . . . .	» chamomillae.

Цвѣты шиповника . . . . .	Flores rosarum sylvestrium.
Шпанскія мушки <sup>†</sup> . . . . .	Lyttae vesicatoriae.
Элексиръ Галлеровъ <sup>†</sup> . . . . .	Elixirium halleri.
Ягода калины . . . . .	Baccae viburni opuli.
» малины . . . . .	» rubi idaei.
» рябины . . . . .	» sorbi acurariae.
» черники . . . . .	» vaccinii myrtilli.
» черемухи . . . . .	» pruni padi.

## СПИСОКЪ

ВРАЧЕБНЫХЪ РАСТЕНИЙ, КОТОРЫЯ МОГУТЪ БЫТЬ РАЗВОДИМЫ ВЪ ОГОРОДАХЪ,  
СЪ ПОКАЗАНІЕМЪ СПОСОБОВЪ СОБИРАНІЯ И РАЗВЕДЕНІЯ.

**Анисъ** (*Pimpinella anisum*). Сѣмена сперва сажаются въ парникахъ, а потомъ расадки сажаются на грядкахъ, въ черноземѣ.

**Анютины глазки** (*Viola tricolor*). Сѣмена сѣются на всякой почвѣ, и разъ посѣянное растеніе разводится само собою.

**Баранникъ горный** (*Arnica montana*). Разводится какъ и анисъ.

**Безвременникъ** (*Colchicum autumnale*). Разводится, или изъ свѣжихъ луковицъ, или изъ сѣмянъ, когорыя сажаются или сѣются въ апрѣлѣ, на черноземѣ.

**Бѣлена** (*Huscycamus niger*). Сѣмена сѣются во всякое время весны и лѣта, на всякаго рода почвѣ, даже и неудобной.

**Болголовъ** (*Conium maculatum*). Смотри бѣлена.

**Бузина черная** (*Sambucus nigra*). Изъ сѣмянъ весною; на почвѣ всякаго рода.

**Буквица аптечная** (*Betonica officinalis*). Сѣмена сѣются въ маѣ, на черноземѣ, или глинистой почвѣ.

**Волчецъ кудрявый** (*Cardus benedictus*). Сѣмена предварительно необходимо намачивать въ водѣ, а потомъ сѣять въ маѣ, на черноземѣ.

**Волчій ядъ** (*Aconitum napellus*). Разводится посредствомъ сѣмянъ, которыя сѣются въ маѣ, на всякой почвѣ. Употребляются листья, которыя собираются тогда, когда растеніе начинаетъ цвѣсти.

**Горчица черная** (*Sinapis nigra*). Сѣмена сѣются въ апрѣлѣ на черноземѣ.

**Девясилъ высокій** (*Inula Helenium*). Разводится изъ сѣмянъ, или изъ корня, на всякаго рода почвѣ, въ апрѣлѣ или маѣ. Разведенное растеніе остается навсегда.

**Дягиль садовый** (*Angelica archangelica*). Разводится посредствомъ сѣмянъ, въ маѣ, на глинистой почвѣ. Употребляется корень, который собирается осенью.

**Душица обыкновенная** (*Origanum vulgare*). Изъ сѣмянъ, во всякое время весны и лѣтомъ; на всякой почвѣ.



**Зоря, любистоць** (*Levisticum officinale*). Смотри девясиль.

**Иссопъ** (*Hyssopus officinalis*). Сѣмена сперва сажаются въ парникахъ, потомъ разводятся разсадками, на черноземѣ.

**Красавка, сонная одурь** (*Atropa Belladonna*). Сѣмяна сѣютъ въ мартѣ или апрѣлѣ, на черноземѣ. Это растеніе можетъ зимовать, если его покрывать соломой, или рогожею. Листья собираются при начинающемъ цвѣтеніи.

**Леванда** (*Lavandula Spica*). Смотри Иссопъ.

**Маіоранъ** (*Origanum majorana*). Смотри Иссопъ.

**Макъ обыкновенный** (*Papa-ver Somniferum*). Разводится изъ сѣмянъ весною, на всякой почвѣ.

**Марѣна** (*Rubia tinctorum*). Смотри Иссопъ.

**Мелісса** (*Mellisa officinalis*). Смотри Иссопъ.

**Мята кудрявая** (*Mentha crispa*). Смотри Иссопъ.

**Мята перечная** (*Mentha piperita*). При разведеніи этого растенія должно наблюдать слѣдующее: 1) сѣять на влажной, глинистой почвѣ; 2) чрезъ 3 года перемѣнять почву и 3) вблизи его не должна расти кудрявая мята.

**Перецъ стручковый** (*Capsicum annuum*). Сѣмена сѣются въ апрѣлѣ, или маѣ на черноземѣ.

**Размаринъ** (*Rosmarinus officinalis*). Смотри Иссопъ.

**Ромашка** (*Matricaria Chamomilla*). Сѣются сѣмена въ маѣ, на всякаго рода почвѣ.

**Римская ромашка** (*Anthemis nobilis*). Сѣмена этого растенія сперва сѣютъ въ парникѣ, а потомъ разсадка сажается на гряды. Почва должна быть черноземъ. Употребляются цвѣты, которые собираются во время полного цвѣтенія.

**Рута душистая** (*Ruta graveolens*). Смотри Иссопъ.

**Тимьянка** (*Thymus vulgaris*). Смотри Иссопъ.

**Тминъ душистый** (*Carum carvi*). Сѣмена этого растенія должно посѣять одинъ разъ, въ маѣ, а потомъ оно въ слѣдующіе годы разводится навсегда само собою. Почва можетъ быть всякаго рода.

**Фиалка душистая** (*Viola odorata*). Сѣмена сѣютъ въ апрѣлѣ на черноземѣ.

**Укропъ** (*Foeniculum vulgare*). Смотри Иссопъ.

**Чаберъ огородный** (*Satureja hortensis*). Смотри Иссопъ.

**Чемерица бѣлая** (*Veratrum album*). Смотри Иссопъ.

**Царскій скипетръ** (*Verbascum Thapsus*). Сѣмена сѣются весною, на всякой почвѣ. Разъ посѣянное, разводится само собою.

**Шалфей** (*Salvia officinalis*). Смотри Иссопъ.

#### Примѣчанія:

1) Сѣмена берутся совершенно зрѣлыя, высушенныя въ комнатахъ, а крупкія и толстыя сѣмена намачиваются предварительно нѣсколько времени въ водѣ, или кладутся на мокрый войлокъ, на сутки и болѣе.

смотря по твердости сѣмянъ. 2) Разсада, полученная изъ сѣмянъ, сажается на гряды въ разстояніи одна отъ другой на четверть аршина. 3) Одинъ видъ растенія отъ другаго должно сажать въ разстояніи 2—3 аршинъ, или на отдѣльныя гряды. 4) При каждомъ видѣ растенія должна находиться надпись на доскѣ, чтобы не смѣшивать одного съ другимъ. 5) Корни собираются осенью, въ сентябрѣ и октябрѣ, листья при начинающемся цвѣтеніи, въ маѣ или іюнѣ, цвѣты при полномъ развѣтеніи въ іюнѣ или іюль, а сѣмяна при совершенномъ созрѣніи, въ августѣ, или сентябрѣ. 6) Многолѣтнія растенія покрываются на зиму соломой и рогожами. 7) Сѣмяна, посаженные на грядахъ, а равно разсаду надобно сѣять и сажать тогда только (въ апрѣлѣ и маѣ), когда ночные морозы совершенно прекратятся. 8) Многія изъ показанныхъ въ спискѣ растеній, какъ нацрим. буквица, ромашка, девясилъ, бѣлена и нѣкоторыя другія въ губерніяхъ южныхъ и югозападныхъ растутъ въ изобіи дико, а потому тамъ ихъ разводить въ огородахъ не должно, а собирать съ прочими дикорастущими лечебными произрастеніями.



## ОГЛАВЛЕНІЕ

предметовъ, обѣихъ частей Самоучителя Сельскаго Лѣченія.

	Часть.	Стран.
Абрикосы (см. пища растительная, сахарная и кислая).		
Ангійская болѣзнь (см. золотуха).		
Апоплексія (см. ударъ).		
Апельсины (см. пища растительная сахарная и кислая).		
Аппетитъ . . . . .	I.	23
Арбузы (см. пища растительная, сахарная и кислая).		
Ароматическая и болеутоляющая припарка №№ 54 и 55 . . . . .	—	382
Ароматическій мѣшечекъ №№ 68 и 69 . . . . .	—	383—384
Ароматическая противугниlostная припарка № 56 . . . . .	—	382
Ароматическая поташно-соляная ванна № 179 . . . . .	—	396
Артишоки (см. пища растительная).		
Аскариды (см. маленькіе кругленькіе червячки).		
Астраханцы (см. мѣстопребываніе) и . . . . .	II.	245
Атлеты . . . . .	—	219
Аутенритова нарывная мазь № 79 . . . . .	I.	385
Бабки повивальныя . . . . .	II.	219
Бальзамъ наружный раздражающій № 145 . . . . .	I.	392
Баньники (см. прачки) . . . . .		
Баранина (см. мясная пища).		
Барабанное напряженіе живота (см. вѣтры).		
Башмачники (см. сапожники).		
Бѣдница (см. лихорадка перемежающая).		
Безсонница . . . . .	II.	55—58
Безгласіе . . . . .	—	78—79
Бекасъ (см. мясная пища).		
Бѣлоруссы (см. россияне средней части Россіи).		
Бѣшенство . . . . .	—	79—83
Березовый сиропъ № 165 . . . . .	I.	395
Березовая мазь № 166 . . . . .	—	—

	Части.	Стран.
Березовая дегтярная мазь № 167. . . . .	I.	395
Бергамоты (см. пища растительная).		
Бессарабцы (см. южная страна и малороссіяне).		
Беременность. . . . .	—	43
Бубонъ (см. венерическая болѣзнь).		
Бобы (см. пища растительная).		
Болѣзни хлѣбныхъ зеренъ и зеленн. . . . .	—	13
Борщъ (см. пища приготовленная и приправленная).		
Болѣзни лихорадочныя . . . . .	I.	63
Болѣзни не лихорадочныя . . . . .	II.	1
Болѣзни нервныя . . . . .	—	2
Болѣзни крови . . . . .	—	83
Болѣзни питанія . . . . .	—	110
Болѣзни мѣстныя. . . . .	—	185
Болѣзни повальныя, безусловно-заразительныя . . . . .	—	436—439
Болѣзни повальныя, условно-заразительныя . . . . .	—	440—445
Болѣзни южнаго края (см. южныя закавказцы и малороссіяне).		
Болѣзненные отложенія . . . . .	—	142
Болѣзни отдѣленій и испражнений . . . . .	—	172
Болѣзненный потъ . . . . .	—	179—180
Болѣзненное мѣсячное кровоочищеніе . . . . .	—	180—185
Бойцы (см. атлеты).		
Бородавка . . . . .	—	111—114
Бульонъ (см. пища приготовленная).		
Бурборизмъ въ животѣ (см. вѣтры).		
Бурлаки (см. носильщики).		
Брусника (см. пища растительная, сахарная и кислая).		
Влины . . . . .	I.	9
Бѣлужина сырая и соленая . . . . .	—	20
Бѣлая горячка . . . . .	—	119—129
Бракъ (см. супружество).		
Вальдшнепъ (см. мясная пища).		
Вариолоидъ (см. оспа натуральная вѣдоизмѣненная).		
Вариолоидъ прививной (см. предохран. оспа видоизмѣн.).		
Вакцина (см. оспа предохранительная).		
Вареники. . . . .	—	9
Варенья (см. пища сахарная и кислая).		
Великороссы (см. Россіяне средней части Россіи).		
Великороссія . . . . .	II.	248
Венерическая болѣзнь . . . . .	—	114—125
Вередъ, его опредѣленіе, признаки хлѣченіе и проч. . . . .	I.	66—70
Вертлужница (см. поясничница).		
Весеннія лихорадки (см. лихорадка перемежающаяся).		
Ветчина . . . . .	—	20

Вѣтренаѣ колика (см. вѣтры).		
Вѣтренаѣ оспа, вѣтреница (см. оспа натуральная ложная).		
Виноградъ (см. пища растительная, сахарная и кислая).		
Виноградари . . . . .	II.	220
Винная ягода (см. пища растительная, сахарная и кислая).		
Вишни (см. пища растительная, сахарная и кислая).		
Вѣтренаѣ колика (см. колика вѣтренаѣ).		
Вѣтры . . . . .	—	47—49
Вѣятели (см. сѣятели).		
Вода (см. питье).		
Вода горячая и холодная . . . . .	I.	22
Вода дегтярная (см. дегтярная вода).		
Вода съ кислотами . . . . .	—	22
Вода хлоридная № 187 . . . . .	—	397
Вода известковая простая № 216 . . . . .	—	401
Вода известковая устричная, первичная, вторичная и третичная №№ 217, 218 и 219 . . . . .	—	—
Возбуждающая и очищающая присыпка № 57 . . . . .	—	382
Воздухъ и его разности . . . . .	—	24
Возрасть и его разности . . . . .	—	37
Возрасть дѣтскій . . . . .	—	—
Возрасть возмужалый . . . . .	—	38—39
Возрасть критическій женщины . . . . .	—	44
Воспаленіе, его опредѣленіе, теченіе и раздѣленіе . . . . .	—	64
Воспаленіе ушное, его опредѣленіе, признаки, лѣченіе и проч. . . . .	—	113—117
Воспаленіе головное (см. головное внутреннее воспаленіе).		
Воспаленіе спинное внутреннее . . . . .	—	192—195
Воспаленіе дыхательнаго горла . . . . .	—	140
Воспаленіе легкихъ истинное . . . . .	—	149—157
Воспаленіе легкихъ ложное . . . . .	—	157—159
Воспаленіе подреберной плевы . . . . .	—	159—167
Воспаленіе сердца и его сумочки . . . . .	—	167—170
Воспаленіе глудобрюшной преграды . . . . .	—	170—171
Воспаленіе печени . . . . .	—	171—184
Воспаленіе селезенки . . . . .	—	178—179
Воспаленіе желудка . . . . .	—	179—184
Воспаленіе кишекъ . . . . .	—	184—194
Воспаленіе брюшины . . . . .	—	191—193
Воспаленіе матки . . . . .	—	194—199
Воспаленіе мочеваго пузыря . . . . .	—	199—203
Воспалительная плева крови . . . . .	—	164
Воспаленіе почекъ . . . . .	—	203—206
Воспаленіе глазъ (см. глазовоспаленіе).		

	Части.	Стран.
Водяная болѣзнь и ея виды. . . . .	II.	162—172
Водянка (см. водяная болѣзнь).		
Водоносы . . . . .	—	221
Волосняники. . . . .	—	—
Вотяки (см. Россiяне средней части Россiи).		
Вурчанiе (см. бурборизмъ).		
Выборъ кормилицы. . . . .	—	254
Выпивальщицы (см. швей).		
Вязальщицы (см. скорняки).		
Вздутый животъ (см. золотуха).		
Внѣшняя жизнь человѣка. . . . .	I.	6 и 33
Внутренняя жизнь человѣка. . . . .	—	3—6
Врачеванiе не ремесло (см. лѣченiе).		
Вредъ сидячей жизни и польза дѣятельной жизни поселянъ . . . . .	—	27
Вшивость . . . . .	II.	146—147
Газы (см. пары).		
Гаршнепъ (см. мясная пища).		
Геморой . . . . .	—	102—110
Говядина (см. мясо вареное).		
Гоноррея (см. венерическая болѣзнь).		
Горохъ (см. пища растительная).		
Горошекъ (см. пища растительная и слизистая).		
Головное внутреннее воспаленiе . . . . .	I.	117—130
Горячки . . . . .	—	287—288
Горячка воспалительная. . . . .	—	288—296
Горячка желчно-воспалительная . . . . .	—	296—299
Горячка воспалительно-мокротная. . . . .	—	299—302
Горячка желудочно-мокротная (см. ревматизмъ) . . . . .	—	207—212
Горячка желудочно-желчная (см. ревматизмъ первоначальный, лихорадочный) . . . . .	—	207—215
Горячка гнилая. . . . .	—	302—311
Горячка нервная . . . . .	—	311—323
Горячка тифозная (см. горячка гнилостно-нервная).		
Горячка гнилостно-нервная . . . . .	—	316
Головокруженiе . . . . .	II.	2—4
Головная боль . . . . .	—	4—7
Горчичникъ №№ 88, 89, 90. . . . .	I.	366
Гофмановы капли № 51 . . . . .	—	382
Горшечники (см. кирпичники).		
Гуксгамово вино (см. сурмяное вино).		
Гуньба (см. молочница).		
Глазовоспаленiе, его виды и подраздѣленiя. . . . .	—	222—232
Глазная укрѣпляющая вода пленка № 152 . . . . .	—	393
Глазные капли Левизона № 153 . . . . .	—	—

	Части.	Стран.
Глазной линиментъ Трекурта № 154 . . . . .	I.	—
Глазная примочка Веллера № 155 . . . . .	—	—
Глазная мазь Пленка № 156 . . . . .	—	—
Глазной линиментъ Гуфланда № 157 . . . . .	—	—
Глазная вода Рихтера № 158. . . . .	—	394
Глазная вода Сандерса № 159 . . . . .	—	—
Глазная вода итальянская № 160 . . . . .	—	—
Глазные капли купца Арешнигова № 162. . . . .	—	—
Глазные капли негодянта Моллера № 161 . . . . .	—	—
Глазные капли купца Трофимова № 163 . . . . .	—	—
Глазная домашняя примочка яично-квасцовая № 164 . . . . .	—	—
Глазная примочка профессора Буяльского № 168 . . . . .	—	—
Глисты . . . . .	II.	148—154
Глухарь (см. мясная пища).		
Греча (см. пища растительная).		
Грибы (см. пища растительная и слизистая).		
Гриппъ. . . . .	I.	359—360
Груши (см. пища растительная, сахарная и кислая).		
Грузины (см. мѣстопробываніе), и. . . . .	II.	245
Грудной простудный кашель (см. катарръ грудной).		
Дактилагра (см. подагра).		
Дегтярная вода № 70 . . . . .	I.	384
Дегтярное мыло простое и зеленое №№ 224, 227 . . . . .	—	402
Дегтярное известковое противулишайное мыло № 228. . . . .	—	—
Дегтярно-ртутная, противулишайная народная мазь № 222 . . . . .	—	401
Декоктъ (см. отваръ).		
Дикія козы (см. мясная пища).		
Дѣтскій цвѣтъ (см. золотуха).		
Діаконы (см. пѣвцы).		
Диета слабымъ людямъ . . . . .	—	36
Диета и образъ жизни для пришельцевъ въ жаркія страны . . . . .	II.	246
Диететическія правила относительно пищи и питья. . . . .	I.	23
Доверовы порошки № 137 . . . . .	—	391
Дыни (см. пища растительная, сахарная и кислая).		
Дупель (см. мясная пища).		
Дровосѣки (см. рубители строеваго лѣса).		
Дроздь (см. мясная пища).		
Ежовникъ (см. пища растительная).		
Ершь (см. мясо рыбы).		
Жаба зѣва . . . . .	—	131—140
Жаворонокъ (см. мясная пища).		
Желе (см. пища сахарная и кислая).		
Желудочно-кишечныя спазмы . . . . .	II.	47—49
Желтуха . . . . .	—	158—162

Желтяница (см. желтуха).	—	221
Живодеры . . . . .	—	221
Животъ полный твердый (см. вздутый животъ).		
Жизнь сидячая и дѣятельная (см. вредъ сидячей жизни и польза отъ дѣятельной).	II.	245
Жизнища . . . . .	I.	20
Жиръ гусиный, бараній и говяжій . . . . .	II.	222
Жилицы . . . . .	—	244
Завологодцы (см. мѣстопребываніе) и . . . . .	—	271—272
Задавленные . . . . .	—	271—272
Задержаніе мочи (см. трудное испражненіе мочи).		
Задохшіеся отъ вредныхъ паровъ и газовъ . . . . .	—	266—271
Задушенные (см. повѣшенные) . . . . .		
Заецъ (см. мясная пища).		
Закавказцы (см. мѣстопребываніе), и . . . . .	—	245—246
Запоръ на низъ . . . . .	—	172—175
Заусеница (см. золотуха).		
Заушница . . . . .	I.	73
Замершіе . . . . .	II.	263—264
Зашейница (см. золотуха).		
Затылочно-шейница (см. ревматизмъ затылочно-шейный).		
Земледѣльцы . . . . .	—	222
Земляника (см. пища сахарная и кислая).		
Земляная ванна . . . . .	—	313
Зелень . . . . .	—	12—15
Зеленое мыло—простое № 226 и дегтярное — № 227 . . . . .	I.	402
Зобъ на шеѣ (см. золотуха).		
Золотуха . . . . .	—	125—138
Зубная боль . . . . .	II.	7—10
Злая корча . . . . .	—	53—55
Игольщики . . . . .	—	223
Ипохондрія . . . . .	—	11—17
Израчники (см. кирпичники).		
Изнурительная лихорадка (см. лихорадки припадочныя).		
Исходъ лихорадочныхъ болѣзней . . . . .	I.	64
Истерика . . . . .	II.	24—28
Инфлюенца (см. гриппъ).		
Искривленія костей (см. золотуха).		
Кавказцы (см. малороссіяне).		
Кали ѣдкое (см. щелокъ поташный).		
Каменная болѣзнь . . . . .	—	154—158
Камфорное вино № 52 . . . . .	—	382
Каменьщики (см. кузнецы).		
Камфорное масло № 71 . . . . .	I.	384



	Часть.	Стран.
Камфорный порошокъ одинъ и съ селитрою № 124—134 . . . . .	I.	390—391
Камфорное мыло № 144 . . . . .	—	392
Капли валеріаны (см. тинктура валеріаны).		
» ипанскихъ мушекъ № 117 . . . . .	—	389
» кисляя успокоивающія—№ 126 . . . . .	—	390
» мятныя — № 66 . . . . .	—	383
Капуста (см. пища растительная).		
Катарръ носовой . . . . .	—	347—351
Катарръ грудной . . . . .	—	351—359
Катарръ горловой (см. катарръ грудной).		
Катарръ легочный (см. катарръ грудной).		
Карбункулъ (см. огневикъ).		
Картофель (см. пища растительная крахмальная).		
Каштаны (см. пища растительная).		
Каша (см. пища приготовленная).		
Кашель . . . . .	II.	17—19
Кашель грудной простудный (см. катарръ грудной).		
Кильки . . . . .	I.	67
Кирпичники . . . . .	II.	223
Кислые щп (см. вода съ кислотами).		
Козлецъ (см. пища растительная, крахмальная кислота).		
Компотъ (см. пища сахарная и кислая).		
Коклюшь . . . . .	I.	360—367
Колотье (см. воспаленіе подреберной плевры).		
Колिका . . . . .	II.	34—40
Колика вѣтреная (см. колика) . . . . .	—	35
Большель новорожденнаго . . . . .	—	251
Корь . . . . .	I.	270—277
Корча злая (см. злая корча).		
Короста (см. чесотка).		
Консерва (см. розовая приправа).		
Кожевники . . . . .	II.	224
Когесники . . . . .	—	224
Кормилицы . . . . .	—	—
Косцы (см. жнецы).		
Кочующіе инородцы (см. самоѣды).		
Бормленіе новорожденнаго собственнымъ молокомъ . . . . .	—	252
Бормленіе младенца искусственное . . . . .	—	253
Бормленіе новорожденнаго младенца кормилицею . . . . .	—	254
Кошемаръ (см. навалъ).		
Букуруза (см. пища растительная).		
Булѣбяки . . . . .	I.	9
Буричьа слѣпота (см. ночная куричьа слѣпота).		
Буропатка (см. мясная пища).		

	Части.	Стран.
Кузницы . . . . .	II.	225
Кухарки . . . . .	—	—
Квасъ (см. вода съ кислотами).		
Крапива молодая (см. пища растительная).		
Крапивная сыпь . . . . .	I.	239—242
Крапивная лихорадка (см. крапивная сыпь).		
Краснуха . . . . .	—	277—278
Красуха (см. скарлатина).		
Красильщики . . . . .	II.	226
Крахмалщики . . . . .	—	21
Кризисъ и критическіе дни (см. рѣшеніе).		
Критическій возрастъ женщины . . . . .	I.	44
Кровотеченія . . . . .	II.	93—95
Кровотеченіе носовое . . . . .	—	95—97
Кровохарканіе . . . . .	—	97—101
Кровавое мочетеченіе . . . . .	—	108—110
Кровотеченіе изъ матки . . . . .	—	—
Кровочистительный деконтъ — № 147, 148 . . . . .	I.	181—392
Крупъ (см. воспаленіе дыхательнаго горла).		
Кружевницы (см. швей).		
Крупеники (см. сѣтели).		
Круподеры (см. крупеники).		
Крымцы . . . . .	II.	245
Крыжовникъ (см. пища сахарная и кислая).		
Крючички (см. носильщики).		
Клецки . . . . .	I.	9
Блюква (см. пища растительная, сахарная и кислая).		
Блубинга (см. пища сахарная и кислая).		
Ладонница (см. ревматизмъ ладоней и подошвъ).		
Лебеда (см. пища растительная).		
Лѣкарства составныя (см. составныя лѣкарства).		
Летучая нашатырная мазь одна и съ камforoю №№ 76 и 77 . . . . .	—	385
Летучая мазь оленьяго рога № 123 . . . . .	—	390
Ленточный глистъ (см. плоскій глистъ).		
Лѣченіе не ремесло . . . . .	—	2—3
Лихорадочныя болѣзни (см. болѣзни лихорадочныя).		
Лихорадки вообще . . . . .	—	286
Лихорадки въ частности . . . . .	—	323
Лихорадки припадочныя . . . . .	—	323—325
Лихорадка перемежающая . . . . .	—	326—347
Лихоманка (см. лихорадка перемежающая).		
Лихорадки перемежающія южно-крымскія . . . . .	—	347
Лимоны (см. пища растительная, сахарная и кислая).		
Лимонадъ (см. вода съ кислотами).		

	Части.	Стран.
Лимфатическія опухоли (см. золотуха).		
Личная боль (см. ревматизмъ личной).		
Лишай . . . . .	II.	138—142
Литовцы (см. Россіяне средней части Россіи).		
Ломщики судовъ . . . . .	—	226
Ломота (см. послѣдовательный ревматизмъ). . . . .	I.	208
Ломотная горячка (см. ревматизмъ тѣльный первоначальный, лихорадочный) . . . . .	—	207—212
Лукъ (см. пища растительная).		
Любострастная болѣзнь (см. венерическая болѣзнь).		
Лямщики (см. носильщики).		
Мазь съ надощникомъ № 78. . . . .	—	385
Мазь ртутная (см. плащицы, ихъ лѣченіе). . . . .	—	410
Мазь нарывная (см. нарывная мазь).		
Мазь успокоивающая и болеутоляющая № 8. . . . .	—	385
Мазь простонародная раздражающая № 150 . . . . .	—	393
Мазь хинной соли для дѣтей № 200 . . . . .	—	399
Мазь дегтярно-ртутная, противолышная народная № 222. . . . .	—	401
Мазь простонародная, противозолотушная № 229 . . . . .	—	402
Мазь березовая изъ березовыхъ почекъ №№ 166 и 231 . . . . .	—	395—403
Макарены (см. пища крахмальная).		
Маленькіе кругленькіе червячки (см. глисты).		
Малороссіяне (см. мѣстопробываніе) и. . . . .	II.	246
Маляры (см. кузнецы).		
Мармеладъ (см. пища сахарная и кислая).		
Масла выжатія (см. медъ).		
Масло конопляное, орѣховое, льняное, маковое, оливковое, миндальное и маковое . . . . .	I.	12
Масло коровье . . . . .	—	21
Маскированные лихорадки. . . . .	—	327
Медъ. . . . .	—	11
Медовая лепешка № 21 . . . . .	—	379
Медокъ изъ буры отъ молочницы № 170. . . . .	—	395
Медокъ изъ буры съ квасцами № 173 . . . . .	—	—
Медокъ изъ бѣлаго купороса отъ молочницы № 171. . . . .	—	—
Меланхолическій темпераментъ . . . . .	—	47
Могильщики . . . . .	II.	226
Мозоль (см. бородавка).		
Молоко, молочная діета и молочная сыворотка. . . . .	I.	16
Молоко у хорошей кормилицы. . . . .	II.	254
Молочный струтъ (см. золотуха).		
Молочница . . . . .	I.	234—239
Молотильщики (см. сѣтели).		

Маляры (см. кузнецы).		
Морковь (см. пища растительная).		
Морошка (см. пища сахарная и кислая растительная).		
Морсъ разный (см. вода съ кислотами).		
Мотальщики (см. фабричные).		
Мушка (см. нарывной пластырь).		
Мука . . . . .	I.	14
Мѣдный купоросъ (см. синій купоросъ).		
Мѣстопробываніе . . . . .	II.	29
Мѣсячное очищеніе (см. появленіе мѣсячныхъ кровей) . . . . .	—	215—223
Мѣсячное очищеніе болѣзненное (см. болѣзненное мѣсячное очищеніе).		
Мельники . . . . .	—	227
Мѣрятели (см. сѣятели).		
Мыловары . . . . .	—	226
Мыть (см. поносъ) и особо . . . . .	—	43
Мягчительная припарка льнянаго сѣмени № 23 . . . . .	I.	379
Мягчительная припарка изъ бѣлаго хлѣба № 26 . . . . .	—	379
Мягчительная припарка льнянаго сѣмени съ ромашною № 27 . . . . .	—	379
Мягчительная припарка льнянаго сѣмени съ шафраномъ № 28 . . . . .	—	379
Мягчительно-раздражающая и болеутоляющая припарки №№ 80, 81 и 106 . . . . .	—	385—388
Мягчительное масляное слабительное № 101 . . . . .	—	387
Мягчительное полосканье №№ 102, 107, 140 . . . . .	—	387—391
Мягчительная простонародная мазь № 149 . . . . .	—	149
Мягчительно-прохлаждающій народный составъ № 182 . . . . .	—	397
Мягчительная лепешка № 210 . . . . .	—	400
Мягчительная грудная смѣсь № 121 . . . . .	—	389
Мясо разныхъ животныхъ и птицъ . . . . .	—	17—18
Мясо рыбье . . . . .	—	17
Мясо вареное, жареное, душеное, копченое и соленое . . . . .	—	20
Мясной наростъ . . . . .	II.	110—111
Мясники . . . . .	—	227
Мятныя капли (см. капли мятныя).		
Наборъ для цѣлебной противугемороидальной настойки . . . . .	I.	107
Наборъ для паровъ № 202 . . . . .	—	399
Навалъ . . . . .	II.	78
Назначеніе спеціального сельскаго лѣчебника (см. цѣль его).		
Нарывъ, его опредѣленіе, признаки, лѣченіе и проч . . . . .	I.	78—82
Нарывъ въ легкихъ, его опредѣленіе, признаки, лѣченіе и проч . . . . .	—	82—85
Наросты (см. золотуха).		
Нарывной пластырь № 58 . . . . .	—	382
Нарывная мазь (см. аутенритова нарывная мазь).		
Насморкъ (см. катаръ носовой).		

	Части.	Стран.
Настой баранника одного и съ змѣвиномъ №№ 41, 42. . . . .	—	381
Настой хинный водяной холодный № 183 . . . . .	—	397
Наставленіе объ оживленіи мноумершихъ . . . . .	II.	257
Нахлучка (см. рожа бѣлая и венерическая болѣзнь) . . . . .	I.	109—125
Натужный (кровоавый) поносъ . . . . .	—	367—375
Натужный поносъ дѣтскій . . . . .	—	375—377
Недержаніе мочи . . . . .	—	177—178
Недугъ (см. ушной недугъ).		
Незалупа (см. нахлучка).		
Неотлупа (см. рожа бѣлая и венерическая болѣзнь).		
Неполитанъ мазь (см. ртутная сѣрая мазь).		
Неправильность народнаго опредѣленія лѣчебника . . . . .	—	2— 3
Нетронъ меня или недотрога (см. лишай).		
Нервная медленная лихорадка (см. лихорадки припадочныя).		
Новороссіяне (см. малороссіяне).		
Новорожденный младенецъ . . . . .	II.	251
Ноготѣда, опредѣленіе, признаки, лѣченіе и проч. . . . .	I.	85— 91
Ножная щелочная и горчично-соленая ванны №№ 83 и 84 . . . . .	—	385—386
Ножная ванна укусуная № 96 . . . . .	—	387
Носильщики . . . . .	II.	228
Ночная куриная слѣпота . . . . .	—	10— 11
Ношеніе груднаго младенца (см. одежда его).		
Обойщики (см. кузнецы).		
Обморокъ . . . . .	—	73— 78
Обмираніе (см. обморокъ).		
Образованіе священника . . . . .	I.	3— 6
Образъ жизни для пришельцевъ въ жаркія страны (см. діета для нихъ).		
Обручники (см. колесники).		
Овесъ (см. пища растительная).		
Овсянка (см. мясная пища).		
Овощъ огородный и парниковый (см. зелень).		
Оглавленіе 1-й части лѣчебника (см. первые ея листы).		
Оглавленіе 2-й части лѣчебника (см. первые ея листы).		
Оглавленіе общее, алфавитное, предметовъ, содержащихся въ само- учителѣ лѣченія (см. въ концѣ его).		
Огневикъ, его опредѣленіе, признаки, лѣченіе и проч. . . . .		70— 78
Огородники (см. садовники).		
Огурцы (см. пища растительная).		
Огуречный рассолъ (см. слабительное изъ огуречнаго рассола).		
Одѣяльщики (см. скорняки).		
Ожога . . . . .	II.	207—211
Ознобленіе (см. отмороженіе).		
Олады . . . . .	I.	9

Олень (см. мясная пища).		
Околоушница, ея опредѣленіе, признаки, лѣченіе и проч. . . . .	—	109—113
Окунь (см. мясо рыбы).		
Опанцеты (см. рукоблуды).		
Опредѣленіе лѣчебника народное . . . . .	—	1
«    равенства обоого пола . . . . .	—	32
«    лѣчебника частное, какъсамоучителя спеціального сель-	—	55
«    скаго лѣченія . . . . .	—	—
Оршадъ (см. вода съ кислотами).		
Орѣховое масло (см. масла выжатые).	—	40
Осеннія лихорадки (см. лихорадка перемежающаяся).		
Оскомина . . . . .	—	7
Оснастки машинъ (см. кузнецы).		
Осушатели болотъ . . . . .	II.	228
Оспа натуральная настоящая, истинная . . . . .	I.	248—258
«    натуральная ложная, вѣтрена . . . . .	—	258—259
«    натуральная видоизмѣненная . . . . .	—	260
«    предохранительная . . . . .	—	261
«    предохранительная настоящая . . . . .	—	361—266
«    предохранительная ложная . . . . .	—	266—269
«    предохранительная видоизмѣненная . . . . .	—	269—270
Оспопрививаніе . . . . .	II.	255
Остановленіе мѣсячнаго кровотеченія . . . . .	—	180—181
Остяги (см. самоѣды).		
Отмороженіе . . . . .	—	211—214
Отваръ корня одуванчика № 1. . . . .	I.	377
«    корня цикорія № 2. . . . .	—	—
«    корня пырея № 3. . . . .	—	—
«    корня мыльнянки № 4. . . . .	—	—
«    мыльнянки съ александрійскимъ листомъ, мятою и горькою солью . . . . .	—	—
«    корня репейнаго № 5. . . . .	—	—
«    стеблей паслена № 6. . . . .	—	—
«    пырея съ мятою № 17. . . . .	—	—
«    корня одуванчика съ мятою № 18. . . . .	—	—
«    цикорный съ мятою № 19. . . . .	—	379
«    корня мыльнянки съ мятою № 20. . . . .	—	—
«    лапушный съ мятою № 21. . . . .	—	—
«    пасленный съ мятою № 22. . . . .	—	—
«    мыльнянки съ александрійскимъ листомъ и др. № 30. . . . .	—	380
«    валеріаны съ пасленомъ № 35. . . . .	—	—
«    змѣвика одного и съ валеріаною и мятою № 37, 38, 39, 40 . . . . .	—	380—381
«    воры ивы одной съ камфорою №№ 43, 44 . . . . .	—	381

	Части.	Стран.
« дубовой коры одной съ камфорою №№ 45, 46. . . . .	—	—
« хины одной, съ камфорою и гофманскими каплями №№ 47, 48, 49, 50. . . . .	—	381—382
« корня дягиля № 67. . . . .	—	383
« конского щавеля № 99. . . . .	—	286
« сенегги № 119. . . . .	—	389
« корня солодкового № 125. . . . .	—	390
« салапа № 132. . . . .	—	—
« чистотѣла № 127. . . . .	—	—
« мѣла № 188. . . . .	—	397
Отравленные . . . . .	II.	272—279
Отхаркивающая смѣсь № 142. . . . .	I.	391
Охотники . . . . .	II.	229
Парапичъ . . . . .	—	66—73
Пары и газы (см. задохшіеся отъ вредныхъ паровъ и газовъ).		
« разрѣшающіе и успокоивающіе № 110. . . . .	I.	388
« грудные для вдыханія № 111. . . . .	—	—
Парши (см. золотуха).		
Паховикъ (см. бубонъ).		
Пастухи (см. скотницы).		
Пекари хлѣба (см. хлѣбники).		
Перепелка (см. мясная пища).		
Пересоль № 220. . . . .	I.	401
Персики (см. пища растительная и кислая).		
Переливщики напитоковъ (см. виноградари).		
Перелой (см. течь изъ ствола).		
Перепопчатая жаба (см. воспаленіе дыхательнаго горла).		
Періоды лихорадочныхъ болѣзней (см. лихорадочныя болѣзни).		
Пермяки (см. Россіяне средней части Россіи).		
Песокъ (см. каменная болѣзнь).		
Петрушка (см. пища растительная, слизистая и зелень).		
Печники (см. кузнецы).		
Пѣвцы . . . . .	II.	231
Пиво цѣлебное противускорбутическое (см. цѣлебное противуцунготное пиво).		
Пивовары (см. виноградари).		
Пильщики бревень . . . . .	—	229
Пилюли изъ казанскаго мыла ибакаutowой смолы № 230. . . . .	I.	402—403
Пирогги . . . . .	—	9
Пирогги . . . . .	—	21
Питье . . . . .	—	388—389
« общее разрѣшающее № 113, 114. . . . .	—	396
« прохлаждающее и укрѣпляющее № 177. . . . .	—	396
Питье кислое изъ кремортаргара № 178. . . . .	I.	396

	Части.	Стран.
Питье народное потогонное отъ водянки № 223. . . . .	I.	402
Пища растительная и животная . . . . .	—	7, 12 и 13
« растительная, слизистая и крахмальная . . . . .	—	8
« сахарная и кислая . . . . .	—	8— 11
« приготовленная и приправленная . . . . .	—	19
Повѣшенные . . . . .	II.	261—263
Повара (см.стряпки).		
Повитухи (см. бабки повивальныя).		
Подкожный вередь (см. корбункулъ).		
Подмѣсъ зелени (см. зелень).		
Подагра (см. ревматизмъ послѣдовательный) . . . . .	I.	208
Подмѣсъ муки и порча хлѣба . . . . .	—	14—15
Подошвенница (см. ревматизмъ ладоней и подошвъ) . . . . .	—	216
Подзатыльница (см. золотуха).		
Полипъ (см. мясной наростъ).		
Полотеры . . . . .	II.	230
Полосканье противуцынготное № 206. . . . .	I.	399
« вяжущее, прохладяющее №№ 103, 104, 105. . . . .	—	388
« разрѣшающее и очищающее № 109. . . . .	—	—
« мягчительное (см. мягчительное полосканье).		
Помъ . . . . .	—	41
Полный животъ (см. золотуха).		
Померанцы (см. пища растительная).		
Попось . . . . .	II.	40— 46
« кровавый (см. натужный поносъ).		
Порѣзь (см. раны).		
Порча хлѣбныхъ зеренъ и муки . . . . .	I.	14
« мяса . . . . .	—	19
Порядокъ Самоучителя сельскаго лѣченія . . . . .	—	62
Порошокъ изъ кремортартара съ магнезіею № 63. . . . .	—	383
« прохладяющій слабительный №№ 64 и 65. . . . .	—	—
Порошки свинцоваго сахара № 120. . . . .	—	389
« синяго купороса № 169. . . . .	—	395
« ревеня съ магнезіею № 172 . . . . .	—	396
« изъ белладоны № 180. . . . .	—	397
Порошокъ селитры съ кремортартаромъ № 181. . . . .	—	—
Порошки хинной соли одной и съ нашатыремъ №№ 199 и 181. . . . .	—	398
« хинной соли для дѣтей № 197. . . . .	—	—
Порошокъ хины съ нашатыремъ № 190. . . . .	—	—
Порошки хины съ ревенемъ № 192. . . . .	—	—
« хины съ имбиремъ, корицею и т. п. № 93. . . . .	—	—
Порошокъ хины съ кремортартаромъ № 194. . . . .	—	—
Порошки хинной соли съ ошемъ № 125. . . . .	—	—



	Части.	Стран.
« изъ опія № 196 . . . . .	I.	398
Порубъ (см. раны).		
Портные . . . . .	II.	230
Портулакъ (см. пища растительная).		
Посты . . . . .	I.	35
Пострѣлъ (см. ударъ).		
Почечуй (см. геморой).		
Появленіе мѣсячныхъ кровей . . . . .	—	41
Потливость (см. болѣзненный потъ).		
Потогонный чай № 85. . . . .	—	386
Поясничница (см. ревматизмъ поясницы) . . . . .	—	217
Пустарнакъ (см. пища растительная и зелень).		
Пузырчатая сыпь . . . . .	—	242—245
Пученіе живота (см. вѣтры).		
Плоды . . . . .	—	11
Площицы (см. вшивость).		
Плоскій глистъ (см. солитеръ).		
Правила о попеченіи и хожденіи за роженицами. . . . .	II.	248
« о попеченіи и хожденіи за новорожденными . . . . .	—	251
« предохранительныя отъ повальныхъ болѣзней . . . . .	—	279
« какъ собирать, высушивать и хранить лѣкарственные ра- стенія и части ихъ . . . . .	—	287
Прачки . . . . .	—	231
Предметъ Самоучителя спеціального сельскаго лѣченія . . . . .	—	56
Предвѣстники лихорадочные (см. лихорадочныя болѣзни).		
Прѣлость (см. болѣзненный потъ).		
Припарка изъ печенаго лука № 25. . . . .	I.	379
« изъ табаку и луку № 61. . . . .	—	383
« мягчительная (см. мягчительныя припарка). . . . .		
« простонародная мягчительная № 151. . . . .	—	393
« ароматическая противугниlostная № 56. . . . .	—	382
« разбивающая № 59. . . . .	—	383
« успокоивающая № 60. . . . .	—	—
« сѣнной трухи № 122. . . . .	—	389
Примочка прохлаждающая, противугниlostная № 93. . . . .	—	387
« прохлаждающая и болеутоляющая № 94. . . . .	—	—
« солеуксусная (см. пересоль).		
Присыпка (см. возбуждающая и очищающая присыпка).		
Прогумка груднаго младенца (см. одежда новорожденнаго).		
Продавцы пеньки и льна (см. чесальщики).		
Проколъ (см. раны).		
Просо (см. пища растительная).		
Просяная сыпь . . . . .	—	245—248

	Части.	Стран.
Прояска (см. просыная сыпь).		
Промывательное № 95. . . . .	—	387
Противулихорадочное промывательное изъ хины № 201. . . . .	—	399
Противугеморoidalный, цѣлебный травникъ (см. противугеморoidalная цѣлебная настойка).		
Прохлаждающая слабительная смѣсь №№ 97, 98, 99, 100, 138. —	387—391	
“ селитряная смѣсь № 144. . . . .	—	392
“ слабительное (см. слабительное изъ кремортартара)		
Прохлаждающій, успокоивающій волненіе крови порошокъ № 205. —	399	
Противувоспалительная смѣсь № 143. . . . .	—	391
Противугнигостная смѣсь хины № 185. . . . .	—	397
Противугеморoidalный сѣрный порошокъ № 209. . . . .	—	400
“ наборъ (см. цѣлебная, протовогеморoidalная настойка).		
Проповѣдники (см. пѣвцы).		
Прядильщики (см. скорняки).		
Пряхи (см. фабричные).		
Плоды (см. пища сахарная и кислая).		
Пластина крови (см. воспалительная плева крови).		
Плева крови (см. пластина крови).		
Плотники . . . . .	II.	231
Пшеница	}	см. пища растительная и крахмальная).
Пшеничный хлѣбъ		
Пшеничный хлѣбъ (см. пища крахмальная).		
Раздѣленіе болѣзней всѣхъ вообще . . . . .	—	62
“ лихорадочныхъ болѣзней . . . . .	I.	64
“ болѣзней нелихорадочныхъ . . . . .	II.	3
“ воспаленія . . . . .	I.	65
Раздражительность (см. цѣлительная сила природы).		
Раздражающая обертка № 116. . . . .	—	389
Растительная пища (см. пища растительная).		
Разнознаваніе лихорадочныхъ болѣзней . . . . .	—	63
Разрѣшающіе и успокоивающіе пары № 110 . . . . .	—	388
Раны разнаго рода . . . . .	II.	185—197
Рамщики (см. колесники).		
Растительное молоко съ камфорою и селитрою № 87, 135. . . . .	I.	386—391
Растворъ хинной соли № 198 . . . . .	—	398
Растворъ аммоніаговой камеди № 115. . . . .	—	389
Расчесывальщики шерсти . . . . .	I.	232
Ревматизмъ личной. . . . .	}	
“ головныхъ покрововъ . . . . .		
“ затылочно-шейный. . . . .		
“ зубной и челюстный. . . . .		
	I.	216

	Части.	Стран.
> его виды и подраздѣленія . . . . .	—	206
Ревматическая горячка (см. ломотная горячка).		
Ревматизмъ ладоней и подошвъ . . . . .	—	216
Ревенный простой сиропъ № 176. . . . .	—	396
Ревматизмъ межъ реберныхъ и брюшныхъ мышцъ . . . . .	}	217
> спинной . . . . .		
> поясницы и вертлужный . . . . .		
Ревматизмъ нелихорадочный, послѣдовательный, застарѣлый . . . . .	—	218—222
Ревень (см. слабительный порошокъ ревеня).		
Рѣдка (см. пища растительная слизистая).		
Рѣшеніе и рѣшительные дни (см. исходъ лихорадочныхъ болѣзней).		
Рѣзчики (см. колесники).		
Рѣпа (см. пища растительная).		
Риверово питье № 62 . . . . .	—	383
Рись (см. пища растительная)		
Рыбаки . . . . .	II.	233
Рыболовы (см. прачки) . . . . .	—	—
Рыба соленая и копченая . . . . .	I.	20
Рыбье мясо (см. мясо рыбье).		
Родимыя пятна (см. мясной наростъ).		
Родимецъ . . . . .	—	22
Роды (см. правила о печеніи и хожденіи за роженицами и родильн.)		
Рожа красная, ея опредѣленіе признаки, лѣченіе и проч. . . . .	—	91—102
Рожа красная у новорожденныхъ . . . . .	—	102—106
Рожа бѣлая, ея опредѣленіе признаки, лѣченіе и проч. . . . .	—	102—109
Рожки (см. спорынья).		
Розовая приправа № 208. . . . .	—	400
Росписаніе поселянъ по ихъ быту и званію . . . . .	II.	219
Росписаніе поселянъ по ихъ разноклиматному мѣстопробыванію. . . . .	—	244
Россіяне средней части Россіи . . . . .	—	247
Рубители строеваго лѣса . . . . .	—	232
Рудокопы . . . . .	—	233
Рукоблуды . . . . .	I.	119—129
Рябина (см. пища растительная, сахарная и кислая).		
Рябчикъ (см. мясная пища).		
Рвотное домашнее № 112 . . . . .	—	388
Рвотное для дѣтей № 174 . . . . .	—	396
Рвотное въ растворѣ № 184 . . . . .	—	397
Ржаной хлѣбъ (см. пища крахмальная).		
Ржаныя зерна . . . . .	I.	13
Ртутная сѣрая мазь (см. мазь ртутная).		
Саго (см. растительная пища).		
Садовники . . . . .	II.	234

Салепъ (см. пища растительная).		
Салатъ (см. пища растительная).		
Сарачинское пшено (см. пища растительная).		
Салотопы (см. свѣчники).		
Сало свиное . . . . .	I.	20
Самоѣды . . . . .	II.	244
Сангвиническій темпераментъ . . . . .	I.	44
Сангвинико-меланхолическій темпераментъ . . . . .	—	52
Сапожники . . . . .	II.	234
Селедка (см. мясо рыбае).		
Селитряная смѣсь № 133. . . . .	I.	390
Сельдерей (см. пища растительная).		
Сѣверная страна (см. мѣстопребываніе).		
Сѣрный цвѣтъ въ растворѣ № 13 . . . . .	—	378
Сѣрный порошокъ № 203 . . . . .	—	399
Сѣрный порошокъ съ магнезіею и кремортартаромъ №№ 14 и 209 . . . . .	—	378—400
Сѣрная простая и сложная мазь №№ 211 и 212 . . . . .	—	400
Сѣрная вода № 213 . . . . .	—	—
Сѣрное мыло № 214. . . . .	—	—
Селитряный порошокъ № 86 . . . . .	—	386
Селитряная смѣсь № 108. . . . .	—	388
Серна (см. мясная пища).		
Система Самоучителя сельскаго лѣченія (см. порядокъ).		
Сифилисъ (см. венерическая болѣзнь).		
Сибиряки (см. Россіяне средней части Россіи).		
Синій купоросъ. . . . .	—	146—149
Содовые порошки (см. шипучіе содовые порошки).		
Содержаніе себя относительно предрасудковъ . . . . .	—	53
Соусъ (см. пища приготовленная и приправленная).		
Солитеръ (см. глисты).		
Солонина (см. ветчина).		
Советъ переселенцамъ изъ холодной страны въ жаркую и на- оборотъ . . . . .	II.	124—125
Содовые порошки (см. шипучіе содовые порошки).		
Собачья старость у дѣтей (см. сухотка).		
Составныя лѣкарства . . . . .	I.	377
Судагъ (см. мясо рыбае).		
Сукновальщики . . . . .	II.	235
Супъ (см. пища приготовленная и приправленная).		
Сурьянное вино № 175 . . . . .	I.	396
Сустановомъ (см. ревматизмъ послѣдовательный) . . . . .	—	208
Сухотка . . . . .	—	142
Сучье вымя (см. золотуха).		
Супружество . . . . .	—	30

	Части.	Стран.
Сыворотка . . . . .	I.	16
Сыворотка квасцовая, вяжущая № 207 . . . . .	—	399
Сыровецъ малороссійскій (см. щи кислые).		
Сыпи лихорадочныя. . . . .	—	233
Сыромятники (см. живодеры).		
Сырники . . . . .	II.	235
Съятели зерноваго хлѣба . . . . .	—	—
Съятели риса (см. садовники).		
Сборъ травъ для ароматической ванны № 33 . . . . .	I.	382
Свекла (см. пища растительная).		
Свѣчники. . . . .	II.	236
Свинуха (см. золотуха).		
Свекла (см. пища растительная слизистая).		
Скарлатина и ея разности. . . . .	I.	278—286
Скорбуть (см. цынга).		
Скороходы . . . . .	II.	236
Скорняки. . . . .	—	237
Скрытныя лихорадки . . . . .	I.	326
Скотники и скотницы . . . . .	II.	237
Слабительное изъ огуречнаго разсала №№ 7 и 128 . . . . .	I.	377—390
Слабительное изъ магnezиn № 8 . . . . .	—	378
Слабительное изъ кремортартара одного и съ магnezіею №№ 9 и 10 . . . . .	—	—
Слабительныя порошки ревеня одного и съ магnezіею №№ 31 и 32. . . . .	—	380
Слабительное горькой соли одной и съ нашатыремъ №№ 33, 34 и 73. . . . .	—	380—384
Слабительное изъ толюгна № 72 . . . . .	—	—
Слабительное изъ коры крушины №№ 74 и 75 . . . . .	—	384—385
Слабительное alexандрійскаго листа № 18 . . . . .	—	389
Слабительное охлаждающее квасное № 129 . . . . .	—	390
Слабительная вѣнская смѣсь № 139 . . . . .	—	391
Слабительное alexандрійскаго листа съ черносливомъ № 186 . . . . .	—	397
Слесари (см. кузнецы).		
Сливы (см. пища растительная, сахарная и кислая).		
Слизетеченія . . . . .	—	347
Слизетеченіе изъ ушей (см. ушной недугъ)		
Слизистое питье № 130 . . . . .	—	390
Слизистая эмульсія № 131 . . . . .	—	—
Слѣпота курчья (см. ночная курчья слѣпота)		
Смородина (см. пища сахарная и кислая).		
Смертоподобіе (см. обморокъ)		
Сморodinный корень . . . . .	I.	296
Смѣсь камедисто-нашатырно-камфорная № 221. . . . .	—	401
Смѣсь, отдѣляющая харкотину, № 142. . . . .	—	391
Спазмы грудныя . . . . .	—	28—30
Спазмы желудочныя. . . . .	—	30—34

	Части.	Стран.
Спазмы кишечныя . . . . .	—	—
Спазмы желудочно-кишечныя (см. желудочно кишечныя спазмы).		
Спаржа (см. пища растительная)		
Списокъ простыхъ лѣкарствъ для домашней аптеки . . . . .	II.	291—294
Списокъ врачебныхъ растений, разводимыхъ въ огородѣ . . . . .	—	294—296
Спорынья, медуница, головня, изгара . . . . .	I.	13
Способъ пропитанія . . . . .	—	26
Спускъ № 29 . . . . .	—	379
Средство отъ запоя № 204 . . . . .	—	399
Средство отъ поварныхъ болѣзней . . . . .	II.	284—286
Ставленіе свѣчки въ ухо . . . . .	I.	117
Столяры (см. плотники).		
Строители судовъ (см. колесники).		
Стряпки (см. кухарки).		
Студень . . . . .	—	16
Тѣлосложеніе и разность его . . . . .	—	34
Темпераментъ . . . . .	—	44
Темпераментъ сангвиническій . . . . .	—	44—45
Темпераментъ холерическій . . . . .	—	45—47
Темпераментъ меланхолическій . . . . .	—	47—49
Темпераментъ флегматическій . . . . .	—	49—51
Темпераментъ холерико-флегматическій . . . . .	}	52
Темпераментъ сангвинико-меланхолическій . . . . .		
Тетеревъ (см. мясная пища).		
Тетка (см. лихорадка перемежающая).		
Тесемочный глисть (см. ленточный глисть).		
Течь изъ ствола (см. гоноррея).		
Тинктура валеріаны № 36 . . . . .	I.	380
Тинктура шпанскихъ мушекъ (см. капли ихъ).		
Тифъ (см. горячка тифозная).		
Тифозныя горячки . . . . .	II.	239
Торгаши (см. фабричныя).		
Торговцы и торговки . . . . .	—	237
Торгующіе волосомъ (см. волосяники).		
Точильщики . . . . .	—	238
Тыква (см. пища растительная).		
Тѣсто слоное, слоное и т. п . . . . .	I.	9
Твердый животъ (см. золотуха).		
Твачи и твачихи . . . . .	II.	238
Тряпичники . . . . .	—	239
Тряска (см. лихорадка перемежающая).		
Трясеніе тѣла . . . . .	—	21—24
Трепетаніе сердца . . . . .	II.	19—21

	Части.	Стран.
Трубочисты . . . . .	—	238
Трудное испражнение мочи . . . . .	—	175—177
Угарь . . . . .	—	83— 86
Ударъ . . . . .	—	58— 66
Удавка (см. неотлупа).		
Убитые молніею . . . . .	—	265—266
Угольщики . . . . .	—	239
Уголь (см. раны).		
Укушеніе ядовитыми животными (см. рожа бѣлая и ядовитыя раны).		
Успокоивающая, болеутоляющая мазь № 82. . . . .	I.	385
Утопленники . . . . .	II.	257—261
Ушибъ . . . . .	—	214—218
Ушное воспаление (см. воспаление ушное).		
Ушной недугъ (см. золотуха).		
Уязвленіе (см. раны).		
Фабричныя . . . . .	—	239
Флюсъ (см. ревматизмъ зубной и челюстный).		
Французская болѣзнь (см. венерическая болѣзнь).		
Флегматическій темпераментъ . . . . .	I.	49
Хандра (см. ипохондрія).		
Хинная дѣтская микстура (смѣсь) № 199 . . . . .	—	399
Хина . . . . .	—	333
Хинный холодный водяной настой № 183 . . . . .	—	397
Хирурга (см. дактилагра).		
Хожатыя за больными . . . . .	II.	240
Холера частная и повальная . . . . .	—	49—50
Холерическій темпераментъ . . . . .	I.	45
Холерико-флегматическій темпераментъ . . . . .	—	52
Холецъ . . . . .	—	150
Хлѣбъ печеный, ржаной и пшеничный теплый . . . . .	—	9—15
Хлѣбники . . . . .	II.	240
Хрѣновникъ № 91. . . . .	I.	366
Церать (см. спускъ).		
Цигорій (см. пища растительная).		
Цѣлѣбная противугеморроидальная настойка (см. наборъ для цѣлеб. противугем. настоекъ).		
Цѣлѣбное претивуцынготное пиво . . . . .	I.	90— 91
Цѣлительная сила природы . . . . .	—	34
Цѣль самоучителя спеціального сельскаго леченія . . . . .	—	53
Цынга . . . . .	II.	86— 96
Цыпки . . . . .	—	218—219
Чай . . . . .	I.	22
Чай мятный №№ 15 и 16. . . . .	—	378
Чай потогонный (см. потогонный чай).		

	Частн.	Стран.
Чихоточная лихорадка (см. лихорадки принадочныя).		
Чемерь (см. ревматизмъ головныхъ покрововъ).		
Черемисы (см. Россіане средней части Россіи).		
Червивость (см. глисты).		
Чесальщики и продавцы пеньки и льна . . . . .	II.	241
Чесотка . . . . .	—	142—146
Чечевица (см. пища растительная).		
Чирей (см. вередъ).		
Чижи (см. венерическая болѣзнь).		
Чистодѣлы . . . . .	—	242
Чистильщики колодцевъ и помойныхъ ямъ . . . . .	—	—
Чуваши (см. россияне средней части Россіи).		
Чувствительность (см. раздражительность).		
Чукчи (см. самоѣды).		
Чулочники и чулочницы (см. швей).		
Чухуръ (см. смородинный корень).		
Чтецы на распѣвъ (см. пѣвцы).		
Шанкеръ (см. венерическая болѣзнь).		
Шелкодѣлатели . . . . .	—	243
Шерстобиты (см. расчесывальщики шерсти и скоряжи).		
Шелковина (см. пища растительная, сахарная и кислая).		
Шипучіе содовые порошки №№ 11 и 12. . . . .	I.	378
Шолуди (см. парши).		
Швей и штопальщики . . . . .	II.	243
Шпинатъ и щавель. (см. пища растительная).		
Щекатуры (см. кузнецы).		
Щелокъ поташный, щелокъ мыльниковъ № 215. . . . .	I.	400
Щи (см. пища приготовленная и приправленная).		
Щи кислые (см. кислые щи).		
Эмульсія (см. растительное молоко).		
Южная страна (см. мѣсто пребыванія).		
Южные жители (см. южная страна).		
Южные закавказцы . . . . .	III.	245
Яблочный квасъ (см. вода съ кислотами).		
Ядовитое укушеніе (см. укушеніе ядовитыми животными).		
Ядовитыя раны (см. раны разнаго рода).		
Яды и противуядія . . . . .	—	275—279
Язвы разнаго рода . . . . .	—	197—207
Яйца . . . . .	I.	16
Ячмень — болѣзнь (см. Золотуха).		
Ячмень — зерновой хлѣбъ (см. пища растительная).		



## ЗАМЪЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

<i>Стран.</i>	<i>Стр.</i>	<i>Напечатано:</i>	<i>Должно читать:</i>
9	7-я	сверху 129 . . . .	128
21	4-я	снизу 202 . . . .	205
33	3-я	» 187 . . . .	188
69	5-я	» 72 . . . .	71
70	24-я	сверху 72 . . . .	71
79	17-я	» 161 . . . .	151
92	19-я	» 203 . . . .	206
96	23-я	» 99 . . . .	98

## О Г Л А В Л Е Н І Е

### ВТОРОЙ ЧАСТИ САМОУЧИТЕЛЯ СЕЛЬСКАГО ЛѢЧЕНІЯ.

	страницы.
Болезни не лихорадочныя (Morbi apyretici) . . . . .	1
<b>КЛАССЪ ПЕРВЫЙ.</b>	
Болезни нервныя (Neuroses) . . . . .	2
Головокруженіе (Vertigo) . . . . .	2— 4
Головная боль (Cephalalgia) . . . . .	4— 7
Зубная боль (Odontalgia) . . . . .	7— 10
Ночная (куричья) слѣпота (Nemeralopia) . . . . .	10— 11
Ипохондрія (Hypochondria) . . . . .	11— 17
Кашель (Tussis) . . . . .	17— 19
Трепетаніе сердца (Palpitatio cordis) . . . . .	19— 21
Трясеніе тѣла (Tremor corporis) . . . . .	21— 24
Истерика (Hysteria) . . . . .	24— 28
Спазмы грудныя (Stetalgia) . . . . .	28— 30
> трудное дыханіе (Dyspnoea).	
> удушье (Asthma).	
> щемленіе сердца (Cardiogmus).	
Спазмы желудочныя (Cardialgia) . . . . .	30— 34
> тошнота (Nausea).	
> рвота (Vomitus).	
> изжога (Pyrosis).	
Спазмы кишечныя (Enteralgia) . . . . .	—
Безъ изверженія (E. sicca).	
Болика (Colica) . . . . .	34— 40
> нервная.	
> вѣтряная (Flatulenta).	
> свинцовая (C. saturnina).	
> глистная (C. enthelmintica).	
> запорная (C. obturatoria).	
> почечная (C. renalis).	
> Воспалительная.	
> геморроидальная (C. Hemorrhoidalis).	

Колика маточная (C. Uterina).	
> Ревматическая, ломотная (C. Rheumatica).	
Съ изверженіемъ низомъ (E. humida per inferiora).	
Поносъ (Diarrhoea) . . . . .	40— 46
> первоначальный (D. idiopatica).	
> послѣдовательный (D. symptomatica).	
> дѣтскій.	
Съ изверженіемъ верхомъ (E. humida per superiora)	
Рвота низовыми испраженіями (Miserere, voluulus) . . . . .	46— 47
Спазмы желудочно-кишечные (Cardio-enteralgia) . . . . .	—
Сухіе: Вѣтры (C. sicce flatulenta). . . . .	47— 49
Бурчаніе въ животѣ (Borborigmi abdominales).	
Пученіе живота (intumescencia abdominis flatulenta).	
Барабанное напряженіе живота (Timpanitis).	
Мокрые со рвотою и поносомъ (C. humida per superiora et inferiora).	
Холера (Cholera).	
Частная (Ch. sporadica) . . . . .	49— 52
Повальная (Ch. epidemica). . . . .	52— 53
Злая корча (Raphania) . . . . .	53— 55
Бессонница (Agyrnia) . . . . .	55— 58
Ударъ, пострѣлъ (Aporplexia) . . . . .	58— 66
Параличъ (Paralysis) . . . . .	66— 73
> полный и неполный.	
> половинчатый и перекрестный.	
> онѣмѣніе.	
> нижнихъ конечностей, — ножной.	
> языка — нѣмота.	
> нижней части заднепроходной кишки и мочевого пузыря	
> (запоръ на низъ и мочи).	
Обморокъ, обмираніе, смертоподобіе (syncore et asphixia). . . . .	73— 78
Навалъ, кошмаръ (incubus) . . . . .	—
Безгласіе (Aphonia) . . . . .	78— 79
Бѣшенство, бѣшеное сумасшествіе (mania) . . . . .	79— 83

## КЛАССЪ ВТОРОЙ.

Болезни крови (Haemoses) . . . . .	—
Угаръ (Carbonismus) . . . . .	83— 86
Цынга (scorbutus) . . . . .	86— 93
Кровотеченія (Haemorrhagiae) . . . . .	93— 95
» носовое (Epistaxis) . . . . .	95— 97
Кровохарканіе (Haemoptitis) . . . . .	97—101
> горловое (H. Trachealis).	
» легочное (H. pulmonalis).	

	Страницы.
Геморрой, почечуй (Haemorrhoids) . . . . .	102—108
»     текущий, — открытый (H. fluens).	
»     закрытый, — внутренний (H. tumens).	
Кровавое мочеисечение (Haematuria) . . . . .	108—110

**КЛАССЪ ТРЕТІЙ.**

Болезни питания (Trophoses) . . . . .	—
Излишняго (Hypertrophoses).	
мясной наростъ (Excrescentia sarcosa). . . . .	110—111
полипь (Polypus).	
родимое пятно (Naevus).	
бородавка (Verruca) . . . . .	111—114
»     съ узкимъ основаніемъ (V. pendilis, caruncula).	
»     съ широкимъ основаніемъ (v. sessilis).	
»     круглая, продолговатая (Condiloma).	
Мозоль (Clavus) . . . . .	111—114
»     сухой (C. siccus).	
»     мокрый (C. humidus).	
Художественнаго (Cacotrophoses).	
Венерическая болѣзнь (Morbus venerea) . . . . .	114—125
Перелой (Gonorrhoea).	
Язва, шанкеръ (ulcus venereum).	
Паховикъ (Bubo syphiliticus).	
Сифилисъ (syphilis).	
Перерожденія (Degenerationes syphiliticae).	
Золотуха (Scrophula) . . . . .	125—128
Воспалительная (S. calida) . . . . .	127
ячмень.	
дѣтскій цвѣтъ (Strophulus).	
свинуха (Suosis).	
сучье вымя (Cynosis).	
парши, шогуди (Tinea).	
молочный струпь, кора (Crusta lactea).	
заусеница (Rhagas).	
ушной недугъ (Otorrhoea).	
зашейница, подзатыльница.	
Холодная (S. frigida) . . . . .	—
вздутый, полный, твердый животъ.	
лимфатическія опухоли (Tumores lymphatici).	
зобъ на шеѣ (struma).	
англійская болѣзнь (Rachitis).	
Лишай (Herpes) . . . . .	138—142
»     летучій, недотрога (Noli me tangere).	
»     посообразный, чешуйчатый (H. squamosum).	

Лишай отрубевидный, мухлистый ( <i>H. farinosum</i> ).	
» разъядающий ( <i>H. corrodens</i> ).	
Недостаточнаго ( <i>Distrophoses</i> ).	
Сухотка ( <i>Tabes</i> ) . . . . .	142

### КЛАССЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Болѣзненныя отложения ( <i>Aprostases</i> ) . . . . .	—
Животнородныя ( <i>Zoogeneae</i> ).	
Чесотка, короста ( <i>scabies, psora</i> ) . . . . .	142—146
Вшивость ( <i>Phthyriasis</i> ) . . . . .	146—148
Плоскочность ( <i>Morpriasis</i> ) . . . . .	146
Червивость, глисты ( <i>Enthelminthiasis</i> ) . . . . .	148—154
Маленькіе, кругленькіе червячки ( <i>Ascaris lumbricoides</i> ).	
Средніе круглые, шилохвостые глисты ( <i>oxyuris vermicularis</i> ).	
Плоскіе тесемочныя, ленточныя глисты ( <i>Taenia solium, Botrio-</i> <i>caerphalus</i> ).	
Камнеродныя ( <i>Lithogeneae</i> ).	
Каменная болѣзнь ( <i>Zithyasis</i> ) . . . . .	154—158
Желчно-пузырная ( <i>Chololithyasis</i> ).	
Почечная ( <i>Nephrolithyasis</i> ).	
Мочепузырная ( <i>Cystolithyasis</i> )	
Цвѣтородныя ( <i>Chromogeneae</i> ).	
Желтуха ( <i>Icterus</i> ) . . . . .	158—162
Водородныя ( <i>Hydrogeneae</i> ).	
Водянка ( <i>Hydrops</i> ) . . . . .	162—172
» подкожная ( <i>Anasavea</i> ).	
» общая и мѣстная-отекъ ( <i>Universalis et partialis s. œdema</i> ).	
» брюшная ( <i>Ascites</i> ).	
» грудная ( <i>Hydrothorax</i> ).	
» мѣшечатая ( <i>H. saccata</i> ).	

### КЛАССЪ ПЯТЫЙ.

Болѣзни отдѣленій и испражнений ( <i>Cryses</i> ) . . . . .	—
Запоръ на низъ ( <i>obstipatio alui</i> ) . . . . .	172—175
» у младенцевъ.	
Задержаніе мочи ( <i>Ischuria</i> ) . . . . .	175—177
Недержаніе мочи ( <i>Incontinentia urinæ</i> ) . . . . .	177—178
» у дѣтей.	
Потливость и прѣлость ( <i>Ephidrosis, intertrigo</i> ) . . . . .	179—180
Болѣзненное мѣсячное кровоочищеніе ( <i>Menstruatio irregularis</i> ) . . . . .	180—185
» остановленіе мѣсячнаго кровоочищенія ( <i>Dysmenorrhoea</i> ).	
» усиленіе его, течь изъ матки, кровотеченіе ( <i>Metvorrhagia</i> ).	—

## КЛАССЪ ШЕСТЫЙ.

Болезни мѣстныя, (Morbi locales) . . . . .	—
Раны (Vulneta). . . . .	185—197
> рѣзанная, порѣзъ, порубъ.	
> колотая, уголь, проколъ, заноза.	
> разорванная (ruptura).	
> ядовитая, уязвленіе (venenatum).	
> дѣтскія.	
Язвы (Ulcera) . . . . .	197—207
> воспаленная (Inflammatum).	
> чувствительная (Sensibile).	
> вялая (Laxum).	
> гнилая помертвѣлая (U. putridum, gangrenosum).	
> варикозная (Varicosum).	
> цыготная (Scorbuticum).	
> золотушная и волосатикъ (Scrophulosum et gordius).	
> ломотная (U. arthriticum).	
> дѣтскія.	
Ожога (Ambustura) . . . . .	207—211
Отмороженіе (Pernio). . . . .	211—214
Ушибъ (Contusio) . . . . .	214—218
Цыпки . . . . .	218—219

Росписаніе поселянъ по ихъ быту и званію . . . . .	219—244
Росписаніе поселянъ, по ихъ разноклиматному мѣстопробыванію . . . . .	244—248
Правила о попеченіи и хожденіи за роженницами и родильницами . . . . .	248—251
Правила о попеченіи и хожденіи за новорожденными . . . . .	251—255
Колыбель новорожденного, его постелька, засыпаніе въ ней и ван- ночки для обмыванія его . . . . .	251—252
Одежда, прогулка и ношеніе груднаго младенца на рукахъ . . . . .	—
Кормленіе новорожденного молокомъ матери . . . . .	252—253
Кормленіе новорожденного искусственное . . . . .	253—254
Выборъ кормилицы . . . . .	254—255

## ОБЪ ОСПОПРИВИВАНІИ.

Опредѣленіе оспопрививанія . . . . .	—
Отъ чего зависитъ успѣхъ оспопрививанія . . . . .	—
Откуда получается коровья оспенная матерія . . . . .	—
Вѣрные признаки хорошей коровьей оспы . . . . .	—
Время собранія матеріи коровьей оспы . . . . .	255—256
Когда прививаютъ оспу дѣтямъ? . . . . .	—
Способъ прививанія оспы . . . . .	—
Случаи, требующіе повторенія оспопрививанія . . . . .	—

НАСТАВЛЕНИЕ ОБЪ ОЖИВЛЕНІИ МНИМОУМЕРШИХЪ И ОБЪ,  
ОТРАВЛЕНІЯХЪ.

Подлежащіе этому виды обмиранія, производимаго вѣшними вліяніями.	257
Утопленники, ихъ обмираніе и признаки . . . . .	—
Особый родъ смерти утопленниковъ . . . . .	—
Свѣдѣнія, руководствующія въ принятіи мѣръ къ оживленію утопленниковъ . . . . .	258
Способъ къ отысканію утопленниковъ . . . . .	—
Способы и средства къ оживленію утопленниковъ . . . . .	258—260
Сколько времени нужно продолжать опыты оживленія утопленника.	261
Повѣшенные и задушенные, ихъ признаки и особый родъ смерти . . . . .	—
Свѣдѣнія, руководствующія въ принятіи мѣръ къ оживленію ихъ . . . . .	—
Что прежде всего нужно дѣлать при спасеніи повѣшенныхъ . . . . .	262
Способъ и средства къ оживленію повѣшенныхъ . . . . .	—
Замерзшіе, ихъ признаки и особый родъ смерти . . . . .	263
Причины, по которымъ замерзшихъ наи чаще удается оживлять . . . . .	—
Соблюденіе осторожности при перевозкѣ замерзшихъ . . . . .	—
Способы и средства къ оживленію замерзшихъ . . . . .	263—264
Убитые молніею, ихъ признаки и особый родъ смерти . . . . .	265
Разность удара молніи . . . . .	—
Предохранительныя средства отъ пораженія молніею . . . . .	—
Спасеніе пораженныхъ молніею . . . . .	266
Задохшіеся отъ вредныхъ паровъ и газовъ, ихъ признаки . . . . .	—
Пары и газы, причиняющіе обмираніе и частное каждаго изъ нихъ вредное дѣйствіе . . . . .	266—268
Особая опасность этого рода обмиранія, затруднительнаго къ оживленію.	—
Предосторожности въ сохраненіе отъ обмиранія по причинѣ этихъ паровъ и газовъ . . . . .	268—269
Способы и средства къ оживленію задохшихся . . . . .	269—271
Задавленные по разнымъ нечаяннымъ случаямъ . . . . .	—
Когда можно почитать ихъ невозвратно погибшими и въ какихъ случаяхъ должно приступать къ оживленію ихъ и какимъ образомъ.	—
Отравленные, ихъ противоположное содержаніе къ обмершимъ . . . . .	272
Опредѣленіе отравленія и его раздѣленіе . . . . .	—
Признаки отравленія . . . . .	—
Какъ поступать въ разныхъ случаяхъ отравленія . . . . .	273
Первая потребность удалить ядъ изъ тѣла . . . . .	274
Вторая потребность разложить, уничтожить, притупить, ограничить дѣйствія яда противуядями . . . . .	275
I. Въ отравленіи острыми минеральными ядами . . . . .	—
II. Въ отравленіи растительными и животными ядами . . . . .	276—279
Случаи, требующіе особеннаго приглашенія врача . . . . .	—

ПРАВИЛА, КОТОРЫЯ ДОЛЖНО НАБЛЮДАТЬ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПО- ВАЛЬНЫХЪ БОЛѢЗНЕЙ ВЪ ПРЕДОХРАНЕНІЕ ЗДОРОВЬЯ ПОСЕЛЯНЪ.	
Предохраненіе отъ поварныхъ болѣзней . . . . .	279
Соблюденіе чистоты и опрятности . . . . .	280
Соблюденіе трезвости . . . . .	281
Соблюденіе цѣломудренности . . . . .	282
Соблюденіе равнодушія при заботливости о своемъ здоровьѣ . . . . .	—
Полезное вліяніе дѣятельнаго образа жизни на правильность отдѣ- леній и испражнений, и вредное вліяніе кровопусканія и слабительныхъ во время поварныхъ болѣзней . . . . .	283
Вредное вліяніе источниковъ (фонтанелей) прежде почитавшихся пред- охранительнымъ средствомъ во время поварныхъ болѣзней . . . . .	—
Безусловно заразительныя болѣзни и правила, которыя должно на- блюдать при появленіи ихъ, какъ предохранительныя отъ нихъ средства . . . . .	—
Условно-заразительныя болѣзни и предохранительныя мѣры противъ нихъ . . . . .	285—287
Браткія правила собирать, высушивать и хранить лѣкарственныя растенія и части ихъ . . . . .	287—290
Списокъ простыхъ лѣкарствъ, которыя нужно имѣть въ запасѣ, когда нѣтъ ни врача ни аптеки . . . . .	291—294
Списокъ врачебныхъ растеній, которыя могутъ быть разводимы въ огородахъ; съ показаніемъ способовъ разведенія и собиранія . . . . .	294—296

